

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20195011

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

惠氏 铂臻 蔼而嘉

Wyeth Ultima PDF

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】脱盐乳清粉、植物油（葵花籽油、椰子油、大豆油、棕榈油）、脱脂乳粉、固体玉米糖浆、乳糖、乳清蛋白粉、中链甘油三酯、棕榈酸维生素 A、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、碳酸氢钠、磷酸二氢钠、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、氯化钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸胞苷、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、β-胡萝卜素、抗坏血酸棕榈酸酯、大豆磷脂、柠檬酸、氢氧化钙、碳酸氢钾。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2180	305	100
蛋白质(g)	13.57	1.90	0.62
脂肪(g)	28.07	3.93	1.29
亚油酸(g)	3.50	0.49	0.16
α-亚麻酸(mg)	329	46.1	15.1
碳水化合物(g)	53.57	7.50	2.46
维生素 A(μg RE)	717	100	32.9
维生素 D(μg)	10.7	1.50	0.49

维生素 E(mg α - TE)	10. 7	1. 50	0. 49
维生素 K ₁ (μ g)	45. 0	6. 30	2. 06
维生素 B ₁ (μ g)	780	109	35. 8
维生素 B ₂ (μ g)	1170	164	53. 7
维生素 B ₆ (μ g)	571	79. 9	26. 2
维生素 B ₁₂ (μ g)	1. 57	0. 22	0. 072
烟酸（烟酰胺） (μ g)	7143	1000	328
叶酸(μ g)	104	14. 6	4. 77
泛酸(μ g)	2857	400	131
维生素 C(mg)	77. 9	10. 9	3. 57
生物素(μ g)	15. 0	2. 10	0. 69
钠(mg)	193	27. 0	8. 85
钾(mg)	504	70. 6	23. 1
铜(μ g)	443	62. 0	20. 3
镁(mg)	45. 8	6. 41	2. 10
铁(mg)	6. 70	0. 94	0. 31
锌(mg)	5. 21	0. 73	0. 24
锰(μ g)	35. 7	5. 00	1. 64
钙(mg)	550	77. 0	25. 2
磷(mg)	325	45. 5	14. 9
碘(μ g)	71. 4	10. 0	3. 28
氯(mg)	414	58. 0	19. 0
硒(μ g)	10. 7	1. 50	0. 49
胆碱(mg)	93. 6	13. 1	4. 29
肌醇(mg)	182	25. 5	8. 35
牛磺酸(mg)	35. 7	5. 00	1. 64

左旋肉碱(mg)	7.82	1.09	0.36
二十二碳六烯酸(mg)	57.1	7.99	2.62
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.22	0.22	0.22
二十碳四烯酸(mg)	95.7	13.4	4.39
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.36	0.36	0.36
核苷酸(mg)	20.2	2.83	0.93
β-胡萝卜素(μg)	114.286	16.00	5.24

【配方特点/营养学特征】本品是为满足早产/低出生体重婴儿的营养需求而配制。本产品添加了中链甘油三酯（MCT），添加量不低于 3%。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调时请用专用量匙，1 平匙配方粉约为 4.7g。每 30mL 的温开水加入 1 平匙本品。需用 14g 配方粉加 89mL 温开水冲调配制成 100mL 标准冲调液。

冲调方法：**1.**冲调前洗净双手，奶具清洁后至水中煮沸。**2.**饮用水煮沸后，待其自然冷却至约 40℃。**3.**将温开水倒入奶瓶中。**4.**用专用量匙舀取粉末刮平后，倒入奶瓶。**5.**将使用后干燥的量匙放回奶粉罐，并盖紧罐盖。**6.**摇动已盖紧瓶盖的奶瓶，直至粉末完全溶解。喂哺前请检查温度。

【净含量和规格】400g

【保质期】24 个月

【贮存条件】产品应存放在阴凉、干燥处。开罐后请务必盖紧罐盖。开封后请于 4 周内食用完毕，避免将产品长时间放在高温处。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或者临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。

- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 5.严禁半乳糖血症或葡萄糖半乳糖吸收不良或对牛奶蛋白过敏的婴儿使用。
- 6.本产品（标准冲调液）的渗透压约为 **315mOsmol/kg**，供使用参考。
- 7.对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。
- 8.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方食品或配合添加辅助食品。
- 9.本产品可作为 6 月龄前早产/低出生体重儿单一营养来源单独食用，6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
- 10.每次只调配一次用量。请遵照冲调方法，冲调后应立即使用。未喝完的奶液请勿保存，务必丢弃。未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法、不恰当的贮存和喂哺方式均有可能影响婴儿的健康。
- 11.喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 12.请在婴儿适龄时用奶杯替代奶瓶。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。