

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230021

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

特爱瑞安

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】植物脂肪粉[麦芽糊精、植物油（玉米油、葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油）、分离乳清蛋白粉、固体玉米糖浆、无水奶油、食用葡萄糖、辛烯基琥珀酸淀粉钠、单，双甘油脂肪酸酯、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物、磷脂]、植物脂肪粉[麦芽糊精、植物油（玉米油、葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油）、固体玉米糖浆、分离乳清蛋白粉、单，双甘油脂肪酸酯、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物、磷脂]、麦芽糊精、白砂糖、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5’单磷酸腺苷、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、5’-尿苷酸二钠、5’-胞苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2033	275	100
蛋白质(g)	12.6	1.7	0.62
脂肪(g)	25	3.4	1.23
亚油酸(g)	4.6	0.6	0.23

α -亚麻酸(mg)	550	74	27
亚油酸与 α -亚麻酸比值	8:1	8:1	8:1
碳水化合物(g)	52.6	7.1	2.6
维生素 A(μg RE)	451	61	22
维生素 D(μg)	7.0	0.9	0.34
维生素 E(mg α - TE)	10	1.4	0.49
维生素 K ₁ (μg)	40	5.4	2.0
维生素 B ₁ (μg)	450	61	22
维生素 B ₂ (μg)	750	101	37
维生素 B ₆ (μg)	408	55	20.1
维生素 B ₁₂ (μg)	1.5	0.2	0.074
烟酸(μg)	5380	726	265
叶酸(μg)	90	12.2	4.4
泛酸(μg)	5700	770	280
维生素 C(mg)	70	9.4	3.4
生物素(μg)	15	2.0	0.7
钠(mg)	190	25.6	9
钾(mg)	600	81	30
铜(μg)	380	51	18.7
镁(mg)	40	5.4	2.0
铁(mg)	5.7	0.8	0.28
锌(mg)	5.0	0.7	0.25
锰(μg)	200	27.0	9.8
钙(mg)	400	54	20
磷(mg)	260	35.1	13
碘(μg)	80	10.8	3.9

氯(mg)	335	45.2	16
硒(μg)	15	2.0	0.74
胆碱(mg)	80	10.8	3.9
肌醇(mg)	135	18.2	6.6
牛磺酸(mg)	35	4.7	1.7
左旋肉碱(mg)	10	1.4	0.5
二十二碳六烯酸 (%总脂肪酸)	0.3	0.3	0.3
二十二碳六烯酸 (mg)	74	10.0	3.6
二十碳四烯酸 (%总脂肪酸)	0.3	0.3	0.3
二十碳四烯酸(mg)	74	10.0	3.6
核苷酸(mg)	35	4.7	1.7

备注：100mL 标准冲调液用 13.5g 配方粉加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】 本产品是适合乳糖不耐受婴儿食用的无乳糖配方食品，乳糖含量 <0.5 g/100 g。蛋白质由乳清蛋白提供；添加了二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、核苷酸。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】 口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：冲调时请用产品所附专用量匙，1 平匙配方粉约为 4.5 克，需用 30mL 温开水冲调成标准冲调液。

- (1) 准备冲调前，请彻底洗净双手。
- (2) 将洗干净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入沸水中煮沸 5 分钟。
- (3) 将饮用水煮沸 5 分钟，冷却至 40℃~50℃ 待用。
- (4) 将正确量的冲调用水倒入奶瓶。
- (5) 使用所附专用量匙量取正确量的配方粉加入水中。

(6) 盖紧瓶盖，轻摇至配方粉充分溶解，待液体温度适宜时，及时哺喂。

【净含量和规格】 700g, 300g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 开罐前：请常温保存，在保质期前使用该产品。开罐后：请将盖子盖紧，放置于阴凉干燥处，并于一个月内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 本品禁止用于半乳糖血症或葡萄糖-半乳糖吸收不良症婴儿。
5. 本品可以作为单一营养来源满足 6 月龄以下目标人群的营养需求；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
6. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
7. 使用期间应避免污染；剩余的哺喂液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。