

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230029

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品

特爱敏佳

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】植物脂肪粉〔乳糖、水解乳清蛋白粉、植物油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油）、植物油（玉米油、葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油）、磷酸氢钙、单，双甘油脂肪酸酯、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物、磷脂）、植物脂肪粉（固体玉米糖浆、无水奶油、水解乳清蛋白粉、麦芽糊精、植物油（玉米油、葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油）、单，双甘油脂肪酸酯、L-抗坏血酸钠、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物）、低聚果糖、麦芽糊精、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2138	289	100
蛋白质(g)	11.8	1.6	0.55
脂肪(g)	27	3.6	1.26
亚油酸(g)	4	0.5	0.19
α -亚麻酸(mg)	570	77	27

亚油酸与 α -亚麻 酸比值	7:1	7:1	7:1
碳水化合物(g)	54.4	7.3	2.5
维生素 A(μ g RE)	465	63	22
维生素 D(μ g)	7.5	1.0	0.35
维生素 E(mg α - TE)	9.5	1.3	0.44
维生素 K ₁ (μ g)	45	6.1	2.1
维生素 B ₁ (μ g)	510	69	24
维生素 B ₂ (μ g)	1320	178	62
维生素 B ₆ (μ g)	370	50	17.3
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.5	0.2	0.070
烟酸(μ g)	5500	743	257
叶酸(μ g)	85	11.5	4.0
泛酸(μ g)	4880	659	228
维生素 C(mg)	70	9.5	3.3
生物素(μ g)	15	2.0	0.7
钠(mg)	180	24.3	8
钾(mg)	540	73	25
铜(μ g)	390	53	18.2
镁(mg)	42	5.7	2.0
铁(mg)	5.5	0.7	0.26
锌(mg)	4.5	0.6	0.21
锰(μ g)	100	13.5	4.7
钙(mg)	430	58	20
磷(mg)	250	33.8	12
碘(μ g)	75	10.1	3.5
氯(mg)	330	44.6	15

硒(μg)	14	1.9	0.65
胆碱(mg)	125	16.9	5.8
肌醇(mg)	135	18.2	6.3
牛磺酸(mg)	35	4.7	2
左旋肉碱(mg)	15	2.0	0.7
低聚果糖(mg)	1600	216	74.8
核苷酸(mg)	35	4.7	1.6

备注：100mL 标准冲调液是由 13.5g 配方粉加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本产品以水解乳清蛋白粉作为蛋白质来源，乳蛋白经加工分解成小分子乳蛋白、肽段和氨基酸。添加了胆碱、左旋肉碱、低聚果糖、核苷酸。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】口服，食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调时请用专用量匙，1 平匙配方粉约为 3.8g，需用 25mL 温开水冲调成标准冲调液。冲调方法如下：（1）准备冲调前，请彻底洗净双手。（2）将洗干净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入沸水中煮沸 5 分钟。（3）将饮用水煮沸 5 分钟，冷却至 40℃~50℃待用。（4）将正确量的冲调用水倒入奶瓶。（5）使用专用量匙量取正确量的配方粉加入水中。（6）盖紧瓶盖，轻摇至配方粉充分溶解，待液体温度适宜时，及时哺喂。

【净含量和规格】700g, 300g

【保质期】24 个月

【贮存条件】开罐前：请常温保存，在保质期前使用该产品。开罐后：请将盖子盖紧，放置于阴凉干燥处，并于 1 个月内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.本品可以作为单一营养来源满足 6 月龄以下目标人群的营养需求。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

5.配制不当和使用不当可能引起健康危害。

6.使用期间应避免污染，剩余的哺喂液体请弃掉，勿留于下次食用。

7.本品标准冲调液的渗透压约为 **280mOsmol/kg**，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。