

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230050

特殊医学用途婴儿低乳糖配方食品

能盾

【产品类别】低乳糖配方

【配料表】植物脂肪粉[葡萄糖浆、植物油（玉米油、菜籽油、椰子油）、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、氢氧化钾、柠檬酸脂肪酸甘油酯、柠檬酸钠]、麦芽糊精、分离乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5' 单磷酸胞苷、5' 单磷酸腺苷、5' -肌苷酸二钠、5' -鸟苷酸二钠、5' -尿苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	2014	100
蛋白质(g)	11.10	0.55
脂肪(g)	23.60	1.17
亚油酸(g)	3.02	0.15
α -亚麻酸(mg)	302	15
亚油酸与 α -亚麻酸比值	10: 1	10:1
碳水化合物(g)	56.0	2.8
维生素 A(μ g RE)	356	18

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 D(μ g)	6.65	0.33
维生素 E(mg α -TE)	7.05	0.35
维生素 K ₁ (μ g)	42.3	2.1
维生素 B ₁ (μ g)	423	21
维生素 B ₂ (μ g)	423	21
维生素 B ₆ (μ g)	282.0	14.0
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.410	0.070
烟酸（烟酰胺）(μ g)	2820	140
叶酸(μ g)	66.5	3.3
泛酸(μ g)	2477	123
维生素 C(mg)	58.4	2.9
生物素(μ g)	10.1	0.5
钠(mg)	121	6
钾(mg)	383	19
铜(μ g)	211.5	10.5
镁(mg)	30.2	1.5
铁(mg)	3.42	0.17
锌(mg)	3.42	0.17
锰(μ g)	30.2	1.5
钙(mg)	262	13
磷(mg)	161	8
碘(μ g)	60.4	3.0
氯(mg)	282	14
硒(μ g)	13.09	0.65
胆碱(mg)	66.5	3.3
肌醇(mg)	52.4	2.6
左旋肉碱(mg)	6.0	0.3

营养成分	每 100g	每 100kJ
二十二碳六烯酸(mg)	40.10	1.99
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.16	0.16
二十碳四烯酸(mg)	60.00	2.98
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.25	0.25
核苷酸(mg)	32.2	1.6

【**配方特点/营养学特征**】 本产品以其他碳水化合物部分替代乳糖，乳糖含量<2g/100g，蛋白质由乳蛋白提供。

【**组织状态**】 粉状

【**适用人群**】 0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【**食用方法和食用量**】 口服。食品方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：冲调时请用本产品所附专用量匙，一平匙配方粉约 4.5g。100mL 标准冲调液用 13.5g 配方粉加 90mL 温开水冲调而成。

1.冲调前请先洗净双手，将洗净的奶具置于沸水中煮五分钟。2.煮沸的热开水冷却至 50℃左右，将适量的水倒入奶瓶中。3.使用所附专用量匙量取正确量的配方粉加入水中。4.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至配方粉完全溶解，待冲调液温度适宜时，即可喂哺，剩余的冲调液切勿留作下次喂哺。

【**净含量和规格**】 400g

【**保质期**】 24 个月

【**贮存条件**】 请存放在清洁阴凉干燥处，勿存放于冰箱，避免长时间储存于过高的温度下。开封后必须保证密封，建议在 1 个月内用完。

【**警示说明和注意事项**】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.配制不当和使用不当可能引起健康危害。

5.对于 0~6 月龄的乳糖不耐受婴儿，本品可作为单一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

6.未经医生或临床营养师建议，请勿擅自改变冲调液的浓度，浓度不恰当会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。

7.使用期间应避免污染。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。