

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230053

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

漆敏康

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】植物脂肪粉[植物油（菜籽油、玉米油、椰子油）、乳糖、酪蛋白、柠檬酸脂肪酸甘油酯、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、柠檬酸钠、磷酸二氢钠]、脱脂乳粉、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯）、低聚果糖、乳糖、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2075	311	100
蛋白质(g)	16.0	2.4	0.77
脂肪(g)	27.6	4.14	1.33
亚油酸(g)	3.5	0.525	0.17
α -亚麻酸(mg)	400	60	19.3
亚油酸与 α -亚麻酸比值	9: 1	9: 1	9: 1

碳水化合物(g)	45	6.75	2.2
维生素 A(μ g RE)	500	75	24.1
维生素 D(μ g)	9	1.35	0.43
维生素 E(mg α -TE)	15.9	2.39	0.77
维生素 K ₁ (μ g)	44.7	6.7	2.15
维生素 B ₁ (μ g)	780	117	37.6
维生素 B ₂ (μ g)	1497	224.6	72.1
维生素 B ₆ (μ g)	634	95.1	30.6
维生素 B ₁₂ (μ g)	2.48	0.372	0.120
烟酸（烟酰胺）(μ g)	4500	675	217
叶酸(μ g)	139.5	20.9	6.7
泛酸(μ g)	4760	714	229.4
维生素 C(mg)	110.4	16.56	5.3
生物素(μ g)	16	2.4	0.77
钠(mg)	258	38.7	12.4
钾(mg)	420	63	20.2
铜(μ g)	639	95.85	30.8
镁(mg)	47	7.05	2.3
铁(mg)	9	1.35	0.43
锌(mg)	6	0.9	0.29
锰(μ g)	119	17.85	5.7
钙(mg)	600	90	29
磷(mg)	430	64.5	20.7
碘(μ g)	90	13.5	4.3
氯(mg)	420	63	20
硒(μ g)	16	2.4	0.77

胆碱(mg)	70	10.5	3.4
肌醇(mg)	60	9	2.9
牛磺酸(mg)	35	5.25	1.7
二十二碳六烯酸(mg)	60	9	2.9
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.24	0.24	0.24
二十碳四烯酸(mg)	105	15.75	5.06
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.42	0.42	0.42
核苷酸(mg)	30	4.5	1.45
低聚果糖(g)	2	0.3	0.1

备注：每 100mL 标准冲调液用 15g 本品加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品标准冲调液能量约为 311kJ/100mL（74kcal/100mL），蛋白质含量约为 2.4g/100mL。本产品采用易于消化吸收的中链脂肪作为脂肪的部分来源，产品的中链脂肪占总脂肪的比例约为 23%；添加了二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、核苷酸。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据婴儿的矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。冲调方法：冲调时请用本品附带的专用量匙，4 平匙本品（约 15g）需用 90mL 温开水（40～45℃）冲调成标准冲调液。

【净含量和规格】400g

【保质期】12 个月

【贮存条件】请将本品置于阴凉干燥通风处，常温保存，勿放于冰箱内。每次使用后请将封盖盖紧，并在 28 日内食用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。

4. 对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食品是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。
5. 6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
6. 根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方食品或配合添加辅助食品。
7. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。冲调本品时，请保证环境及操作过程的卫生。
8. 配方粉冲调后应立即给婴儿喂哺。未喝完的奶液请丢弃，勿留于下次食用。
9. 本产品标准冲调液的渗透压约为 325mOsmol/kg ，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。