

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230059

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品

宜品怡贝

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】乳糖、食用植物油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油）、水解乳清蛋白粉、麦芽糊精、固体玉米糖浆、无水奶油、低聚果糖、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、抗坏血酸棕榈酸酯、单，双甘油脂肪酸酯、碳酸钾、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2140	279	100
蛋白质(g)	10.6	1.38	0.50
脂肪(g)	27.1	3.54	1.27
亚油酸(g)	4.20	0.55	0.20
α -亚麻酸(mg)	420	54.8	19.6
亚油酸与 α -亚麻酸比值(%)	10:1	10:1	10:1
碳水化合物(g)	55.8	7.28	2.61

维生素 A(μ g RE)	421	54.9	19.7
维生素 D(μ g)	6.68	0.87	0.31
维生素 E(mg α -TE)	5.42	0.71	0.25
维生素 K ₁ (μ g)	56.9	7.43	2.66
维生素 B ₁ (μ g)	508	66.3	23.7
维生素 B ₂ (μ g)	860	112	40.2
维生素 B ₆ (μ g)	268	35.0	12.5
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.75	0.23	0.082
烟酸(μ g)	4400	574	206
叶酸(μ g)	85.2	11.1	3.98
泛酸(μ g)	2400	313	112
维生素 C(mg)	68.5	8.94	3.20
生物素(μ g)	12.7	1.66	0.59
钠(mg)	175	22.8	8.18
钾(mg)	400	52.2	18.7
铜(μ g)	312	40.7	14.6
镁(mg)	42.1	5.49	1.97
铁(mg)	4.05	0.53	0.19
锌(mg)	3.26	0.43	0.15
锰(μ g)	35.8	4.67	1.67
钙(mg)	388	50.6	18.1
磷(mg)	246	32.1	11.5
碘(μ g)	82.5	10.8	3.86
氯(mg)	380	49.6	17.8
硒(μ g)	14.5	1.89	0.68
胆碱(mg)	120	15.7	5.60
肌醇(mg)	27.7	3.61	1.29

牛磺酸(mg)	28.3	3.69	1.32
左旋肉碱(mg)	10.2	1.33	0.48
二十二碳六烯酸(mg)	73.6	9.60	3.44
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.27	0.27	0.27
二十碳四烯酸(mg)	100	13.1	4.67
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.37	0.37	0.37
低聚果糖(g)	1.00	0.13	0.05
核苷酸(mg)	24.3	3.17	1.14

备注：每 100mL 标准冲调液含 13.05g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】 本品是将乳清蛋白粉加工分解成小分子乳蛋白、肽段和氨基酸，适用于乳蛋白过敏高风险婴儿。添加了二十二碳六烯酸（DHA）、二十碳四烯酸（ARA）、胆碱、核苷酸和动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 0~12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】 口服，食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：冲调时请使用所附专用量匙，量取 90mL 温水（40℃~45℃），加入 3 匙（约 13.05g）本品（1 平匙约含 4.35g 配方粉），配制标准冲调液。**1.**冲调前应将手彻底洗净；**2.**将所有的哺喂器具放入清水中煮沸 5 分钟以上；**3.**将冲调用水煮沸，使其冷却至 40℃~45℃，在奶瓶中加入适量的冲调用水；**4.**使用专用量匙量取正确量的配方粉加入到奶瓶中；**5.**盖紧瓶盖，轻摇至配方粉充分溶解，当液体温度适宜时即可喂哺。注意：为保持动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 活性，请使用 45℃以下温开水冲调。

【净含量和规格】 800g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 置于阴凉干燥处存放，食用后盖上盖子。开罐后，请在 4 周内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.本品可以作为单一营养来源满足 6 月龄以下目标人群的营养需求。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
- 5.未经医生或临床营养师建议请勿擅自改变液体的浓度，浓度不恰当婴儿得不到适当的营养。配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 6.使用期间应避免污染，食用剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。