

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20175003

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方粉

菁挚呵护

Eleva care

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】乳糖，麦芽糊精，水解乳清蛋白粉（占总配料的 16%），大豆油，白砂糖，葵花籽油，椰子油，氯化钾，磷酸二氢钾，柠檬酸钙，柠檬酸钠，磷酸三钙，花生四烯酸油脂（AA，高山被孢霉来源），氯化镁，氯化胆碱，氢氧化钾，二十二碳六烯酸油脂（DHA，寇氏隐甲藻来源），L-抗坏血酸，氢氧化钙，牛磺酸，硫酸亚铁，肌醇，5’单磷酸胞苷，5’-尿苷酸二钠，5’-鸟苷酸二钠，dl-α-醋酸生育酚，硫酸锌，左旋肉碱，抗坏血酸棕榈酸酯，5’单磷酸腺苷，柠檬酸钾，混合生育酚浓缩物，D-泛酸钙，烟酰胺，氯化钠，硫酸铜，棕榈酸维生素 A，核黄素，盐酸硫胺素，盐酸吡哆醇，硫酸锰，叶黄素（万寿菊来源），碘化钾，叶酸，β-胡萝卜素，亚硒酸钠，植物甲萘醌，D-生物素，维生素 D₃，氰钴胺。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2152	286	100.0
蛋白质(g)	11.75	1.56	0.546
脂肪(g)	27.54	3.66	1.280
亚油酸(g)	3.99	0.53	0.185
α-亚麻酸(mg)	497	66	23.08
亚油酸与 α-亚麻酸比值	8:1	8:1	8:1

碳水化合物(g)	54. 87	7. 29	2. 549
维生素 A(μ g RE)	371	49	17. 13
维生素 D(μ g)	9. 22	1. 23	0. 430
维生素 E(mg α - TE)	12. 6	1. 7	0. 594
维生素 K ₁ (μ g)	28. 6	3. 8	1. 329
维生素 B ₁ (μ g)	436	58	20. 28
维生素 B ₂ (μ g)	542	72	25. 17
维生素 B ₆ (μ g)	241	32	11. 19
维生素 B ₁₂ (μ g)	2. 26	0. 30	0. 105
烟酸(μ g)	1941	258	90. 21
叶酸(μ g)	75	10	3. 497
泛酸(μ g)	2588	344	120. 3
维生素 C(mg)	102. 3	13. 6	4. 755
生物素(μ g)	11. 3	1. 5	0. 524
钠(mg)	203	27	9. 441
钾(mg)	677	90	31. 47
铜(μ g)	293	39	13. 64
镁(mg)	31. 6	4. 2	1. 469
铁(mg)	6. 25	0. 83	0. 290
锌(mg)	3. 16	0. 42	0. 147
锰(μ g)	98	13	4. 545
钙(mg)	331	44	15. 38
磷(mg)	226	30	10. 49
碘(μ g)	99. 3	13. 2	4. 615
氯(mg)	331	44	15. 38
硒(μ g)	18. 1	2. 4	0. 839
胆碱(mg)	112. 9	15. 0	5. 245

肌醇(mg)	26.9	3.6	1.250
牛磺酸(mg)	33.4	4.4	1.552
左旋肉碱(mg)	9.8	1.3	0.454
二十二碳六烯酸(mg)	57	8	2.640
二十二碳六烯酸/(%总脂肪酸)	0.2	0.2	0.2
二十碳四烯酸(mg)	105	14	4.874
二十碳四烯酸/(%总脂肪酸)	0.4	0.4	0.4
叶黄素(μg)	83	11	3.846
核苷酸(mg)	54.2	7.2	2.517
β-胡萝卜素(μg)	53	7	2.448

备注：每 60mL 温开水冲调 1 量匙（置于罐内）本品，每 100mL 冲调液含 13.29 克配方粉。

【配方特点/营养学特征】乳蛋白部分水解配方，预先将乳蛋白分解为较小的分子，降低婴儿乳蛋白过敏的风险，帮助吸收。含有二十二碳六烯酸（DHA）、含有胆碱、含有叶黄素。

【组织状态】粉状

【适用人群】0-12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】本品建议口服。0-6 月的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本品。对于 6 月龄以上较大婴儿，可用杯子喂哺，可与谷类或其他固体食物混合喂哺。请使用煮沸过 5 分钟并冷却至约 40℃ 的温开水冲调，并遵照说明冲调。如需一次冲调多餐，必须将配方液冷藏于 2-4℃ 条件下，并于 24 小时内食用完。配方液应在 1 小时内喂哺完，喂哺后若有剩余，请丢弃。

建 议 喂 哺 表	婴儿年龄	每次喂哺量		每 24 小时喂哺次数
		煮沸过的温开水（毫升）	量匙数量	
	0-2 周	60	1	8-10
	2 周-2 月	120	2	6-7
	2 月-6 月	180	3	5-6

	6 月-12 月	180	3	4-5
--	----------	-----	---	-----

每个婴儿的情况都可能有所不同，以上喂哺表仅供参考，请在医生或临床营养师指导下使用。

冲调方法：**1.** 彻底洗净冲调的所有用具。**2.** 冲净后放入水中煮沸消毒至少**5**分钟。**3.** 请在清洁的桌面上冲调。**4.** 将水煮沸**5**分钟后冷却备用。**5.** 将正确份量的温开水倒入已消毒的用具中。**6.** 用本品中附赠的量匙量取本品，用清洁的刀沿量匙口刮平。**7.** 每**60**毫升温开水冲调**1**量匙本品。**8.** 摇动至本品完全溶解。测试温度并给婴儿喂食。**9.** 配方液应在**1**小时内喂哺完，剩余的配方液请丢弃。

【净含量和规格】 360 克，820 克

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 本品未开罐时可放于室温下。开封后的产品需盖紧罐盖，贮藏在阴凉干燥的条件下（无需放入冰箱冷藏）。开封后，请务必于三周内食用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 本品可作为 0-6 月龄适用人群唯一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合液体辅助食品。
3. 本品不适用于非目标人群使用，不适用于患有半乳糖血症的婴儿。
4. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
5. 不恰当的冲调不利于婴儿的健康。冲调本品时，请保证环境及操作过程的卫生，否则可能会导致不良的后果。
6. 勿用微波炉加热，以免烫伤。
7. 被确诊为乳蛋白过敏的婴儿，使用本品前请咨询医生。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。