

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185002

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方粉

亲舒

EnfaGentlease

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】固体玉米糖浆、水解牛奶蛋白、棕榈油、大豆油、椰子油、葵花籽油、棕榈酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘化钠、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2154	284	100
蛋白质(g)	11.7	1.54	0.54
脂肪(g)	28	3.7	1.30
亚油酸(g)	4.2	0.55	0.19
α -亚麻酸(mg)	380	50	18
亚油酸与 α -亚麻酸比值	11:1	11:1	11:1
碳水化合物(g)	54	7.1	2.5
维生素 A(μ g RE)	460	61	21
维生素 D(μ g)	6.6	0.87	0.31

维生素 E(mg α - TE)	6.8	0.9	0.32
维生素 K ₁ (μg)	46	6.1	2.1
维生素 B ₁ (μg)	430	57	20
维生素 B ₂ (μg)	770	102	36
维生素 B ₆ (μg)	310	41	14.4
维生素 B ₁₂ (μg)	1.12	0.15	0.052
烟酸(μg)	4700	620	218
叶酸(μg)	82	10.8	3.8
泛酸(μg)	2700	356	125
维生素 C(mg)	66	8.7	3.1
生物素(μg)	15.3	2	0.7
钠(mg)	179	24	8
钾(mg)	640	84	30
铜(μg)	380	50	17.6
镁(mg)	41	5.4	1.9
铁(mg)	6.1	0.81	0.28
锌(mg)	5.1	0.67	0.24
锰(μg)	92	12.1	4.3
钙(mg)	420	55	19
磷(mg)	230	30	11
钙磷比值	1.8:1	1.8:1	1.8:1
碘(μg)	87	11.5	4.0
氯(mg)	360	48	17
硒(μg)	13.8	1.82	0.64
胆碱(mg)	122	16.1	5.7
肌醇(mg)	26	3.4	1.2
牛磺酸(mg)	31	4	1.44

左旋肉碱(mg)	10.2	1.35	0.5
二十碳四烯酸(mg)	173	23	8.0
二十碳四烯酸 (%总脂肪酸)	0.62	0.62	0.62
二十二碳六烯酸 (mg)	87	11.5	4.0
二十二碳六烯酸 (%总脂肪酸)	0.31	0.31	0.31

备注：每 100mL 配方奶约含 13.2g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】本品以水解牛奶蛋白作为蛋白质来源，牛奶蛋白经加工分解成小分子乳蛋白、肽段和氨基酸。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】本品为口服。食用量和食用方法应在医生或临床营养师的指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：标准冲调液是由 1 平匙（约 4.4g）配方粉加 30mL 温开水冲调而成。配制本品时应用罐内所附的专用量匙。（1）冲调配方粉前应使用肥皂和清水将手彻底洗净。（2）将洗净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具用沸水煮沸 5 分钟杀菌。（3）将水煮沸 5 分钟，冷却至 40℃预备使用。（4）依据医生或临床营养师推荐的用量，参照冲调方法将需要的水量倒入奶瓶。（5）盖紧奶瓶，摇匀。（6）使用后的量匙保持干燥放回罐中。冲调后配方奶应立即给婴儿喂哺，如果 1 小时内不能喂哺完，请将剩余的配方奶倒掉。冲调后如不能马上予以喂哺，应盖紧奶瓶并储存在温度为 2~4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过 24 小时。如冲调后的配方奶超过 2 小时未予以冷藏，则不能再使用。不要把冲调好的配方奶冻结。

【净含量和规格】370g，400g，850g

【保质期】24 个月

【贮存条件】室温下阴凉干燥处储存。用后请将罐盖盖紧，开封后 1 个月内用完。请勿冷冻配方粉，并避免长时间储存于过高的温度下。请在罐底标示的产品保质期内使用此产品。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.0~6 月龄特殊医学状况婴儿食用本品时，可作为单一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
- 5.被确诊为乳蛋白过敏的婴儿，使用本品前请咨询医生。
- 6.该品不是无菌制品，除非有医生的指导和监督，不得给早产儿或可能有免疫问题的婴儿使用。
- 7.不得使用微波炉加热冲调好的配方奶，以免烫伤。
- 8.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 9.如包装有任何破损（包括铝箔），请勿使用。
- 10.本品标准冲调液的渗透压约为 **238mOsmol/kg**，供使用参考。
- 11.母乳喂养是首选。根据您宝宝的成长，请咨询医生关于宝宝辅助食品的添加问题。
- 12.本品乳糖含量约为 **8.5g/100g**，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。