

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185006

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

早瑞能恩

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】脱脂巴氏杀菌乳、乳清、麦芽糊精、植物油（中链甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、棕榈油）、乳清蛋白粉、乳糖、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸三钙、碘化钾、硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、L-胱氨酸、L-精氨酸、L-组氨酸、5' 单磷酸胞苷、5' 单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2084	336	100
蛋白质(g)	14.4	2.32	0.69
脂肪(g)	25.9	4.17	1.24
亚油酸(g)	3.878	0.62	0.19
α-亚麻酸(mg)	438	70.52	21.02
碳水化合物(g)	51.825	8.34	2.49
维生素 A(μg RE)	1210	194.81	58.06
维生素 D(μg)	13.3	2.14	0.64
维生素 E(mg α-	14	2.25	0.67

TE)			
维生素 K ₁ (μg)	28	4. 51	1. 34
维生素 B ₁ (μg)	750	120. 75	35. 99
维生素 B ₂ (μg)	1100	177. 1	52. 78
维生素 B ₆ (μg)	670	107. 87	32. 15
维生素 B ₁₂ (μg)	2. 1	0. 338	0. 101
烟酸(μg)	10000	1610	479. 85
叶酸(μg)	300	48. 3	14. 4
泛酸(μg)	4800	772. 8	230. 33
维生素 C(mg)	124. 5	20. 04	5. 97
生物素(μg)	20	3. 22	0. 96
钠(mg)	269	43. 31	12. 91
钾(mg)	605	97. 41	29. 03
铜(μg)	770	123. 97	36. 95
镁(mg)	50	8. 05	2. 4
铁(mg)	9. 4	1. 51	0. 45
锌(mg)	5. 6	0. 9	0. 27
锰(μg)	50	8. 05	2. 4
钙(mg)	760	122. 36	36. 47
磷(mg)	445	71. 65	21. 35
碘(μg)	136	21. 9	6. 53
氯(mg)	430	69. 23	20. 63
硒(μg)	11. 2	1. 8	0. 54
胆碱(mg)	60	9. 66	2. 88
肌醇(mg)	55	8. 86	2. 64
牛磺酸(mg)	32	5. 15	1. 54
左旋肉碱(mg)	8. 2	1. 32	0. 39
二十二碳六烯酸	90	14. 49	4. 32

(mg)			
二十碳四烯酸(mg)	90	14.49	4.32
核苷酸(mg)	14.6	2.35	0.7

备注：1 平匙配方粉为 5.36g，100mL 标准冲调液由 90mL 水加入 16.1g 配方粉制成。

【配方特点/营养学特征】本品中链甘油三酯（MCT）添加量约为 7g/100g，中链脂肪约占总脂肪的 27%。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服，食用量和食用方法应在医生或临床营养师的指导下，根据适用人群的矫正月龄、体重和医学状况等情况确定。冲调方法：冲调时应使用罐内所附的专用量匙。每次只冲调一次用量，调好后应立即饮用。

【净含量和规格】400g

【保质期】24 个月

【贮存条件】放置于阴凉干燥的地方, 开封后请在 3 周内用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
3. 不适用于非目标人群使用。
4. 本产品标准冲调液的渗透压约为 239mOsm/L，供使用参考。
5. 对于 0-6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。
6. 根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方食品或配合添加辅助食品。
7. 6 月龄前可作为早产/低出生体重婴儿单一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
8. 奶瓶放置区域应保持清洁。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不正确的冲调方法、配制不当和使用不当可能引起婴儿得不到适量的营养或导致脱水的危害。
9. 喂哺过程中应始终抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息。
10. 禁忌症：禁用于乳糖不耐受、半乳糖血症或葡萄糖半乳糖吸收不良或对牛奶蛋白过敏的

婴儿。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。