

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185009

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方粉

雅培喜康宝

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】乳糖、脱脂奶粉、浓缩乳清蛋白粉、大豆油、中链甘油三酯、葵花籽油、低聚半乳糖、椰子油、固体葡萄糖浆、棕榈酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、氯化钠、磷酸氢二钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸三钙、碳酸钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、叶黄素、5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、 β -胡萝卜素、氢氧化钾。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2146	311	100.0
蛋白质(g)	13.45	1.95	0.627
脂肪(g)	28.21	4.09	1.315
亚油酸(g)	3.75	0.54	0.175
α -亚麻酸(mg)	421	61	19.62
亚油酸与 α -亚麻酸比值	11: 1	11: 1	11: 1
碳水化合物(g)	50.14	7.27	2.336
维生素 A(μ g RE)	528	77	24.60
维生素 D(μ g)	7.42	1.08	0.346

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	6.9	1.0	0.322
维生素 K ₁ (μ g)	48.3	7.0	2.251
维生素 B ₁ (μ g)	483	70	22.51
维生素 B ₂ (μ g)	1103	160	51.40
维生素 B ₆ (μ g)	414	60	19.29
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.59	0.23	0.074
烟酸(μ g)	4276	620	199.3
叶酸(μ g)	97	14	4.520
泛酸(μ g)	4207	610	196.0
维生素 C(mg)	96.6	14.0	4.501
生物素(μ g)	21.0	3.0	0.979
钠(mg)	135	20	6.291
钾(mg)	665	96	30.99
铜(μ g)	310	45	14.45
镁(mg)	57.5	8.3	2.679
铁(mg)	5.62	0.81	0.262
锌(mg)	5.00	0.73	0.233
锰(μ g)	41	6	1.911
钙(mg)	517	75	24.09
磷(mg)	317	46	14.77
碘(μ g)	69.0	10.0	3.215
氯(mg)	325	47	15.14
硒(μ g)	12.6	1.8	0.587
胆碱(mg)	92.4	13.4	4.306
肌醇(mg)	31.0	4.5	1.445
牛磺酸(mg)	33.6	4.9	1.566
左旋肉碱(mg)	15.9	2.3	0.741

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
二十二碳六烯酸(mg)	54	8	2.516
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.2	0.2	0.2
二十碳四烯酸(mg)	108	16	5.033
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.4	0.4	0.4
低聚半乳糖(g)	2.50	0.36	0.116
叶黄素(μg)	76	11	3.541
核苷酸(mg)	49.6	7.2	2.311
β-胡萝卜素(μg)	262	38	12.21

备注：每 60mL 温开水冲调 1 量匙（置于罐内）本品，每 100mL 冲调液含 14.5g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】本品适用于早产/低出生体重婴儿，帮助提供早产/低出生体重婴儿出生后追赶生长所需的能量、蛋白质、维生素和矿物质。本品含核苷酸、二十二碳六烯酸及叶黄素。本品添加了中链甘油三酯，添加量为 71.9g/kg。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】1.食用方法：本品为口服。

冲调方法：标准冲调液是由 1 量匙（约 9.8g）配方粉加 60ml 温开水冲调而成。

冲调步骤：（1）彻底洗净冲调的所有用具，例如奶瓶、奶嘴和瓶盖，洗净后放入水中煮沸消毒至少 5 分钟；（2）请在清洁的桌面上冲调；（3）请使用煮沸过 5 分钟并冷却至约 40℃的温开水冲调，依据医生或临床营养师推荐的用量，将正确份量的本品加入温开水中，请使用本品中专用量匙量取本品，并用清洁的刀沿量匙口刮平；（4）摇动奶瓶至本品完全溶解，测试温度并给婴儿喂食。

注意事项：对于冲调的单次喂养的配方液应在 1 小时内喂哺完，剩余的配方液应丢弃；如需一次冲调多餐，必须将配方液于 2~4℃条件下冷藏不超过 24 小时，喂养前可将配方液温热至不超过 40℃并于 1 小时内喂哺完，剩余的配方液应丢弃。

2.食用量：在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

【净含量和规格】370g

【保质期】24 个月

【贮存条件】本品未开罐时可放于室温下。开封后的产品需盖紧罐盖，贮藏在阴凉干燥的条

件下（无需放入冰箱冷藏）。开封后，请务必于 3 周内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 3.本品不适用于非目标人群使用。
- 4.对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。
- 5.6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
- 6.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方奶粉或配合添加辅助食品。
- 7.本品勿用微波炉加热，以免烫伤。
- 8.不恰当的冲调不利于婴儿的健康。冲调配方粉时，请保证环境及操作过程的卫生，否则可能会导致不良的后果。
- 9.本品标准冲调液的渗透压约为 269mOsmol/L，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。