

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185013

特殊医学用途婴儿营养补充剂

喜康宝贝添

Similac HMFortifi

【产品类别】母乳营养补充剂

【配料表】浓缩脱脂牛奶，浓缩乳清蛋白粉，淀粉糖，矿物质（磷酸三钙，柠檬酸钾，氯化镁，氯化钠，硫酸锌，柠檬酸钠，硫酸亚铁，硫酸铜，硫酸锰，硒酸钠），中链甘油三酯（MCT，占总配料 9.7%），维生素（L-抗坏血酸，肌醇，烟酰胺，d-α-醋酸生育酚，D-泛酸钙，棕榈酸维生素 A，核黄素，盐酸硫胺素，盐酸吡哆醇，维生素 D₃，D-生物素，叶酸，植物甲萘醌，氰钴胺），磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ	每份
能量(kJ)	1627	100	14.75
蛋白质(g)	27.8	1.7	0.25
脂肪(g)	10.0	0.61	0.09
碳水化合物(g)	50	3.1	0.45
维生素 A(μg RE)	5167	315	46.5
维生素 D(μg)	83.5	5.1	0.75
维生素 E(mg α-TE)	59.7	3.6	0.5
维生素 K ₁ (μg)	230.6	14.2	2.1
维生素 B ₁ (μg)	6470	395	58
维生素 B ₂ (μg)	11583	705	104
维生素 B ₆ (μg)	5861	359	53

营养成分	每 100g	每 100kJ	每份
维生素 B ₁₂ (μg)	17.78	1.1	0.16
烟酸(μg)	99170	6054	893
叶酸(μg)	639	39	5.75
泛酸(μg)	41700	2542	375
维生素 C(mg)	694	43	6.3
生物素(μg)	722	44	6.5
钠(mg)	444	27	4
钾(mg)	1780	109	16
铜(μg)	4780	294	43
镁(mg)	188	11.6	1.7
铁(mg)	8.89	0.55	0.08
锌(mg)	27.8	1.7	0.25
锰(μg)	200	12.2	1.8
钙(mg)	3220	198	29
磷(mg)	1780	109	16
氯(mg)	1000	61	9
硒(μg)	11.1	0.7	0.1
肌醇(mg)	111	6.82	1

备注：每份指每袋本品（0.9g）。

【配方特点/营养学特征】本品为补充早产/低出生体重婴儿母乳营养素的不足而设计，配方中添加优质蛋白质、容易消化吸收的中链甘油三酯、淀粉糖、多种维生素和矿物质，与母乳配合使用可帮助满足早产/低出生体重婴儿追赶生长的营养需要。每袋本品（0.9g）可提供14.75kJ能量，0.25g优质蛋白质，0.09g脂肪（脂肪主要来源为中链甘油三酯），以及维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素C、B族维生素、钙、磷、镁等营养素。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】包装开封：请沿易撕线撕开。

在冲调本母乳营养补充剂时，请保证环境及操作过程的卫生，否则可能会导致不良的后果。

1. 轻摇放置母乳的容器。
2. 将适量的母乳倒入消毒容器。
3. 建议冲调比例为一袋本品加入 50mL 母乳（如需酌量增加本品使用量，请在医生指导下进行）。
4. 轻轻摇匀后进行喂食。
5. 每日或每餐食用量参照医生或临床营养师的指导。
6. 本品添加在母乳后可用于口服或管饲。
7. 管饲用法及用量应在医生或临床营养师指导下根据适用人群的年龄、体重和医学状况综合决定。

【净含量和规格】 45g (0.9g × 50)

【保质期】 18 个月

【贮存条件】 冲调好但未能及时使用的强化后母乳应立即封存。奶液必须冷藏于 2°C 至 4°C 条件下，并在 24 小时内食用完毕，或按照医院母乳处置程序处理。用前轻轻摇匀。未开封的包装可放于室温下，但应避免在低于 0°C 或高于 35°C 的条件下储存。

【警示说明和注意事项】

1. 粉状婴儿配方产品并非无菌制品，如需用于可能有免疫缺陷的早产儿，请务必在医生的指导下和监督下使用。请遵照产品使用说明使用本品，不当稀释可能引发疾病。不恰当的冲调不利于婴儿的健康。请在医生或临床营养师指导下使用，不适用于非目标人群使用，本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射，6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
2. 不可作为唯一营养来源，应配合母乳使用。管饲系统应当正确使用。
3. 每袋本品(0.9g) 溶于 50mL 去离子水中的渗透压约为 42 mOsm/kg H₂O，该数值仅供参考，本品的正确使用方法为直接加入母乳中摇匀后进行喂食。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。