

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20190006

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

力诺康宁

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】固体玉米糖浆、葡萄糖浆、植物油（玉米油、菜籽油、椰子油）、分离乳清蛋白粉、酪蛋白、中链甘油三酯、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、L-肉碱酒石酸盐、叶黄素、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5’-单磷酸腺苷、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、5’-尿苷酸二钠、5’-胞苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2066	275	100
蛋白质(g)	11.41	1.52	0.55
脂肪(g)	24.27	3.23	1.17
亚油酸(g)	3.20	0.43	0.15
α-亚麻酸(mg)	320	43	15
碳水化合物(g)	57.3	7.6	2.8
维生素 A(μg RE)	442	59	21
维生素 D(μg)	6.30	0.84	0.30
维生素 E(mg α-	3.72	0.49	0.18

TE)			
维生素 K ₁ (μg)	32.0	4.3	1.5
维生素 B ₁ (μg)	330	44	16
维生素 B ₂ (μg)	500	67	24
维生素 B ₆ (μg)	285.0	37.9	13.8
维生素 B ₁₂ (μg)	1.200	0.160	0.058
烟酸(烟酰胺)(μg)	2200	293	106
叶酸(μg)	62.0	8.2	3.0
泛酸(μg)	2500	333	121
维生素 C(mg)	63.0	8.4	3.0
生物素(μg)	12.0	1.6	0.6
钠(mg)	124	16	6
钾(mg)	332	44	16
铜(μg)	232.5	30.9	11.3
镁(mg)	31.0	4.1	1.5
铁(mg)	2.60	0.35	0.13
锌(mg)	3.10	0.41	0.15
锰(μg)	30.0	4.0	1.5
钙(mg)	300	40	15
磷(mg)	200	27	10
碘(μg)	62.0	8.2	3.0
氯(mg)	280	37	14
硒(μg)	12.60	1.68	0.61
胆碱(mg)	60.0	8.0	2.9
肌醇(mg)	30.0	4.0	1.5
牛磺酸(mg)	23.00	3.06	1.11
左旋肉碱(mg)	8.50	1.13	0.41
叶黄素(μg)	63.0	8.4	3.0

二十二碳六烯酸 (DHA)(mg)	47.93	6.37	2.32
二十二碳六烯酸 (DHA)(%总脂肪酸)	0.209	0.209	0.209
二十碳四烯酸 (ARA) (mg)	72.02	9.58	3.49
二十碳四烯酸 (ARA)(%总脂肪酸)	0.314	0.314	0.314
核苷酸(mg)	25.0	3.3	1.2

备注：每 100mL 配方奶约含 13.3g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】本产品为无乳糖配方食品，适合乳糖不耐受婴儿食用。产品以其他碳水化合物完全代替乳糖，乳糖含量<0.5g/100g；蛋白质由乳蛋白提供。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】本品应在医生或临床营养师指导下使用。食用方法：依照以下调配方法配制后口服喂养。**1.**洗净调奶用具；**2.**冲净后放入水中煮沸 5 分钟消毒，然后盖好盖子直至使用时；**3.**将水煮沸，冷却至 40~60℃左右的温开水备用，将正确份量的温开水倒入已消毒的奶瓶中；**4.**用量勺取粉时自然刮平，按正确的添加量，将奶粉倒入奶瓶中；**5.**盖上瓶盖，轻轻摇动至奶粉溶解，待奶温度适中（将奶液滴于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度），方可食用。食用量：食用量建议表是推荐食用量，可根据婴儿的生长情况咨询医护人员酌情增减。

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水（mL）	奶粉（平匙数）	奶粉（次）
0~2 周	90	3	6~7
2~4 周	120	4	5
1~2 月	150	5	5
2~4 月	180	6	5
4~6 月	210	7	5
6~12 月	210	7	3~4

一平匙奶粉约为 **4.5g**。请参照食用量建议表的冲调比例进行冲调，不恰当的冲调浓度不利于婴儿的健康，如无医嘱，请勿改变奶液浓度。奶液放置时间超过一个小时应丢弃。

【净含量和规格】 360g, 400g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 置于阴凉干燥处贮存。开启后请务必将罐盖紧，并于 **1** 个月内食用完毕，开罐后请勿放入冰箱。请在保质期内食用本产品。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 5.对于 **0~6** 月龄的乳糖不耐受婴儿，本品可作为单一营养来源单独食用；**6** 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。