

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20195001

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

早启能恩

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】乳糖、植物油（葵花籽油、棕榈油、低芥酸菜籽油、椰子油）、麦芽糊精、乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、氯化钙、磷酸三钙、碘化钾、硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、L-精氨酸、柠檬酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2122	306	100
蛋白质(g)	14.2	2.04	0.67
脂肪(g)	26.36	3.8	1.24
亚油酸(g)	3	0.43	0.14
α -亚麻酸(mg)	420	60.48	19.79
碳水化合物(g)	53.24	7.67	2.51
维生素 A(μ g RE)	570	82.08	26.86
维生素 D(μ g)	6.6	0.95	0.31
维生素 E(mg α -TE)	7.6	1.09	0.36

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
维生素 K ₁ (μg)	35	5. 04	1. 65
维生素 B ₁ (μg)	680	97. 92	32. 05
维生素 B ₂ (μg)	1100	158. 4	51. 84
维生素 B ₆ (μg)	450	64. 8	21. 21
维生素 B ₁₂ (μg)	1. 5	0. 216	0. 071
烟酸(μg)	5070	730. 08	238. 93
叶酸(μg)	88	12. 67	4. 15
泛酸(μg)	4000	576	188. 5
维生素 C(mg)	67	9. 65	3. 16
生物素(μg)	12. 1	1. 74	0. 57
钠(mg)	240	34. 56	11. 31
钾(mg)	532	76. 61	25. 07
铜(μg)	410	59. 04	19. 32
镁(mg)	60	8. 64	2. 83
铁(mg)	5. 32	0. 77	0. 25
锌(mg)	5. 4	0. 78	0. 25
锰(μg)	70	10. 08	3. 3
钙(mg)	558	80. 35	26. 3
磷(mg)	330	47. 52	15. 55
碘(μg)	100	14. 4	4. 71
氯(mg)	334	48. 1	15. 74
硒(μg)	14. 5	2. 09	0. 68
胆碱(mg)	72	10. 37	3. 39
肌醇(mg)	70	10. 08	3. 3
牛磺酸(mg)	32	4. 61	1. 51
左旋肉碱(mg)	8. 1	1. 17	0. 38
二十二碳六烯酸(mg)	90	12. 96	4. 24

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
二十碳四烯酸(mg)	90	12.96	4.24
核苷酸(mg)	14.9	2.15	0.7

备注：1 平匙奶粉=4.799g，100mL 标准奶液=90mL 水+14.4g 奶粉（3 平匙）。

【配方特点/营养学特征】本品采用蛋白酶水解工艺，使大分子乳清蛋白分解为小分子乳清蛋白、肽段和氨基酸。添加了动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12（含量不少于 10^6 CFU/g）。同时，针对早产/低出生体重婴儿追赶生长的特殊营养需求，将标准冲调液的能量设定为 306kJ/100mL（73kcal/100mL）。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服，食用方法和食用量应在医生或临床营养师的指导下，依据适用人群的矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。冲调方法：冲调时应使用罐内所附的专用量匙。每次只冲调一次用量，调好后应立即饮用。

注意事项：

- 1.为了保持动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 的活性，煮沸的水应冷却至体温，再加入奶粉。
- 2.调奶时只可用罐内所附的专用量匙，调奶时水和奶粉份量要准确，用少于或多于指定份量的配方粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变浓度。

【净含量和规格】400g

【保质期】24 个月

【贮存条件】放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在 3 周内用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.本品（标准冲调液）的渗透压约为 261mOsm/L，供使用参考。
- 5.对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。
- 6.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方食品或配合添加辅助食品。

7.本品可作为6月龄前早产/低出生体重婴儿单一营养来源单独食用；6月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

8.每次只调配一次用量，调好的奶应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。奶瓶放置区域应保持清洁。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不正确的冲调方法，均会引起婴儿不适。配制不当和使用不当可能引起婴儿得不到适量的营养或导致脱水等。

9.喂哺过程中应始终抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息。

10.禁用于对牛奶蛋白过敏、乳糖不耐受、半乳糖血症或葡萄糖半乳糖吸收不良的婴儿。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。