

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20195002

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品

超启能恩

NAN H.A.

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】乳糖、植物油（葵花籽油、椰子油、低芥酸菜籽油）、乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸三钙、碘化钾、硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5’单磷酸胞苷、5’单磷酸腺苷、5’-鸟苷酸二钠、5’-尿苷酸二钠、L-缬氨酸、L-酪氨酸、L-苯丙氨酸、L-组氨酸、柠檬酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2146	280	100
蛋白质(g)	9.75	1.27	0.45
脂肪(g)	26	3.4	1.21
亚油酸(g)	3.2	0.42	0.15
α-亚麻酸(mg)	380	49.67	17.71
碳水化合物(g)	59.9	7.83	2.79
维生素 A(μg RE)	459	59.99	21.39
维生素 D(μg)	6.8	0.89	0.32
维生素 E(mg α-	10	1.31	0.47

TE)			
维生素 K ₁ (μg)	27	3. 53	1. 26
维生素 B ₁ (μg)	500	65. 35	23. 3
维生素 B ₂ (μg)	1250	163. 38	58. 25
维生素 B ₆ (μg)	360	47. 05	16. 78
维生素 B ₁₂ (μg)	0. 96	0. 125	0. 045
烟酸(μg)	5400	705. 78	251. 63
叶酸(μg)	81	10. 59	3. 77
泛酸(μg)	4800	627. 36	223. 67
维生素 C(mg)	69	9. 02	3. 22
生物素(μg)	9. 7	1. 27	0. 45
钠(mg)	195	25. 49	9. 09
钾(mg)	570	74. 5	26. 56
铜(μg)	440	57. 51	20. 5
镁(mg)	52	6. 8	2. 42
铁(mg)	5. 3	0. 69	0. 25
锌(mg)	5	0. 65	0. 23
锰(μg)	95	12. 42	4. 43
钙(mg)	345	45. 09	16. 08
磷(mg)	192	25. 09	8. 95
碘(μg)	68	8. 89	3. 17
氯(mg)	380	49. 67	17. 71
硒(μg)	16	2. 09	0. 75
胆碱(mg)	46	6. 01	2. 14
肌醇(mg)	32	4. 18	1. 49
牛磺酸(mg)	28	3. 66	1. 3
左旋肉碱(mg)	9. 6	1. 25	0. 45
二十二碳六烯酸	60	7. 84	2. 8

(mg)			
二十碳四烯酸(mg)	60	7.84	2.8
核苷酸(mg)	15	1.96	0.7

备注：1 平匙奶粉=4.36g，100mL 标准奶液为 90mL 水加 13.07g 奶粉（约 3 平匙）

【配方特点/营养学特征】本品采用蛋白酶水解工艺，乳清蛋白经加工分解成小分子乳清蛋白、肽段和氨基酸。本品添加了动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12（含量不少于 10^6 CFU/g）。标准冲调液能量密度约为 67kcal/100mL。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方式：1. 为保持动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温。2. 每次只冲调一次用量，调好后应立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。奶瓶放置区域应保持清洁。3. 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。调奶时用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变浓度。

【净含量和规格】800g，400g，380g

【保质期】24 个月

【贮存条件】放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在 3 周内用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或者临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养。
- 5.本品可作为 0~6 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿单一营养来源单独食用。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。请注意添加任何食物，特别是婴儿谷物及含奶食品，应先咨询医生的意见。

- 6.对于已出现乳蛋白过敏的宝宝，使用本品前请先听取医生或者临床营养师的建议。
- 7.未经煮沸消毒的水、奶瓶或不正确的冲调方法，均会引起婴儿不适，贮存不当、配制不当和使用不当可能引起婴儿得不到适量的营养或导致脱水的危害。
- 8.喂奶时请抱着您的宝宝，如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
- 9.本品标准冲调液的渗透压约为 **332mOsm/kg**，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。