

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20195003

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

安儿宁能恩

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】葡萄糖浆、植物油（葵花籽油、椰子油、低芥酸菜籽油）、乳清蛋白粉、酪蛋白酸钾、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、磷酸二氢钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、氧化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、碘化钾、硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、L-苯丙氨酸、L-组氨酸、5’单磷酸胞苷、5’单磷酸腺苷、5’-鸟苷酸二钠、5’-尿苷酸二钠、磷脂、柠檬酸。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2127	281	100
蛋白质(g)	10.35	1.37	0.49
脂肪(g)	25.44	3.36	1.20
亚油酸(g)	4.1	0.54	0.19
α-亚麻酸(mg)	320	42.24	15.04
碳水化合物(g)	59.41	7.84	2.79
维生素 A(μg RE)	535	70.62	25.15
维生素 D(μg)	6.7	0.88	0.31
维生素 E(mg α-	6.5	0.86	0.31

TE)			
维生素 K ₁ (μg)	30	3.96	1.41
维生素 B ₁ (μg)	500	66	23.51
维生素 B ₂ (μg)	550	72.6	25.86
维生素 B ₆ (μg)	350	46.2	16.46
维生素 B ₁₂ (μg)	1	0.132	0.047
烟酸(μg)	5000	660	235.07
叶酸(μg)	80	10.56	3.76
泛酸(μg)	5200	686.4	244.48
维生素 C(mg)	87	11.48	4.09
生物素(μg)	11.4	1.5	0.54
钠(mg)	160	21.12	7.52
钾(mg)	500	66	23.51
铜(μg)	390	51.48	18.34
镁(mg)	32	4.22	1.5
铁(mg)	5.6	0.74	0.26
锌(mg)	4.1	0.54	0.19
锰(μg)	90	11.88	4.23
钙(mg)	318	41.98	14.95
磷(mg)	170	22.44	7.99
碘(μg)	70	9.24	3.29
氯(mg)	340	44.88	15.98
硒(μg)	12.8	1.69	0.60
胆碱(mg)	45	5.94	2.12
肌醇(mg)	35	4.62	1.65
牛磺酸(mg)	32	4.22	1.5
左旋肉碱(mg)	8.3	1.1	0.39
二十二碳六烯酸	56	7.39	2.63

(mg)			
二十碳四烯酸(mg)	56	7.39	2.63
核苷酸(mg)	15	1.98	0.71

备注：1 平匙奶粉=4.4g，100mL 标准奶液为 90mL 水加 13.2g 奶粉（约 3 平匙）。

【配方特点/营养学特征】本品标准冲调液能量密度约为 67kcal/100mL。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方式：冲调时应使用罐内所附的专用量匙。请在加入配方粉前，将水温冷却至体温。

每次只冲调一次用量，调好后应立即饮用，未喝完的奶液应丢弃。

【净含量和规格】400g

【保质期】24 个月

【贮存条件】放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 母乳是婴儿最好的食物，请尽可能的持续母乳喂养。
5. 本品可作为 0~6 月龄乳糖不耐受婴儿单一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
6. 奶瓶放置区域应保持清洁。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不正确的冲调方法、不恰当的贮存和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
7. 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息。
8. 禁忌症：禁用于半乳糖血症或葡萄糖半乳糖吸收不良的婴儿。
9. 配制不当和使用不当可能引起婴儿得不到适量的营养或导致脱水的危害，未经医生建议切勿改变浓度。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。