

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书
国食注字 TY20200006

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品
舒力乐

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】葡萄糖浆、植物油（玉米油、菜籽油、棕榈油、椰子油）、水解乳清蛋白粉、辛烯基琥珀酸淀粉钠、麦芽糊精、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、金枪鱼油、花生四烯酸油脂、低聚果糖、叶黄素、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、乳铁蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、柠檬酸脂肪酸甘油酯

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	2088	100
蛋白质(g)	12.0	0.57
脂肪(g)	25.0	1.2
亚油酸(g)	5.0	0.24
α -亚麻酸(mg)	500	23.9
亚油酸与 α -亚麻酸比值	10:1	10:1
碳水化合物(g)	56.0	2.7
维生素 A(μ g RE)	450	21.6
维生素 D(μ g)	7.0	0.34

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	6. 7	0. 32
维生素 K ₁ (μ g)	40. 0	1. 9
维生素 B ₁ (μ g)	500	23. 9
维生素 B ₂ (μ g)	800	38. 3
维生素 B ₆ (μ g)	300	14. 4
维生素 B ₁₂ (μ g)	1. 50	0. 070
烟酰胺(μ g)	3000	144
叶酸(μ g)	80. 0	3. 8
泛酸(μ g)	2800	134
维生素 C(mg)	70. 0	3. 4
生物素(μ g)	12. 0	0. 57
钠(mg)	136	6. 5
钾(mg)	500	23. 9
铜(μ g)	240	11. 5
镁(mg)	30. 0	1. 4
铁(mg)	4. 0	0. 19
锌(mg)	4. 0	0. 19
锰(μ g)	36. 0	1. 7
钙(mg)	300	14. 4
磷(mg)	200	9. 6
碘(μ g)	70. 0	3. 4
氯(mg)	330	15. 8
硒(μ g)	13. 2	0. 63
胆碱(mg)	80. 0	3. 8
肌醇(mg)	40. 0	1. 9
牛磺酸(mg)	30. 0	1. 4
左旋肉碱(mg)	8. 0	0. 38

营养成分	每 100g	每 100kJ
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.10	0.10
二十二碳六烯酸(mg)	26.0	1.20
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.20	0.20
二十碳四烯酸(mg)	52.0	2.50
低聚果糖(g)	0.80	0.04
叶黄素(μg)	50.0	2.4
核苷酸(mg)	30.0	1.4
乳铁蛋白(mg)	76.0	3.6

【配方特点/营养学特征】 本品是为满足乳蛋白过敏高风险婴儿的营养需求而设计的。产品配方采用的乳蛋白预先经加工水解成小分子乳蛋白、肽段和氨基酸。在医生或临床营养师的指导下，单独食用或与其它食物配合食用时，其能量和营养成分能够满足 0 月龄~6 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿的生长发育需求。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 0~12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】

食用方法：本品应在医生或临床营养师指导下口服食用，依照下方调配方法配制。

1. 洗净双手并清洁配制区域。将干净的奶瓶、奶嘴、瓶盖等用具放入沸水中煮沸 5 分钟，凉至室温。
2. 将饮用水煮沸 5 分钟并凉至 50℃左右，将所需份量的温水倒入已消毒的奶瓶。
3. 按照食用量，量取正确份量的产品倒入奶瓶。
4. 盖好瓶盖，摇晃奶瓶至产品完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧测试温度，以确定是否适合婴儿食用。

食用量：在医生或临床营养师指导下根据乳蛋白过敏高风险婴儿的个体情况综合确定食用量。

请使用贝因美产品专用红色量匙，一平匙产品（约 4.4 克）用 30 毫升温开水冲调。每 100 毫升标准冲调液中含有 13.2 克产品与 90 毫升水。

【净含量和规格】 400 克

【保质期】 24 个月

【贮存条件】请存放在清洁阴凉干燥处。开封后必须保证密封，建议在一个月内用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
5. 对于 0~6 月龄的乳蛋白过敏高风险婴儿，本品可作为单一营养来源单独食用。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。