

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20210003

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

甄而蔼

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】麦芽糊精、脱盐乳清粉、生牛乳、植物油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、乳清蛋白粉、中链甘油三酯、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5’-单磷酸腺苷、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、5’-尿苷酸二钠、5’-胞苷酸二钠、单，双甘油脂肪酸酯、磷脂。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2140	338	100
蛋白质(g)	15.1	2.39	0.71
脂肪(g)	27.5	4.35	1.29
亚油酸(g)	3.5	0.55	0.16
α-亚麻酸(mg)	400	63.2	18.7
亚油酸与 α-亚麻酸比值	9:1	9:1	9:1
碳水化合物(g)	50.9	8.04	2.38

维生素 A(μ g RE)	1100	174	51.4
维生素 D(μ g)	15	2.37	0.70
维生素 E(mg α - TE)	20	3.16	0.93
维生素 K ₁ (μ g)	41	6.48	1.92
维生素 B ₁ (μ g)	720	114	33.7
维生素 B ₂ (μ g)	750	119	35.1
维生素 B ₆ (μ g)	730	115	34.1
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.60	0.25	0.075
烟酸(μ g)	15200	2402	710
叶酸(μ g)	200	31.6	9.35
泛酸(μ g)	5500	869	257
维生素 C(mg)	135	21.3	6.31
生物素(μ g)	14	2.21	0.65
钠(mg)	300	47.4	14.0
钾(mg)	450	71.1	21.0
铜(μ g)	480	75.8	22.4
镁(mg)	35	5.53	1.64
铁(mg)	10.8	1.71	0.50
锌(mg)	5.4	0.85	0.25
锰(μ g)	80	12.6	3.74
钙(mg)	550	86.9	25.7
磷(mg)	350	55.3	16.4
碘(μ g)	90	14.2	4.21
氯(mg)	340	53.7	15.9
硒(μ g)	14	2.21	0.65
胆碱(mg)	80	12.6	3.74
肌醇(mg)	110	17.4	5.14

牛磺酸(mg)	35	5.53	1.64
左旋肉碱(mg)	10	1.58	0.47
二十二碳六烯酸(mg)	28.3	4.47	1.32
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.11	0.11	0.11
二十碳四烯酸(mg)	30.8	4.87	1.44
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.12	0.12	0.12
核苷酸(mg)	24	3.79	1.12

备注：每 100mL 含量是指每 100mL 标准冲调液中含 15.8g 配方粉。

【配方特点/营养学特征】本产品标准冲调液的能量为 81kcal（338kJ）/100mL，蛋白质含量为 2.39g/100mL，中链脂肪占总脂肪的比例不超过 40%。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用量应在医生或临床营养师的指导下，依据婴儿的月龄、体重和健康状况等调整确定。

冲调方法：冲调时请用产品所配专用量匙，1 平匙配方粉约为 5.3g，需用 30mL 温开水冲调成标准冲调液；3 平匙配方粉约为 15.8g，需用 90mL 温开水冲调成标准冲调液。

- 1.冲调前应将手彻底洗净。
- 2.将所有的哺喂器具放入清水中煮沸 5 分钟以上。
- 3.将冲调用水煮沸，使其冷却至 50°C~55°C。
- 4.按照食用量在奶瓶中加入冲调用水，再加入适量的配方粉。
- 5.盖紧奶瓶轻摇至充分溶解，当液体温度适宜时即可喂哺。

【净含量和规格】800g, 400g

【保质期】24 个月

【贮存条件】食用后请将盖子盖紧，并置于阴凉干燥处存放。打开包装后，请于一个月内将本产品食用完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.配制不当和使用不当可能引起健康危害。未经医生或临床营养师建议请勿擅自改变液体的浓度，浓度不恰当宝宝得不到适当的营养。
- 5.0-6 月龄目标人群食用本品时，本品可作为单一营养来源食用；6 月龄以上目标人群食用本品时，应在医生指导下配合添加辅助食品。
- 6.本品标准冲调液渗透压约为 275mOsmol/kg，供使用参考。
- 7.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当体格生长发育各项指标达到相应校正月龄婴儿正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通配方奶粉。
- 8.使用期间应避免细菌污染；哺喂剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。