

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20210005

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

稚舒

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】植物脂肪粉[葡萄糖浆、植物油（玉米油、菜籽油、椰子油）、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、氢氧化钾、柠檬酸脂肪酰甘油酯、柠檬酸钠]、淀粉糖、全脂乳粉（无乳糖）、分离乳清蛋白粉、醋酸维生素 A、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、叶黄素、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	2123	100
蛋白质(g)	11.0	0.52
脂肪(g)	27.5	1.30
亚油酸(g)	4.00	0.19
α -亚麻酸(mg)	450	21.2
亚油酸与 α -亚麻酸比值	9:1	9:1
碳水化合物(g)	54.0	2.5
维生素 A(μ g RE)	430	20
维生素 D(μ g)	7.50	0.35

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	7. 00	0. 33
维生素 K ₁ (μ g)	52. 0	2. 5
维生素 B ₁ (μ g)	500	24
维生素 B ₂ (μ g)	600	28
维生素 B ₆ (μ g)	320	15. 1
维生素 B ₁₂ (μ g)	1. 50	0. 071
烟酸(μ g)	3800	179
叶酸(μ g)	80. 0	3. 8
泛酸(μ g)	2800	132
维生素 C(mg)	80. 0	3. 8
生物素(μ g)	20. 0	0. 9
钠(mg)	145	7
钾(mg)	500	24
铜(μ g)	320	15. 1
镁(mg)	42. 0	2. 0
铁(mg)	5. 20	0. 24
锌(mg)	4. 20	0. 20
锰(μ g)	75. 0	3. 5
钙(mg)	410	19
磷(mg)	310	15
钙磷比值	1. 3:1	1. 3:1
碘(μ g)	80. 0	3. 8
氯(mg)	375	18
硒(μ g)	13. 0	0. 61
胆碱(mg)	64	3. 0
牛磺酸(mg)	35. 0	1. 6
左旋肉碱(mg)	15. 0	0. 7

营养成分	每 100g	每 100kJ
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.2	0.2
二十二碳六烯酸(mg)	48	2.26
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.3	0.3
二十碳四烯酸(mg)	72	3.39
叶黄素(μg)	90.0	4
核苷酸(mg)	15.0	0.71

【配方特点/营养学特征】本产品配方中以其他碳水化合物完全代替乳糖，乳糖含量<0.5g/100g，配方中的蛋白质由乳蛋白提供。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】口服。应在医生或临床营养师的指导下，依据婴儿的月龄、体重和健康状况等综合确定食用量。

冲调方法：1.清洗冲调用具。2.冲净后的奶具放在沸水中至少煮沸 5 分钟。3.饮用水煮沸后，冷却至约 45℃~55℃，将准确水量倒入已消毒的奶瓶中。4.使用量匙，加入准确份量的本品，一平匙产品约 4.5g。100mL 标准液冲调方法为 13.5g 粉加 90mL 水。5.摇匀至本品完全溶解，待温度适中，方可食用。

【净含量和规格】800g

【保质期】24 个月

【贮存条件】未开启的产品应室温保存。开罐后请将罐盖盖紧，并放于阴凉干燥处。请勿将产品长时间放在高温处或放入冰箱内冷藏，开罐后最好在四周内食用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 5.对于 0~6 月龄的乳糖不耐受婴儿，本品可作为单一营养来源食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。