

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20210009

特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品

安尼尔

【产品类别】无乳糖配方

【配料表】植物脂肪粉〔葡萄糖浆、植物油（玉米油、菜籽油、椰子油）、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、氢氧化钾、柠檬酸脂肪酸甘油酯、柠檬酸钠〕、麦芽糊精、全脂乳粉（无乳糖）、分离乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	2012	100
蛋白质(g)	10.90	0.54
脂肪(g)	24.10	1.20
亚油酸(g)	3.02	0.15
α -亚麻酸(mg)	302	15
亚油酸与 α -亚麻酸比值	10:1	10:1
碳水化合物(g)	55.0	2.7
维生素 A(μ g RE)	352	17.5
维生素 D(μ g)	5.63	0.28

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	7. 04	0. 35
维生素 K ₁ (μ g)	40. 2	2. 0
维生素 B ₁ (μ g)	402	20
维生素 B ₂ (μ g)	483	24
维生素 B ₆ (μ g)	281. 7	14. 0
维生素 B ₁₂ (μ g)	1. 006	0. 050
烟酸（烟酰胺）(μ g)	2817	140
叶酸(μ g)	64. 4	3. 2
泛酸(μ g)	2435	121
维生素 C(mg)	56. 3	2. 8
生物素(μ g)	10. 1	0. 5
钠(mg)	161	8
钾(mg)	483	24
铜(μ g)	211. 3	10. 5
镁(mg)	30. 2	1. 5
铁(mg)	3. 42	0. 17
锌(mg)	3. 22	0. 16
锰(μ g)	30. 2	1. 5
钙(mg)	362	18
磷(mg)	241	12
碘(μ g)	60. 4	3. 0
氯(mg)	322	16
硒(μ g)	13. 08	0. 65
胆碱(mg)	60. 4	3. 0
肌醇(mg)	36. 2	1. 8
左旋肉碱(mg)	6. 0	0. 3
二十二碳六烯酸(mg)	40. 2	2. 0

营养成分	每 100g	每 100kJ
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.16	0.16
二十碳四烯酸(mg)	60.4	3.0
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.25	0.25
核苷酸(mg)	28	1.4

【配方特点/营养学特征】本产品配方中以其他碳水化合物完全代替乳糖，乳糖含量<0.5g/100g。配方中的蛋白质由乳蛋白提供。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳糖不耐受婴儿

【食用方法和食用量】口服。应在医生或临床营养师的指导下，依据婴儿的月龄、体重和健康状况等调整确定食用量和次数。

冲调方法：1. 请先洗净双手，再用瓶刷等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。2. 先将煮沸的热开水冷却至 50℃左右，将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。3. 使用本产品专用奶粉量匙添加所需的奶粉量。4. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。5. 奶粉冲调后立即喂哺，如果 1 小时内未喂哺完，剩下的奶水须倒掉，切勿留作下次喂哺。

冲调时请使用本产品专用量匙，一平匙产品约 4.5g。100mL 标准液冲调方法为 13.5g 粉加 90mL 水。

【净含量和规格】400g

【保质期】24 个月

【贮存条件】请存放在清洁阴凉干燥处，勿存放于冰箱，避免长时间储存于过高的温度下。开封后必须保证密封，建议在 1 个月内用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
5. 对于 0~6 月龄的乳糖不耐受婴儿，本品可作为单一营养来源食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。

6. 未经医生或临床营养师建议请勿擅自改变液体的浓度, 浓度不恰当会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。

7. 使用期间应避免细菌污染。

注: 企业上市产品的标签、说明书, 还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。