

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230025

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

特爱安能

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】植物脂肪粉[麦芽糊精、固体玉米糖浆、全脂乳粉、分离乳清蛋白粉、中链甘油三酯、植物油（玉米油、葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油）、乳糖、植物油（大豆油、玉米油、葵花籽油）、磷酸三钙、单，双甘油脂肪酸酯、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、磷脂、混合生育酚浓缩物]、高油乳清粉[脱盐乳清粉、植物油（玉米油、葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油）、磷脂]、分离乳清蛋白粉、麦芽糊精、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1- α -醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2127	338	100
蛋白质(g)	16.2	2.6	0.76
脂肪(g)	25.5	4.1	1.20
亚油酸(g)	4.7	0.7	0.22
α -亚麻酸(mg)	540	86	25

亚油酸与 α -亚麻 酸比值	9:1	9:1	9:1
碳水化合物(g)	53.4	8.5	2.5
维生素 A(μ g RE)	1900	302	89
维生素 D(μ g)	20	3.2	0.94
维生素 E(mg α - TE)	20	3.2	0.94
维生素 K ₁ (μ g)	41	6.5	1.9
维生素 B ₁ (μ g)	870	138	41
维生素 B ₂ (μ g)	1280	204	60
维生素 B ₆ (μ g)	760	121	35.7
维生素 B ₁₂ (μ g)	1.15	0.2	0.054
烟酸(μ g)	15100	2401	710
叶酸(μ g)	206	32.8	9.7
泛酸(μ g)	6150	978	289
维生素 C(mg)	130	20.7	6.1
生物素(μ g)	15	2.4	0.7
钠(mg)	325	52	15
钾(mg)	388	62	18
铜(μ g)	517	82	24.3
镁(mg)	40	6.4	1.9
铁(mg)	10.8	1.7	0.51
锌(mg)	6.5	1.0	0.31
锰(μ g)	75	11.9	3.5
钙(mg)	640	102	30
磷(mg)	355	56	17
碘(μ g)	90	14.3	4.2
氯(mg)	450	72	21

硒(μg)	14	2.2	0.66
胆碱(mg)	80	12.7	3.8
肌醇(mg)	129	20.5	6.1
牛磺酸(mg)	30	4.8	1
左旋肉碱(mg)	11.5	1.8	0.5
二十二碳六烯酸(mg)	82	13.0	3.9
二十二碳六烯酸(%总脂肪酸)	0.34	0.34	0.34
二十碳四烯酸(mg)	129	20.5	6.1
二十碳四烯酸(%总脂肪酸)	0.53	0.53	0.53
核苷酸(mg)	35	5.6	1.6

备注：100mL 标准冲调液用 15.9g 配方粉加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本产品 100mL 标准冲调液的能量约为 81kcal（338kJ），蛋白质含量约为 2.6g。产品中添加了中链甘油三酯（添加量约为 7.7%），中链脂肪约占总脂肪的 30%，添加了二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、核苷酸。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据婴儿的矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：冲调时请用所附专用量匙，1 平匙配方粉约为 4g，需用 23mL 温开水冲调成标准冲调液。

- （1）准备冲调前，请彻底洗净双手。
- （2）将洗干净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入沸水中煮沸 5 分钟。
- （3）将饮用水煮沸 5 分钟，冷却至 40℃～50℃ 待用。
- （4）将正确量的冲调用水倒入奶瓶。
- （5）使用所附专用量匙量取正确量的配方粉加入水中。
- （6）盖紧瓶盖，轻摇至配方粉充分溶解，待液体温度适宜时，及时哺喂。

【净含量和规格】 700g, 300g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 开罐前：请常温保存，在保质期前使用该产品。开罐后：请将盖子盖紧，放置于阴凉干燥处，并于一个月内食用完毕。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食品是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。
5. 6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
6. 根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方食品或配合添加辅助食品。
7. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
8. 使用期间应避免污染；剩余的哺喂液体请弃掉，勿留于下次食用。
9. 本产品标准冲调液的渗透压约为 **280mOsmol/kg**，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。