

2023—2024 学年第一学期《高等数学 B》A 卷

答案及评分标准

一、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x)(2^x - 1)$ 与 x^3 相比是 (C)

- A. 高阶无穷小; B. 等价无穷小;
C. 同阶但不等价无穷小; D. 低阶无穷小.

2. 设 $f(x) = \frac{\arcsin^2 x}{\ln \sqrt{1+x^2}}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (D).

- A. 连续点 B. 第二类间断点 C. 跳跃间断点 D. 可去间断点

3. 已知 $f'(x_0) = -1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(x_0 - 2h) - f(x_0 + 3h)} =$ (B).

- A. $1/5$ B. $-1/5$ C. 1 D. -1

4. 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, x_0 是方程 $f(x) = 0$ 的最大的根, 则必有 (A)

- A. $f'(x_0) \geq 0$ B. $f'(x_0) > 0$ C. $f'(x_0) \leq 0$ D. $f'(x_0) < 0$

5. 若 $f'(x) = \sin(x^2)$, 则 $\int x f''(x^2) dx =$ (D)

- A. $-\frac{1}{2} \cos(x^4) + c$ B. $-\frac{1}{2} \cos(x^4)$ C. $-\frac{1}{2} \sin(x^4) + c$ D. $\frac{1}{2} \sin(x^4) + c$

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + \alpha x - 7}{x - 1} = \beta$, 则常数 $\alpha + \beta =$ 14.

2. 设 $y = e^{1-2x}$, 则 $y^{(2024)}(0) =$ $2^{2024} e$.

3. 已知 $y = x^2 + 2x$, 在点 $x = 3$ 处, $\Delta x = 0.1$, 则 $dy =$ 0.8.

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{\sqrt{1+x^2}} = \underline{\quad 1 \quad}.$

5. 若 $\int x f(x) dx = \arctan x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx = \underline{\quad \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 + C \quad}.$

三、(8 分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\sin x}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln(1+\frac{2}{x})^{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln(1+\frac{2}{x})}$ -----2 分

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln(1+\frac{2}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1+\frac{2}{x}) \cdot \frac{1}{x} = t \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+2t)}{t} = 0$ -----6 分

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\sin x} = 1$ ----- 8 分.

四、(8 分) 求参数方程 $\begin{cases} x = f'(t), \\ y = tf'(t) - f(t), \end{cases}$ 所确定的 $y=f(x)$ 的一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 和二阶导数

$\frac{d^2y}{dx^2}$, 其中 $f''(t)$ 存在且不为零.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{f'(t) + tf''(t) - f'(t)}{f''(t)} = t = y'$;4 分

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{f''(t)}$8 分

五、(8 分) 计算不定积分 $\int \frac{\sin x + 3 \cos x}{\sin x + \cos x} dx$

解: 令

$\sin x + 3 \cos x = A(\sin x + \cos x) + B(\sin x + \cos x)'$ -----2 分
 $= (A - B) \sin x + (A + B) \cos x$

$$\Rightarrow A=2, B=1 \quad \text{-----4 分}$$

$$\int \frac{\sin x + 3 \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int \left(2 + \frac{(\sin x + \cos x)'}{\sin x + \cos x} \right) dx = 2x + \ln |\sin x + \cos x| + C$$

$$\text{-----8 分}$$

六、(8 分) 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ 计算不定积分 $\int f(x)dx$.

$$\text{解: 令 } \ln x = t, \text{ 则 } x = e^t, \therefore f(t) = \frac{\ln(1+e^t)}{e^t} \text{-----2 分}$$

$$\therefore \int f(x)dx = \int e^{-x} \ln(1+e^x) dx = -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int \frac{1}{1+e^x} dx \text{-----4 分}$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} dx = -e^{-x} \ln(1+e^x) + x - \ln(1+e^x) + C$$

$$\text{-----8 分}$$

七、(10 分) 求函数 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right)$ 的定义域以及渐近线.

$$\text{解: (1) 定义域为 } \left(-\infty, -\frac{1}{e} \right) \cup (0, +\infty) \text{-----2 分}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(e + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e+u)}{u} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{e+u} = 0, \text{-----5 分}$$

$$\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{1}{e} \right)^-} x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right) = \infty,$$

$$\therefore x = -\frac{1}{e} \text{ 是铅直渐近线.-----7 分}$$

(3)

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(e + \frac{1}{x}) - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(e + t) - 1}{t} = \frac{1}{e}$$

$\therefore y = x + \frac{1}{e}$ 是斜渐近线-----10 分

八、(10 分)应用题：在半径为 R 的半圆内作内接梯形，使其底为直径其它三边为圆的弦，问应怎样设计，才能使梯形的面积最大？

解：设梯形的上底为 $2x$ ，则高 $h = \sqrt{R^2 - x^2}$ ，

于是梯形面积 $S = \frac{1}{2}(2x + 2R)\sqrt{R^2 - x^2}$ ， $(0 < x < R)$ -----3 分

$$S' = \sqrt{R^2 - x^2} - \frac{x(R + x)}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{R^2 - Rx - 2x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}}, \text{ 令 } S' = 0, \text{ 得 } x = \frac{R}{2} \text{ -----6 分}$$

$\because x = \frac{R}{2}$ 是唯一驻点，又面积最大值存在， $\therefore x = \frac{R}{2}$ 就是最大值点.

即当上底长为 R 时， S 梯形最大。-----10 分

九、(12 分)证明不等式：当 $x > 1$ 时， $e^x > \frac{e}{2}(x^2 + 1)$.

证明：设 $f(x) = e^x - \frac{e}{2}(x^2 + 1)$ $(x > 1)$ -----3 分

$$f'(x) = e^x - ex, \text{ 所以 } f''(x) = e^x - e > 0 \text{ -----5 分}$$

所以 $f'(x) = e^x - ex$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递增 -----7 分

$$\text{当 } x > 1 \text{ 时, } f'(x) > f'(1) = 0 \text{ -----9 分}$$

所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递增

$$\text{所以当 } x > 1 \text{ 时, } f(x) > f(1), \text{ 即 } e^x > \frac{e}{2}(x^2 + 1) \text{ -----12 分}$$

十、(6 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续，在 (a, b) 可导，且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0.$$

证明 取辅助函数 $F(x) = f(x)e^{g(x)}$2 分

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $F(a) = F(b) = 0$

根据 Rolle 定理存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$

即 $e^{g(\xi)}[f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi)] = 0$ 4 分

又 $e^{g(\xi)} \neq 0$

从而 $f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$6 分