

福建师范大学 数学与信息 学院

2019—2020 学年第 1 学期考试 A 卷

知明行笃



应诚收

专 业: _____

年 级: 18 级

课程名称: 概率论与数理统计

任课教师: _____

试卷类别: 开卷 () 闭卷 (√)

考试用时: 120 分钟

考试时间: 2019 年 12 月 31 日 上午 9 点 00 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生须知	<ol style="list-style-type: none">1. 答案一律写在答题纸上, 否则无效.2. 答题要写清题号, 不必抄原题.3. 考试结束, 试卷与答题纸一并提交.								

学号 _____
姓名 _____
年级 _____
专业 _____
系 _____
学院 _____

线 订 装

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设随机事件 A 与 B 互不相容, $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$, 则下列结论肯定正确的是 ().

A、 \bar{A} 与 \bar{B} 互不相容;

B、 $P(B|A) > 0$;

C、 $P(AB) = P(A)P(B)$;

D、 $P(A-B) = P(A)$.

2、下列各函数中, 可作为某随机变量概率密度函数的是 ().

A、 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$

B、 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$

C、 $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ -1, & \text{其他}; \end{cases}$

D、 $f(x) = \begin{cases} 4x^3, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

3、设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P(|X - \mu_1| < 1) > P(|Y - \mu_2| < 1)$, 则 ().

A、 $\sigma_1 < \sigma_2$;

B、 $\sigma_1 > \sigma_2$;

C、 $\mu_1 > \mu_2$;

D、 $\mu_1 < \mu_2$.

4、设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自参数为 θ 的指数分布总体的样本, 其中 $\theta > 0$ 未知,

$T_1 = \min_{1 \leq i \leq n} X_i + P(X_1 > 1)$, $T_2 = \bar{X} - 3\theta$, $T_3 = \sum_{i=1}^n (X_i - 3)^2$, $T_4 = (\pi - \pi^2)X_n - \max_{1 \leq i \leq n} X_i$,

$T_5 = \max_{1 \leq i \leq n} X_i - n\bar{X}$, 则它们中 () 是统计量.

A、 T_1, T_3, T_5 ;

B、 T_1, T_2, T_3 ;

C、 T_1, T_3, T_4 ;

D、 T_3, T_4, T_5 .

5、设 X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, \bar{X} 与 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则下面正确的是 ().

A、 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$;

B、 $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$;

C、 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$;

D、 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6、在一副扑克牌（52 张）中任取 4 张，则 4 张牌花色全不相同的概率为_____.

7、设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$ ，则 $\lambda =$ _____.

8、设随机变量 $X \sim b(2, p), Y \sim b(3, p)$ ，且 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ ，则 $P(Y \geq 1) =$ _____.

9、设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，且 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计，则 $C =$ _____.

10、设 X_1, X_2, X_3 是总体 X 的样本， $E(X) = \theta$ ， $D(X) = \sigma^2$ 存在， $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ ，

$\hat{\theta}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ ， $\hat{\theta}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_3$ ，则无偏估计量 $\hat{\theta}_1$ ， $\hat{\theta}_2$ ， $\hat{\theta}_3$ 中_____最有效.

三、计算题（共 58 分）

11、（10分）两台车床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是0.03，第二台出现不合格品的概率是0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件比第二台加工的零件多一倍。试求：

（1）任取一个零件是合格品的概率；

（2）如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率。

12、（10分）设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合概率分布列为：

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.2	0.1	0
1	0.2	0.1	0.4

试求：（1）求 $P(X=1|Y=1), P(Y=0|X=0)$ ；

（2）判断 X 和 Y 是否独立？

（3）求 X 和 Y 的协方差 $Cov(X, Y)$ 。

13、(8分) 设随机变量 X 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布, 求 $Y = -\ln X$ 的概率密度函数.

14、(12分) 若二维随机变量 (ξ, η) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它}; \end{cases}$$

试求: (1) 常数 A ; (2) ξ 和 η 的边缘概率密度; (3) ξ 和 η 是否相互独立.

15、(10分) 设总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它}; \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, (X_1, X_2, \dots, X_n) 为来自总体 X 的一个简单随机样本. 试求:

(1) θ 的矩估计; (2) θ 的极大似然估计.

16、(8分) 设总体 X 服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, X_1, X_2, \dots, X_n 是一个简单随机样本, \bar{X} 与 S^2 分别为样本均值与样本方差, 试求: (1) X_1, X_2, \dots, X_n 的联合概率分布律;

(2) $\text{Cov}(X_i, X_j), i \neq j$; (3) $E(\bar{X})$ 、 $D(\bar{X})$ 、 $E(S^2)$.

四、应用题 (共 12 分)

17、(12分) 已知维尼纶纤度在正常条件下服从正态分布, 且标准差为 0.048. 从某天产品中抽取 5 根纤维, 测得其纤度为

1.32 1.55 1.36 1.40 1.44

问这一天纤度的方差是否正常 (取显著性水平 $\alpha = 0.05$) ?

常用分布的上分位点如下:

$$\chi_{0.025}^2(4) = 11.143, \chi_{0.975}^2(4) = 0.484, \quad \chi_{0.025}^2(5) = 12.832, \chi_{0.975}^2(5) = 0.831$$

$$u_{0.025} = 1.96, \quad u_{0.05} = 1.645, \quad u_{0.005} = 2.57.$$