

作业五

2.

根据Euler法求解过程

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = y_n + h\lambda y_n = (1 + h\lambda)y_n$$

根据 $y(0) = 1$, 不妨令 $y_0 = 1$, 故利用Euler法求得的数值解 $y_n = (1 + h\lambda)^n$

收敛性证明:

固定 x , 取 $h = \frac{x}{n}$, 根据题意得 $y = e^{\lambda x}$ 是其精确解,

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h\lambda)^n = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h\lambda)^{\frac{x}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \left((1 + h\lambda)^{\frac{1}{h\lambda}} \right)^{\lambda x} = e^{\lambda x}$$

故当 $h \rightarrow 0$ 时, $y_n = (1 + h\lambda)^n$ 一阶收敛于精确解

5.

证明:

①取 $y(x) = 1$, 左式=1, 右式= $\frac{1}{2} \times 2 + \frac{h}{4} \times 0 = 1$, 左式=右式

②取 $y(x) = x$, 左式= x_{n+1} , 右式= $\frac{1}{2}(x_n + x_{n-1}) + \frac{h}{4}(4 - 1 + 3) = \frac{1}{2}(x_{n+1} - 3h) + \frac{3}{2}h = x_{n+1}$,

\therefore 左式=右式

③取 $y(x) = x^2$, 左式= x_{n+1}^2

$$\text{右式} = \frac{1}{2}(x_n^2 + x_{n-1}^2) + \frac{h}{4}(8x_{n+1} - 2x_n + 6x_{n-1})$$

$$= \frac{1}{2}(2x_{n+1}^2 - 6hx_{n+1} + 5h^2) + \frac{h}{4}(12x_{n+1}) = x_{n+1}^2$$

\therefore 左式=右式

④取 $y(x) = x^3$, 左式= x_{n+1}^3

$$\text{右式} = \frac{1}{2}(x_n^3 + x_{n-1}^3) + \frac{h}{4}(12x_{n+1}^2 - 3x_n^2 + 9x_{n-1}^2)$$

$$= \frac{1}{2}(2x_{n+1}^3 - 9hx_{n+1}^2 + 15h^2x_{n+1} - 9h^3) + \frac{h}{4}(18x_{n+1}^2 - 30hx_{n+1} + 33h^2)$$

$$= x_{n+1}^3 - \frac{9}{2}hx_{n+1}^2 + \frac{15}{2}(h^2 - h)x_{n+1} + \frac{15}{4}h^3 \neq \text{左式}$$

\therefore 该2步法是2阶方法

根据局部截断误差系数 $C_3 = \frac{1}{3!} \{1 - [\sum_{i=0}^1 (-i)^3 a_i + 3 \sum_{i=-1}^1 (-i)^2 b_i]\}$

代入 $a_0 = \frac{1}{2}, a_1 = \frac{1}{2}, b_{-1} = 1, b_0 = -\frac{1}{4}, b_1 = \frac{3}{4}$, 得 $C_3 = -\frac{5}{8}$

\therefore 其局部截断误差首项为 $-\frac{5}{8}h^3 y^{(3)}(x_n)$

6.

(1)根据题意有 $b_{-1} = 0$, 取 a_0 为自由参数, 求解 3 个未知数 a_1, b_0, b_1 , 可由 $C_0 = C_1 = C_2 = 0$ 得到三个方程

$$\begin{aligned}1 - (a_1 + a_0) &= 0 \\1 + a_1 - (b_{-1} + b_0 + b_1) &= 0 \\1 - a_1 - 2(b_{-1} - b_1) &= 0\end{aligned}$$

解得 $a_1 = 1 - a_0, b_0 = 2 - \frac{a_0}{2}, b_1 = -\frac{a_0}{2}$, 此方法至少是 2 阶的

(2)考察试验方程, 代入 $y' = \lambda y$

$$y_{n+1} = a_0 y_n + (1 - a_0) y_{n-1} + \frac{h}{2} [(4 - a_0) y'_n - a_0 y'_{n+1}]$$

令 $\bar{h} = h\lambda$ 得

$$y_{n+1} = \left[a_0 + \frac{\bar{h}}{2} (4 - a_0) \right] y_n + \left[1 - a_0 - \frac{\bar{h}}{2} a_0 \right] y_{n-1}$$

设解为 $y = r^n$, 得到其第一特征方程 $\rho(r) = r^2 - a_0 r - (1 - a_0) = (r - 1)(r + (1 - a_0))$

若使其满足根条件, 则 $|r_1| = |a_0 - 1| < 1$, 即 $0 < a_0 < 2$

(3)

当 $a_0 = 0$ 时, $y_{n+1} = y_{n-1} + 2hy'_n$, 为 2 步Euler格式的Euler方法

当 $a_0 = 1$ 时, $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3y'_n - y'_{n-1})$, 为 显式 2 步Adams方法

(4)

当 $C_3 = 0$ 时 $1 + a_1 - 3(b_{-1} + b_1) = 0$, 代入 $a_1 = 1 - a_0, b_{-1} = 0, b_1 = -\frac{a_0}{2}$

解得 $a_0 = -4$

此时不满足 $0 < a_0 < 2$, 故不能满足根条件

11.

根据 4 阶Runge - Kutta方法, 令 $\lambda = -20$, 可列出以下方程

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

$$K_1 = f(x_n, y_n) = \lambda y_n$$

$$K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1\right) = \left(1 + \frac{h}{2}\lambda\right)\lambda y_n$$

$$K_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2\right) = \left(1 + \frac{h}{2}\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{4}\right)\lambda y_n$$

$$K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_3) = \left(1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2} + \frac{(h\lambda)^3}{4}\right)\lambda y_n$$

根据初值条件 $y(0) = 1$, 分别取 $h = 0.1$ 和 $h = 0.2$ 可以得到如下结果

当 $h = 0.1$ 时

x	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
y	0.3333	0.1111	0.0370	0.01235	0.00412	0.00137	0.00046	0.00015	0.00005	0.00002

$h = 0.1$

当 $h = 0.2$ 时

x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
y	5.0000	25.0000	125.0000	625.0000	3125.0000

$h = 0.2$

令 $\bar{h} = h\lambda$ 可得 $y_{n+1} = \left(1 + \bar{h} + \frac{\bar{h}^2}{2} + \frac{\bar{h}^3}{3!} + \frac{\bar{h}^4}{4!}\right) y_n$

由此递推可以得到 $y_{n+1} = \left(1 + \bar{h} + \frac{\bar{h}^2}{2} + \frac{\bar{h}^3}{3!} + \frac{\bar{h}^4}{4!}\right)^n y_n = \left(1 + \bar{h} + \frac{\bar{h}^2}{2} + \frac{\bar{h}^3}{3!} + \frac{\bar{h}^4}{4!}\right)^n y_0$

当 $h = 0.1$ 时, $\bar{h} = \lambda h = -2$, $1 + \bar{h} + \frac{\bar{h}^2}{2} + \frac{\bar{h}^3}{3!} + \frac{\bar{h}^4}{4!} = 0.3333 < 1$, 所以是稳定的

当 $h = 0.2$ 时, $\bar{h} = \lambda h = -4$, $1 + \bar{h} + \frac{\bar{h}^2}{2} + \frac{\bar{h}^3}{3!} + \frac{\bar{h}^4}{4!} = 5 > 1$, 所以是不稳定的