

Алгоритм действия медицинской сестры при проведении тредмил теста (беговая дорожка)

1. Подготовка пациента:

Информирование: объяснить пациенту цели и ход процедуры, ответить на вопросы.

Подготовка кожи: обеспечить чистоту и сухость кожи в местах наложения электродов, возможно, потребуется сбрить волосы. Подключение электродов: Наложить электроды для регистрации ЭКГ, **согласно схеме**.

Измерение артериального давления: измерить артериальное давление и ЧСС в покое.

Ознакомление с инструкциями: объяснить пациенту, как пользоваться беговой дорожкой и как сообщать о своих ощущениях.

2. Проведение исследования:

Начало теста: запустить тредмил. Включить ноутбук и дорожку. На рабочем столе выбрать программу «ТРЕДМИЛ», ввести данные пациента, возраст, рост, вес, АД. Нажать «СТАРТ» и начать движение с минимальной скоростью и углом наклона.

Мониторинг ЭКГ и АД: непрерывно контролировать ЭКГ и артериальное давление **каждые 2 минуты**, а также каждые 3 минуты менять скорость и угол наклона беговой дорожки, увеличивая нагрузку (выполняется врачами).

Наблюдение за пациентом: обращать внимание на жалобы пациента (боль в груди, одышка, слабость), значения артериального давления.

Прекращение теста: по указанию врача. Остановить тредмил по достижении целевой ЧСС, при появлении симптомов ишемии миокарда, резких изменений ЭКГ или АД, или по просьбе пациента.

3. Завершение теста:

Наблюдение после нагрузки: продолжать мониторинг ЭКГ и АД **в течение 5-10 минут** после прекращения нагрузки до восстановления исходных показателей.

Снятие электродов: помочь пациенту спуститься с беговой дорожки. Аккуратно снять электроды с пациента. Выдать бумажное полотенце.

Обработать электроды согласно инструкции по эксплуатации аппарата (протереть спиртом или специальным раствором). Утилизировать использованные расходные материалы (салфетки, пленки).

Провести дезинфекцию рук.

Важно:

Тщательный мониторинг состояния пациента является ключевым элементом успешного проведения тредмил-теста.

Медицинская сестра должна быть готова к быстрой и адекватной реакции на любые изменения в состоянии пациента.

Внимательное соблюдение протокола и инструкций обеспечивает безопасность и достоверность результатов исследования.

