北地动物保护协会

CUGB Animal Protection Association

流浪猫群护、绝育与救助标准

Standard Procedures for Cat TNR / Rescue

北地动物保护协会 原创

2025 年 12 月

目录

前言 1

一、TNR 救助原则概述 1

（一）TNR 的定义与核心理念 2

1. TNR 的科学定义 2

2. TNR 的核心理念 3

（二）TNR 的基本原则 4

1. 全面捕捉原则 4

2. 优先顺序原则 4

3. 安全第一原则 5

4. 快速放归原则 5

5. 持续监测原则 6

（三）TNR 实施流程 6

1. 准备阶段 6

2. 捕捉阶段 7

3. 手术阶段 8

4. 恢复阶段 8

5. 持续监测阶段 9

6. 放归阶段 10

二、猫窝标准与尺寸规范 11

（一）猫窝尺寸标准 11

1. 成年猫单窝尺寸 11

2. 多只猫共用猫窝尺寸 11

3. 母猫带幼崽专用猫窝 12

（二）猫窝材料选择 12

1. 主体材料 12
2. 保温材料 13
3. 材料安全要求 13
（三）猫窝设计要求 14
1. 结构设计原则 14
2. 入口设计 14
3. 通风设计 14
4. 清洁设计 15
（四）猫窝放置规范 15
1. 选址原则 15
2. 冬季放置要求 16
3. 夏季放置要求 17
4. 猫窝数量配置 17
5. 猫窝与投喂点的关系 18
6. 维护要求 18
三、绝育标准与规范 19
（一）绝育年龄与体重标准 19
1. 最低年龄标准 19
2. 最低体重标准 20
3. 孕期母猫绝育标准 21
（二）术前检查要求 22
1. 基础健康评估 22
2. 血液检查标准 22
3. 心肺功能评估 23
4. 传染病筛查 23
4. 麻醉风险评估 24
5. 特殊情况处理 24

（三）术前准备事项 24
1. 禁食要求 24
2. 术前用药 25
3. 收容/恢复区域准备 26
4. 捕捉和运输准备 26
4. 手术环境要求 27
四、投喂点设置标准 28
（一）选址原则 28
1. 隐蔽性原则 28
2. 安全性原则 28
3. 便利性原则 29
4. 合法性原则 29
（二）建设要求 29
1. 投喂容器标准 29
2. 投喂台/架设计 30
3. 标识设置 30
4. 投喂点数量配置 31
（三）卫生管理要求 31
1. 日常清洁 31
2. 食物储存 32
3. 疾病预防 32
（四）投喂次数和数量 33
1. 投喂频率 33
2. 投喂量标准 34
3. 食物类型选择 34
4. 投喂记录管理 35
5. 投喂点与社区关系 35

6. 特殊情况处理 36

五、志愿者安全规范 37

（一）个人防护要求 37

1. 基本防护装备 37

2. 狂犬病预防 38

3. 个人防护装备使用规范 38

4. 其他疾病预防 38

（二）操作行为规范 39

1. 捕捉操作规范 39

2. 运输操作规范 39

3. 投喂操作规范 40

4. 清洁操作规范 40

（三）风险上报与应急处理 41

1. 抓咬伤处理 41

2. 过敏反应处理 41

3. 心理应激处理 42

4. 事件上报流程 42

5. 志愿者培训要求 43

6. 保险与法律责任 44

结语 46

参考文献： 48

前言

大学校园，是知识的殿堂，亦是生命的栖居之所。在晨读的湖畔、黄昏的林荫道、图书馆的墙角，总有一些轻盈的身影与学子们朝夕相伴——它们是校园流浪猫，是这个微型社会中无声的成员，也是检验一所大学人文精神的生动标尺。

校园流浪猫的形成，往往源于毕业季的遗弃、校外猫咪的迁入以及无序的繁殖。它们游走于宿舍与教学楼之间，既享受着师生的善意投喂，也面临着疾病、严寒、车辆伤害等生存考验。面对这一现实，简单的驱赶与漠视，有违大学的育人初心；而无序的投喂与放任，亦非长久之策。如何在尊重生命与维护校园秩序之间找到平衡，成为越来越多高校必须面对的人道课题。

TNR——捕捉、绝育、放归——这一在全球范围内被广泛验证的科学管理模式，恰好为校园流浪猫问题提供了可行的解决方案。它不以消灭生命为代价，而是以节育替代繁殖，以标记替代捕杀，在控制种群数量的同时，维护动物福利，让人与猫在有限的校园空间内寻得共存之道。这套《校园流浪猫群护、绝育与救助标准》，正是基于这一理念，结合国际前沿经验与高校特殊环境，由北地动物保护协会倾力编撰。它专为大学校园量身定制，从 TNR 操作流程到猫窝尺寸规范，从术前医学标准到投喂点选址原则，从志愿者安全防护到应急事件处理，每一个细节都力求科学严谨、切实可行。

我们深知，校园流浪猫问题无法依靠单一群体解决。它需要校团委社团管理部门与后勤部门的理解与支持，需要兽医学的专业指导，需要师生的包容参与，更需要志愿者们的默默坚守。这套标准的意义，正在于将零散的善意凝聚为系统的行动，让每一份爱心都有章可循，让每一次救助都行之有效。

大学之大，不在楼宇之高，而在胸怀之广、情怀之深。当我们在寒冬为猫窝铺上温暖的棉被，当我们在酷暑为投喂点遮起一片阴凉，当我们以科学的方式管理种群而非以冷漠的态度回避问题，我们便在无声中塑造着一种更加包容、更加文明的校园文化。愿这套标准成为校园流浪猫救助的实用指南，愿更多的师生加入到这场温柔的守护中来，让每一只流浪的生命，都能在校园中找到属于自己的安身之所。

北地动物保护协会

2025 年 12 月

一、TNR 救助原则概述

（一）TNR 的定义与核心理念

TNR（Trap-Neuter-Return，捕捉-绝育-放归）是一种人道且有效的流浪猫种群管理方法。该方法通过捕捉目标区域内的所有流浪猫，对其进行绝育手术、疫苗接种和耳标标记，然后将健康的猫咪放归到原来的生活区域，从而实现种群数量的长期控制和稳定。TNR 方法起源于 20 世纪 90 年代的美国，经过三十多年的发展和实践，已被证明是一种科学、人道且可持续的流浪猫管理方式，在全球范围内得到广泛应用和推广。

> *“Trap-Neuter-Return (TNR) is a humane and effective method of managing cat populations. The process involves the capturing of all the cats from a targeted group, neutering them, surgically removing the tip of their left ear for identification purposes, and providing treatments such as deworming, or vaccination. Finally the cats are returned to their original territory.”*
> ***——欧盟动物福利组织 TNR 绝育手册***

1. TNR 的科学定义

根据国际猫科医学会（International Society of Feline Medicine, ISFM）的官方指南，TNR 被定义为一种综合性的流浪猫管理策略，其核心要素包括捕捉、绝育、耳标标记、疫苗接种和放归五个关键环节。这一方法不仅关注种群数量的控制，更注重猫咪的福利和生存质量，体现了现代动物保护理念中人道主义与科学管理相结合的核心思想。

- 捕捉（Trap）：使用人道捕捉设备安全地捕捉目标区域内的流浪猫；
- 绝育（Neuter）：对捕捉到的猫咪进行专业的绝育手术，包括公猫去势和母猫绝育；
- 耳标（Eartip）：在猫咪左耳尖部进行标准化的耳标切除，作为已绝育的视觉标识；
- 疫苗（Vaccinate）：根据资源情况接种狂犬病疫苗和猫三联疫苗；
- 放归（Return）：将康复后的猫咪安全地放归到原来的生活区域。

> *“At minimum, TNRed community cats are spayed or neutered so they can no longer reproduce, vaccinated against rabies, marked to identify them as sterilized (the universally recognized sign of a sterilized cat is an ear-tip, a surgical removal of the top quarter inch of the cat's ear, typically the left), and returned to their home territory.”*
> ***——美国人道协会社区猫管理手册***

2. TNR 的核心理念

TNR 方法的核心理念基于以下几个基本原则：

（1）人道主义原则：TNR 强调以人道方式对待流浪猫，避免捕杀等残忍手段。根据美国人道协会的研究，“当猫群存在时，选择不是在有没有猫之间，而是在有管理的猫群和没有管理的猫群之间”。

> *“When cat populations are present, the choice is not between having cats or not having cats. The choice is between having a managed community cat population, or an unmanaged one.”*
> ***——美国人道协会社区猫管理手册***

（2）种群控制原则：通过绝育阻断繁殖链条，从根本上控制种群增长。研究表明，当某一地理区域内 70%的流浪猫完成绝育后，出生率将显著下降，种群开始趋于稳定；当绝育率达到 100%时，种群数量将显著减少。

> *“Studies show that when 70% of street cats in a given geographical area are neutered, births decrease and the population stabilises. Above 70%, the population begins to decrease, drastically as 100% neutering is reached.”*
> ***——欧盟动物福利组织 TNR 绝育手册***

（3）社区参与原则：TNR 强调社区居民、志愿者、兽医和政府部门的协作配合。国际伴侣动物管理联盟（ICAM）指出，有效的猫群管理需要“多方利益相关者的参与和合作”。社区的支持和参与是 TNR 项目成功的关键，居民的配合和理解能够大大减少项目实施中的阻力。志愿者的无私奉献是项目运行的基础，他们的专业知识和热情投入使得 TNR 项目得以持续开展。政府部门的支持和引导则为项目提供了政策保障和资源支持。

（4）长期管理原则：TNR 不是一次性活动，而是需要持续监测和管理的长期过程。放归后的猫咪需要定期投喂和健康监测，新加入的猫咪也需要及时捕捉绝育。长期管理还包括对猫群数量的持续监测、对健康状况的定期评估、对投喂点和猫窝的维护更新等。只有通过持续的管理和投入，才能确保 TNR 项目的长期效果和可持续性。

（二）TNR 的基本原则

1. 全面捕捉原则

TNR 的首要原则是尽可能捕捉目标区域内的所有猫咪。Alley Cat Allies 强调："在第一次捕捉尝试中，制定计划并尽可能捕捉所有猫和小猫。这一点很重要，因为猫越多次接触捕捉过程，它们对捕捉器就越怀疑。"

> *"Make plans and attempt to trap ALL cats and kittens during your first trapping session. This is important because the more times cats are exposed to the trapping process, the more suspicious they become of traps."*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

欧盟动物福利组织建议使用"大规模捕捉"方法："一次性捕捉整个猫群总是比逐步或分阶段捕捉更可取。如果一次只抓一只猫，你将很难捕捉到最后的几只，因为它们会与已经绝育并放归的猫混在一起。"

2. 优先顺序原则

在资源有限的情况下，应遵循以下优先顺序：

- 优先捕捉怀孕母猫和带幼崽的母猫，防止更多小猫出生；
- 优先捕捉发情期的母猫，减少繁殖机会；
- 优先捕捉年轻猫咪，它们恢复更快，适应力更强；
- 优先捕捉健康状况较差的猫咪，及时提供医疗帮助；
- 优先捕捉新出现的猫咪，防止其融入已绝育群体后难以捕捉。

欧盟动物福利组织特别强调，在资源有限的情况下，应优先处理繁殖能力强的个体：“当资源有限时，应优先绝育能够繁殖的猫。这意味着应优先处理母猫，因为一只母猫每年可以产下多窝小猫，而一只公猫可以与多只母猫交配。”

3. 安全第一原则

TNR 过程中，猫咪和操作人员的安全都是首要考虑。Alley Cat Allies 特别强调：“切勿将设置好的人道捕捉器无人看管。为了猫咪的安全和福祉，如果你因任何原因必须离开，即使是几个小时，也不要将设置好的捕捉器留在原地。”

> *“Never Leave Set Humane Traps Unattended. For the safety and well-being of the cats, DO NOT leave set humane traps behind if you have to leave for any reason, even if just for a few hours.”*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

安全原则还包括：极端天气条件下不进行捕捉；捕捉后立即用布覆盖捕捉器以减少猫咪应激；绝育前至少禁食 6-8 小时（小猫 3 小时），防止麻醉并发症；捕捉器应放置在平稳的地面上，防止倾倒；运输过程中应固定捕捉器，避免滑动和碰撞。

4. 快速放归原则

猫咪绝育后应尽早放归。根据 Julie Levy 博士（佛罗里达大学 Maddie Shelter Medicine Program 主任）的研究：“如果猫咪清醒警觉，可以在手术后 24 小时放归到户外家园。然而，如果外面结冰，由于麻醉药物会影响猫咪调节体温的能力，你可能需要考虑将猫咪多留一段时间。但总的来说，尽快放归猫咪。”

> *“According to Julie Levy (DVM, PhD), a leading cat veterinarian and researcher, cats can be returned to their outdoor homes 24 hours after surgery if they're clear-eyed and alert. However, always return the cats as soon as you can. 'Rapid return' is associated with better outcomes, as confinement is extremely stressful for most community cats.”*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

5. 持续监测原则

TNR 不是一次性活动，而是需要长期监测和管理。欧盟动物福利组织建议："即使 TNR 项目完成后，每个猫群都应该有一份记录，必须不断更新以下信息：TNR 项目的开始和结束日期及后续监测；绝育猫的数量（公猫、母猫、小猫）；被领养猫的数量；生病和受伤猫的数量；安乐死的猫数量及原因；从现场消失的猫数量；被发现死亡的猫数量及死因；新加入或被遗弃到猫群的猫数量；照顾者联系方式。"

（三）TNR 实施流程

1. 准备阶段

根据 Alley Cat Allies 的指南，准备阶段包括以下关键步骤：

（1）评估猫咪及其环境：了解猫群数量、健康状况、社交化程度；与社区沟通，获得支持；记录每只猫的信息。

> *"Assess the Cats and Their Environment. Use Alley Cat Allies' Community Cat Colony Tracking System to record the number of cats in a colony and a brief description of each, including health status. Include photos of each cat, if possible."*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

（2）建立投喂时间表：在捕捉前至少两周，每天在固定时间和地点投喂，让猫咪习惯在特定时间和地点出现。

（3）寻找合作的兽医诊所：选择有流浪猫和 TNR 经验的兽医或诊所，确认价格、预约政策、疫苗要求、耳标程序等。

（4）设置收容/恢复区域：选择室内、干燥、温度可控（约 75°F/24°C）的过夜收容/恢复区域，如浴室、地下室、车库等。确保恢复区域安静，其他动物无法进入。

（5）准备捕捉工具包：包括捕捉器（每只猫一个，另加几个备用）、诱饵（金枪鱼、鲭鱼、沙丁鱼罐头）、湿巾、叉子或勺子、报纸、捕捉器标签、捕捉器罩布、弹簧扣或扎带、垃圾袋、厚手套、车辆衬垫等。

2. 捕捉阶段

捕捉阶段应遵循以下步骤：

捕捉是 TNR 项目中最关键的环节之一，也是技术要求最高的环节。成功的捕捉不仅需要合适的设备，还需要对猫咪行为的了解和耐心。根据 Alley Cat Allies 的经验，捕捉成功率与准备工作的充分程度直接相关。

捕捉前的准备工作包括：确认所有猫咪的位置和数量；检查捕捉器的状态，确保触发板灵敏；准备足够的诱饵（金枪鱼、鲭鱼、沙丁鱼罐头等气味浓烈的食物）；准备覆盖捕捉器的布料；确认运输车辆和恢复区域已准备就绪。

（1）捕捉前 24 小时停止投喂，但始终提供水源，确保猫咪足够饥饿而进入捕捉器。提醒其他照顾者和邻居也停止投喂。

（2）在捕捉当天，准备所有捕捉器：清点捕捉器数量；用报纸垫在捕捉器底部；测试触发板功能；在捕捉器最深处放约一汤匙诱饵；将诱饵汁沿捕捉器地板呈之字形滴向入口。

（3）将捕捉器放置在猫群所在地的水平地面上，确保捕捉器稳定不摇晃。金属捕捉器不应放置在特别热或冷的地面上，否则可能对猫爪造成疼痛。

（4）设置捕捉器后，远离该区域并在猫咪视线之外。耐心等待。在每个捕捉器处，等待猫咪进入并触发捕捉器。

（5）一旦猫咪被捕捉，冷静地接近捕捉器：不要打开捕捉器或触摸猫咪，即使看起来猫咪在伤害自己。猫咪被捕捉后可能会挣扎，这完全正常。用布覆盖捕捉器会立即让它们平静下来。

3. 手术阶段

手术阶段的标准程序包括：

手术是 TNR 项目的核心环节，直接关系到猫咪的健康和项目的成功率。手术应在具备适当设施和资质的兽医诊所进行，由经验丰富的兽医操作。手术过程应遵循标准的兽医操作规程，确保猫咪的安全和福利。

手术前的准备工作包括：确认猫咪已禁食足够时间；进行术前健康评估；准备麻醉设备和监测设备；准备手术器械和耗材；确认术后恢复区域已准备就绪。

- 全身检查：评估猫咪的整体健康状况；
- 绝育手术：公猫去势（睾丸切除），母猫绝育（卵巢子宫切除）；
- 耳标标记：在左耳尖部切除约 3/8 英寸（约 1 厘米），作为已绝育的永久标识；
- 驱虫治疗：根据需要进行体内外驱虫；
- 疫苗接种：根据资源情况接种狂犬病疫苗和猫三联疫苗（FVRCP）。

> *“Eartipping is the painless removal of the tip of a cat's left ear (approximately 3/8 inch) while they are under anesthesia. An eartip is the universal identifier of a neutered and vaccinated community cat, and lets people know that the cat is healthy and should be left alone.”*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

4. 恢复阶段

恢复阶段的关键要点：

术后恢复是确保手术成功的重要环节。猫咪在麻醉恢复期间体温调节能力较弱，容易受到寒冷的影响。因此，恢复区域的温度控制至关重要。同时，猫咪在恢复期间可能会表现出焦虑、不安或攻击性，这是正常的应激反应，不应过度担心。

恢复期间的监测内容包括：观察呼吸是否正常；检查伤口是否有出血或感染迹象；观察猫咪是否能够正常站立和行走；监测体温和食欲恢复情况。如发现任何异常情况，应立即联系兽医。

（1）让猫咪在捕捉器中过夜恢复。确保捕捉器保持在已准备好的温控安静恢复区域。当猫咪从麻醉中恢复时，无法调节体温，因此恢复区域温暖但不热（约 75°F/24°C）非常重要。

（2）猫咪恢复期间，保持捕捉器被覆盖，这可以减少猫咪的压力，确保你和它们的安全。

（3）监测猫咪：留意出血、感染、疾病或食欲不振。如果猫咪出血、呕吐、呼吸不规律或无法醒来，立即联系兽医！

（4）6 个月以下的小猫在从麻醉中醒来后不久即可喂食。成年猫可以在醒来几小时后喂食，但你也可以等到将它们放归猫群地点后再喂食。

5. 持续监测阶段

持续监测是 TNR 项目长期成功的关键。监测内容包括：猫群数量变化、新加入猫咪的发现和捕捉、已绝育猫咪的健康状况、投喂点的使用情况、社区居民的反馈等。通过定期监测，可以及时发现问题并采取相应措施。

监测频率应根据猫群规模和项目阶段确定。项目初期（前 6 个月）应进行密集监测，每周至少一次；项目稳定期（6 个月后）可以适当降低监测频率，每月 1-2 次。监测内容应包括：猫群数量统计、新猫咪发现和捕捉情况、已绝育猫咪的健康状况、投喂点使用情况、社区居民反馈等。

监测数据的记录和分析对于项目评估和改进至关重要。建议使用统一的记录表格，记录每次监测的日期、时间、到场猫咪数量和特征、健康状况观察、异常情况等。定期分析监测数据，评估项目效果，发现问题并及时调整策略。

欧盟动物福利组织建议建立完善的监测记录系统：“每个猫群都应该有一份记录，必须不断更新以下信息：TNR 项目的开始和结束日期及后续监测；绝育猫的数量（公猫、母猫、小猫）；被

领养猫的数量；生病和受伤猫的数量；安乐死的猫数量及原因；从现场消失的猫数量；被发现死亡的猫数量及死因；新加入或被遗弃到猫群的猫数量；照顾者联系方式。”

6. 放归阶段

放归阶段的标准程序：

放归是 TNR 项目的最后一个环节，也是猫咪回归正常生活的重要时刻。正确的放归程序可以减少猫咪的应激，帮助它们快速适应原来的环境。放归时间的选择也很重要，清晨或傍晚是较好的选择，因为此时环境相对安静，猫咪更容易适应。

放归后的注意事项包括：继续提供食物和水，帮助猫咪恢复体力；观察猫咪的行为和健康状况，确保没有异常；如发现猫咪有异常情况（如伤口感染、食欲不振等），应及时联系兽医；继续监测猫群动态，及时发现新加入的猫咪。

（1）将猫咪放归到捕捉它们的同一地点。清晨是好时机，因为比较安静。将捕捉器指向远离道路或高流量区域的方向，以免猫咪跑向这些地方。

（2）打开捕捉器的前门，然后完全移除罩布。如果捕捉器有后门，将罩布移开并拉起门（如果捕捉器允许），然后完全移除罩布并走开。注意保持距离，手指和手尽可能远离猫咪。

（3）放归猫咪后，提供食物和水。如果你是猫咪的照顾者，可以恢复猫咪的常规投喂时间表。

（4）猫咪被放归后可能会离开该区域几天，但最终会回来。

（5）用无毒消毒剂清洁捕捉器，扔掉所有报纸，清洗捕捉器罩布。

二、猫窝标准与尺寸规范

为流浪猫提供安全、温暖、干燥的庇护所是 TNR 项目的重要组成部分。合适的猫窝不仅能在恶劣天气条件下保护猫咪，还能减少它们进入人类居住区域的需求，从而降低人猫冲突。本章根据国际最佳实践，制定猫窝的标准与尺寸规范。

（一）猫窝尺寸标准

1. 成年猫单窝尺寸

根据 Alley Cat Rescue 社区猫管理手册的建议，成年猫单窝的标准尺寸如下：

成年猫单窝尺寸标准		
项目	标准	说明
长度	45-50 厘米	确保猫咪可以完全伸展身体
宽度	35-40 厘米	提供足够的转身空间
高度	35-40 厘米	允许猫咪站立不碰头
入口直径	15-18 厘米	足够猫咪进出，但防止大型动物进入
入口高度	10-15 厘米（距地面）	方便进出，防止雨水灌入

2. 多只猫共用猫窝尺寸

对于关系亲密的猫群，可以提供较大的共用猫窝。欧盟动物福利组织建议：

多只猫共用猫窝尺寸标准

项目	标准	说明
长度	70-90 厘米	容纳 2-3 只猫咪
宽度	50-60 厘米	提供共享空间
高度	45-50 厘米	内部空间充足
入口数量	2 个（相对设置）	防止被其他动物堵住出口
入口直径	15-18 厘米	标准尺寸

> *“The trap must be about 90 cm long in order to serve as a cage for the cat before and after neutering. If it is smaller, it will be difficult to feed the cat and keep the area clean. A trap larger than 90 cm is unnecessary as it can be too bulky and heavy.”*
> ***——欧盟动物福利组织 TNR 绝育手册***

3. 母猫带幼崽专用猫窝

母猫带幼崽时需要更大的空间。建议尺寸为：长度 60-70 厘米，宽度 45-50 厘米，高度 40-45 厘米。入口应设置在侧面较高位置（距地面 15-20 厘米），防止幼崽意外爬出。

（二）猫窝材料选择

1. 主体材料

猫窝主体材料应具备以下特性：保温隔热、防水防潮、耐用坚固、无毒无害。推荐材料包括：

- 木质材料：18-20 毫米厚度的松木、杉木或胶合板，具有良好的保温性能；
- 塑料材料：食品级 PP 塑料或 HDPE 塑料，防水耐用，易于清洁；
- 泡沫材料：高密度 EPS 泡沫板（厚度 3-5 厘米），作为保温层使用；
- 金属材料：不锈钢或镀锌钢板，用于框架支撑；

- 回收材料：可使用旧轮胎、塑料箱等回收材料制作猫窝，环保且经济。

材料选择应根据当地气候条件和资源情况灵活调整。在寒冷地区，保温性能是首要考虑因素；在潮湿地区，防水性能尤为重要；在资源有限的地区，可以使用回收材料制作简易猫窝。

Alley Cat Allies 建议："提供安全庇护所。猫咪需要温暖、干燥的地方，远离人群。你可以自己制作或购买。"

2. 保温材料

冬季猫窝必须配备保温材料。根据 Alley Cat Rescue 的冬季猫窝指南：

- 内衬材料：羊毛毯、旧毛衣、稻草或专用宠物保温垫；
- 保温材料：泡沫板、反射膜（如 Mylar）或专用保温材料；
- 防水处理：外部使用防水涂料或覆盖防水布。

> *"Even in colder climates, the females shaved fur for surgery won't cause them to get sick if they have adequate shelter. In mild climate countries this is not even an issue."*
> ***——欧盟动物福利组织 TNR 绝育手册***

3. 材料安全要求

所有材料必须符合以下安全标准：

- 无毒性：不得使用含甲醛、苯等有害物质的材料；
- 无尖锐边缘：所有边角应打磨光滑，防止划伤猫咪；
- 防啃咬：避免使用易被啃食的材料（如普通泡沫塑料）；
- 阻燃性：材料应具有一定的阻燃性能。

（三）猫窝设计要求

1. 结构设计原则

猫窝设计应遵循以下原则：

- 紧凑型设计：猫窝内部空间应紧凑，猫咪的身体热量可以保持内部温暖；
- 双层结构：建议采用双层设计，内层保温，外层防风防水；
- 可拆卸顶盖：便于清洁和更换内衬；
- 抬离地面：猫窝底部应抬离地面 10-15 厘米，防止潮湿和寒冷。

2. 入口设计

入口是猫窝设计的关键部分，应满足以下要求：

- 入口尺寸：直径 15-18 厘米，足够猫咪进出但防止大型动物进入；
- 入口位置：设置在侧面，距地面 10-15 厘米，防止雨水灌入；
- 入口形状：圆形或椭圆形，避免直角边缘；
- 入口挡板：可设置透明塑料挡板，防风同时允许猫咪观察外部；
- 双入口设计：对于多只猫共用的猫窝，建议设置两个相对的入口，防止被堵住。

Alley Cat Rescue 特别强调入口设计的重要性：“入口的大小和位置对猫窝的使用率有很大影响。入口太小会让猫咪感到不安全，太大则可能让其他动物进入。”

3. 通风设计

良好的通风对猫咪健康至关重要。设计要求包括：

通风设计是猫窝设计中容易被忽视但非常重要的环节。良好的通风可以保持猫窝内部空气新鲜，减少氨气和其他有害气体的积累，降低呼吸道疾病的风险。同时，适当的通风也有助于调节猫窝内部的温度和湿度，为猫咪提供更舒适的休息环境。

- 通风孔：在猫窝顶部或侧面设置直径 2-3 厘米的通风孔 2-4 个；
- 通风孔位置：应高于猫咪休息位置，避免直接吹风；
- 防雨设计：通风孔应设置遮雨檐，防止雨水进入。

通风设计的注意事项：通风孔的位置应高于猫咪休息位置，避免直接吹风；通风孔应设置遮雨檐，防止雨水进入；通风孔的数量和大小应根据猫窝大小和当地气候条件确定；冬季可以适当减少通风量，夏季则应增加通风。

4. 清洁设计

便于清洁是猫窝设计的重要考虑因素：

猫窝的清洁卫生直接关系到猫咪的健康和福利。一个易于清洁的猫窝可以大大减少疾病传播的风险，同时也便于志愿者进行日常维护。在设计猫窝时，应充分考虑清洁的便利性，确保所有角落都能够方便地进行清洁和消毒。

清洁设计的具体建议：可拆卸顶盖或侧板，方便定期清洁和消毒；内部使用防水材料，便于擦拭清洁；底部可设置小孔，防止积水；避免使用容易藏污纳垢的复杂结构；内衬材料应易于更换和清洗。

- 可拆卸顶盖或侧板：方便定期清洁和消毒；
- 防水内衬：内部使用防水材料，便于擦拭清洁；
- 排水孔：底部可设置小孔，防止积水。

（四）猫窝放置规范

1. 选址原则

猫窝放置位置的选择直接影响猫咪的使用率和安全性。根据国际最佳实践，选址应遵循以下原则：

- 隐蔽性：选择人迹罕至的隐蔽位置，如灌木丛后、建筑物侧面；
- 安全性：远离交通要道、施工区域和有毒物品存放处；
- 便利性：靠近投喂点，但保持一定距离（5-10 米），避免食物气味吸引其他动物；
- 稳定性：放置在平整、稳固的地面上，防止倾倒。

> *“Cats need warm, dry places to stay that are away from populated areas.”*
> ***——Alley Cat Allies 社区猫照护指南***

2. 冬季放置要求

冬季猫窝的放置需要特别注意：

冬季是流浪猫生存最困难的季节，低温、寒风和冰雪都可能对猫咪造成严重威胁。因此，冬季猫窝的放置需要特别用心，确保猫咪能够获得足够的保护和温暖。除了猫窝本身的设计，放置位置和方式也对保温效果有很大影响。

冬季猫窝放置的具体建议：朝向东南方向，避免北风直吹；利用建筑物、围墙或灌木丛阻挡寒风；使用砖块或木块将猫窝垫高 15-20 厘米，隔离地面寒气；在猫窝外部覆盖防水布或旧毯子，增加保温效果；在猫窝内部放置充足的保温材料，如稻草、毛毯等；定期检查猫窝的保温状况，及时补充保温材料。

- 朝向：入口朝向东南方向，避免北风直吹；
- 避风：利用建筑物、围墙或灌木丛阻挡寒风；
- 垫高：使用砖块或木块将猫窝垫高 15-20 厘米，隔离地面寒气；
- 覆盖：在猫窝外部覆盖防水布或旧毯子，增加保温效果。

> *“Dry, warm shelters, especially during harsh winters, are also important to maintain the health of animals.”*
> ***——欧盟动物福利组织 TNR 绝育手册***

3. 夏季放置要求

夏季猫窝放置应考虑防暑降温：

夏季高温对流浪猫同样构成威胁，特别是老年猫、幼猫和患病猫咪更容易受到热应激的影响。因此，夏季猫窝的放置需要特别注意防暑降温，确保猫咪能够在炎热的天气中获得凉爽的休息环境。

夏季猫窝放置的具体建议：放置在树荫下或建筑物阴影处，避免阳光直射；确保周围空气流通良好，避免闷热；避免放置在空调外机、变压器等热源附近；可以在猫窝附近放置水盆，供猫咪饮水和降温；定期检查猫窝内部的温度，确保不过热；如发现猫咪有中暑迹象（如呼吸急促、流口水、虚弱等），应及时采取措施。

- 遮阴：放置在树荫下或建筑物阴影处；
- 通风：确保周围空气流通良好；
- 远离热源：避免放置在空调外机、变压器等热源附近。

4. 猫窝数量配置

猫窝数量的配置应根据猫群规模和分布情况确定。一般原则是：每只猫应有独立的休息空间，但猫窝可以共用。对于关系亲密的猫群，可以配置较大的共用猫窝；对于独来独往的猫咪，应配置单独的小型猫窝。

猫窝配置建议：小型猫群（1-3 只）配置 1-2 个猫窝；中型猫群（4-8 只）配置 2-3 个猫窝；大型猫群（9 只以上）配置 3-5 个猫窝。猫窝之间应保持适当距离（3-5 米），避免猫咪之间的冲突。

5. 猫窝与投喂点的关系

猫窝和投喂点的合理布局对于 TNR 项目的成功至关重要。猫窝和投喂点之间应保持适当距离（5-10 米），这样既可以方便猫咪获取食物，又可以避免食物气味吸引其他动物进入猫窝。同时，这种布局也可以减少猫咪在进食时受到惊吓的风险。

Alley Cat Allies 建议："猫窝应放置在远离投喂点的地方，这样可以防止食物气味吸引其他动物进入猫窝，同时也可以为猫咪提供一个安静的休息环境。"

6. 维护要求

猫窝的定期维护对保持其功能至关重要：

猫窝的维护工作是 TNR 项目管理的重要组成部分，良好的维护可以延长猫窝的使用寿命，确保猫咪始终有一个安全舒适的休息环境。维护工作应由志愿者定期进行，并建立维护记录，便于追踪和管理。

- 每周检查：检查猫窝结构完整性，及时修复损坏；
- 每月清洁：彻底清洁并消毒猫窝内部；
- 每季更换：更换内衬和保温材料；
- 每年评估：评估猫窝整体状况，必要时更换。

维护工作的具体内容：每周检查猫窝结构完整性，及时修复损坏；每月清洁并消毒猫窝内部，更换内衬和保温材料；每季评估猫窝整体状况，必要时更换；每年对猫窝进行全面检查和维护，确保其功能正常；记录维护情况，便于追踪和管理。

三、绝育标准与规范

绝育手术是 TNR 项目的核心环节。规范的绝育标准不仅关系到手术的成功率，更直接影响猫咪的健康和福利。本章综合国际权威指南，制定流浪猫绝育的标准与规范。

（一）绝育年龄与体重标准

1. 最低年龄标准

关于流浪猫绝育的最低年龄，国际指南存在不同观点，但总体趋势是支持早期绝育。

美国防虐协会（ASPCA）的立场："ASPCA 支持对 5 个月大的猫进行绝育，并支持兽医在评估每只猫的健康状况、体重和性成熟程度后，对 8 周大、体重至少 2 磅（约 0.9 公斤）的猫进行绝育。"

> *"ASPCA supports neutering cats at five months of age and supports veterinarians who neuter cats at eight weeks and two pounds of body weight or greater, after evaluating each cat's health, weight, and degree of sexual maturity."*
> ***——美国防虐协会流浪猫绝育技术手册***

欧盟动物福利组织建议："理想情况下，猫应该在 8 个月大之前绝育，如果可能的话，在 4 个月大之前。"

> *"Ideally, cats should be neutered before they are 8 months old, if possible before 4 months."*
> ***——欧盟动物福利组织 TNR 绝育手册***

Alley Cat Rescue 的实践经验："我们的经验是，大多数兽医诊所对 8 周大的小猫进行绝育没有问题。然而，我们仍然看到一些兽医拒绝在 6 个月大之前绝育。"

综合各指南建议，流浪猫绝育的最低年龄标准如下：

流浪猫绝育年龄标准		
项目	标准	说明
最低年龄	8 周（2 个月）	适用于健康、体重达标的小猫
理想年龄	4-5 个月	大多数指南推荐的标准年龄
最晚年龄	8 个月	应在首次发情前完成绝育
成年猫	无上限	任何年龄的成年猫均可绝育

2. 最低体重标准

体重是评估猫咪是否适合绝育的重要指标。美国防虐协会明确指出："ASPCA 支持兽医对 8 周大、体重至少 2 磅（约 0.9 公斤）的猫进行绝育。"

体重标准的制定基于以下考虑：首先，体重是衡量猫咪发育程度的重要指标，过轻的猫咪可能器官发育不完全，麻醉风险较高。其次，体重直接影响麻醉药物的剂量计算，准确的体重测量是安全麻醉的基础。最后，体重也是评估猫咪营养状况的重要参考，过瘦的猫咪可能需要术前营养支持。

对于体重不达标的猫咪，应采取以下措施：延长术前营养支持期，提供高营养密度的食物；密切监测体重变化，待达到标准后再安排手术；如情况紧急（如怀孕母猫），应在兽医指导下进行风险评估后决定。

根据国际猫科医学会的建议，绝育体重标准如下：

流浪猫绝育体重标准		
项目	标准	说明
最低体重	2 磅（约 0.9 公斤）	适用于 8 周龄以上的小猫

理想体重	3-4 磅（约 1.4-1.8 公斤）	手术风险更低
成年猫	无最低要求	根据健康状况评估
超重猫	需评估	肥胖可能增加手术风险

3. 孕期母猫绝育标准

孕期母猫的绝育是一个需要谨慎处理的问题。根据欧盟动物福利组织的建议：

> *“If a cat is pregnant, the veterinarian should neuter her as soon as possible. In the case of a late pregnancy, the veterinarian should discuss with the association whether it is safe to neuter her or whether it is better to wait until the kittens are born. In the latter case, the veterinarian should discuss with the association whether the cat should be released or kept until the kittens are weaned.”*
> ***——欧盟动物福利组织 TNR 绝育手册***

孕期母猫绝育的标准流程：

- 早期妊娠（1-4 周）：可以安全绝育，手术风险较低；
- 中期妊娠（5-7 周）：需要兽医评估，根据母猫健康状况决定；
- 晚期妊娠（8 周以上）：建议等待分娩后绝育，除非有健康风险；
- 哺乳期：可以在小猫断奶后立即绝育；
- 假孕状态：需要兽医判断，通常可以正常绝育。

美国防虐协会对孕期母猫绝育的立场：“ASPCA 支持兽医在评估母猫健康状况后，对怀孕母猫进行绝育。绝育可以防止更多小猫出生，从长远来看对猫群管理更有利。”

（二）术前检查要求

1. 基础健康评估

术前健康评估是确保手术安全的关键步骤。根据国际猫科医学会的指南，术前评估应包括以下内容：

- 体格检查：评估猫咪的整体健康状况，包括体温、心率、呼吸；
- 体重测量：准确测量体重，用于麻醉剂量计算；
- 脱水评估：检查皮肤弹性、牙龈湿润度，评估脱水程度；
- 营养状况：评估体况评分（BCS），判断营养状况；
- 体表检查：检查皮肤、毛发、耳朵、眼睛等外部器官；
- 口腔检查：检查牙齿和牙龈健康状况；
- 腹部触诊：检查腹部是否有异常肿块或积液。

体况评分（Body Condition Score, BCS）是评估猫咪营养状况的重要指标。评分范围为 1-9 分，其中 1 分为极度消瘦，5 分为理想体重，9 分为极度肥胖。流浪猫的理想 BCS 为 4-5 分。过瘦的猫咪可能需要术前营养支持，过胖的猫咪则可能面临更高的麻醉风险。

> *“A physical examination should be performed on each cat prior to surgery. This examination should include an assessment of the cat's overall health, including body condition, hydration status, and any signs of illness or injury.”*
> ***——国际猫科医学会流浪猫管理指南***

2. 血液检查标准

血液检查的要求因资源条件和猫咪状况而异。根据各指南的建议：

血液检查的主要目的是评估猫咪的肝肾功能、血糖水平、红细胞和白细胞计数等指标，从而判断猫咪是否能够安全接受麻醉和手术。肝肾功能异常可能影响麻醉药物的代谢，增加手术风险；贫血可能降低猫咪对手术的耐受能力；感染或炎症可能导致术后恢复延迟。

- 理想情况：术前进行完整的血液生化检查和血常规；
- 最低要求：对老年猫（7 岁以上）或有健康问题的猫进行血液检查；
- 资源有限时：可根据体格检查结果决定是否进行血液检查；
- 紧急情况：对于需要紧急手术的猫咪，可跳过血液检查。

对于资源有限的 TNR 项目，可以采取分级检查策略：对所有猫咪进行基础体格检查；对老年猫、病弱猫或有异常表现的猫咪进行血液检查；对年轻健康的猫咪可以根据兽医判断决定是否进行血液检查。这种策略既能保证手术安全，又能控制项目成本。

美国防虐协会指出："术前血液检查可以帮助识别潜在的健康问题，但在资源有限的情况下，可以根据兽医的专业判断决定是否进行。"

3. 心肺功能评估

心肺功能评估是术前检查的重要组成部分。通过听诊检查心率和心律，评估是否存在心脏杂音或心律不齐。观察呼吸频率和呼吸模式，检查是否存在呼吸困难或异常呼吸音。对于老年猫或有心脏病风险的猫咪，建议进行心电图或胸部 X 光检查。

欧盟动物福利组织建议："对于老年猫或有健康问题的猫，应进行更详细的心肺功能评估，以确保手术安全。"

4. 传染病筛查

传染病筛查是保护群体健康的重要措施。根据国际猫科医学会的建议：

- 猫免疫缺陷病毒（FIV）：建议对所有流浪猫进行筛查；
- 猫白血病病毒（FeLV）：建议对所有流浪猫进行筛查；
- 猫泛白细胞减少症（猫瘟）：根据流行病学情况决定。

> *"Testing for FIV and FeLV is recommended for all community cats. Cats that test positive should be evaluated individually to determine the most appropriate course of*

> *action.”*
>
> ***——国际猫科医学会流浪猫管理指南***

4. 麻醉风险评估

麻醉风险评估是术前检查的重要组成部分。评估内容包括：年龄因素（老年猫和幼猫麻醉风险较高）、体重因素（过瘦或过胖都增加风险）、健康状况（心脏病、呼吸系统疾病等增加风险）、应激水平（高度应激的猫咪麻醉风险增加）。

美国防虐协会建议：“兽医应根据每只猫的具体情况评估麻醉风险，并选择最适合的麻醉方案。对于高风险猫咪，可能需要调整麻醉药物或剂量，或采取额外的监测措施。”

5. 特殊情况处理

对于特殊情况，需要调整术前检查标准：

特殊情况下的术前检查需要根据具体情况灵活调整。对于怀孕母猫，除常规检查外，需评估妊娠阶段和胎儿状况，以决定是否可以安全绝育。对于哺乳期母猫，需评估乳汁分泌情况和幼崽喂养状况，确保绝育不会影响幼崽的生存。对于伤病猫，应根据伤情或病情进行针对性检查，评估手术风险和必要性。对于老年猫，应加强心脏、肾脏功能评估，确保其能够耐受麻醉和手术。

- 怀孕母猫：除常规检查外，需评估妊娠阶段和胎儿状况；
- 哺乳期母猫：评估乳汁分泌情况和幼崽喂养状况；
- 伤病猫：根据伤情或病情进行针对性检查；
- 老年猫：加强心脏、肾脏功能评估。

（三）术前准备事项

1. 禁食要求

术前禁食是预防麻醉并发症的重要措施。根据国际指南：

> *"The cat should not eat for at least 6-8 hours prior to surgery. Water can be left out until 3 hours before surgery. For kittens younger than 6 months, the fasting period can be reduced to 3 hours."*
> ***——欧盟动物福利组织 TNR 绝育手册***

禁食标准总结：

术前禁食标准		
项目	**标准**	**说明**
成年猫（6 个月以上）	6-8 小时	食物
成年猫（6 个月以上）	3 小时	水
幼猫（2-6 个月）	3 小时	食物
幼猫（2-6 个月）	1-2 小时	水
哺乳期母猫	4-6 小时	食物（需评估）
怀孕母猫	6-8 小时	食物

2. 术前用药

术前用药的目的是减少应激、预防感染和控制疼痛。根据各指南的建议：

术前用药是确保手术顺利进行和术后快速恢复的重要措施。镇静剂可以减少猫咪的应激反应，使其更容易接受麻醉；抗生素可以预防术后感染，特别是对于流浪猫这种可能携带细菌的动物；止痛药可以减轻术后疼痛，提高猫咪的舒适度；止吐药可以预防麻醉引起的呕吐反应。

术前用药的具体方案应由兽医根据猫咪的具体情况制定。用药剂量应根据猫咪的体重和健康状况精确计算。用药时间通常在手术前 30-60 分钟，以确保药物在手术开始时发挥作用。

- 镇静剂：术前使用可减少猫咪的应激反应；
- 抗生素：预防性使用可降低术后感染风险；

- 止痛药：术前给药可提高术后疼痛管理效果；
- 止吐药：对于有呕吐风险的猫咪可使用。

欧盟动物福利组织建议："术前应给予适当的镇静剂和止痛药。抗生素的使用应根据兽医的专业判断。"

3. 收容/恢复区域准备

收容/恢复区域的准备对于术后猫咪的康复至关重要。根据 Alley Cat Allies 的指南，恢复区域应满足以下要求：室内、干燥、温度可控（约 75°F/24°C）；安静，远离噪音和干扰；其他动物无法进入；有足够的空间放置捕捉器；易于清洁和消毒。

恢复区域的布置应注意：捕捉器之间保持适当距离，防止猫咪之间互相干扰；准备足够的覆盖物（毛巾或床单）用于覆盖捕捉器；准备食物和水，供术后猫咪恢复后食用；准备清洁用品，用于清理排泄物。

4. 捕捉和运输准备

捕捉和运输是术前准备的重要环节。根据 Alley Cat Allies 的指南：

捕捉和运输的准备工作直接影响捕捉的成功率和猫咪的安全。充分的准备工作可以减少猫咪的应激，提高捕捉效率，同时也能够确保猫咪在运输过程中的安全。准备工作应在捕捉前一天完成，确保所有设备和物资都已就绪。

捕捉准备的详细步骤：确认所有猫咪的位置和数量；检查捕捉器的状态，确保触发板灵敏；准备足够的诱饵（金枪鱼、鲭鱼、沙丁鱼罐头等气味浓烈的食物）；准备覆盖捕捉器的布料；确认运输车辆和恢复区域已准备就绪。

- 捕捉器准备：使用标准的人道捕捉器，底部铺垫报纸；
- 捕捉时间：手术前一天进行捕捉，确保有足够时间禁食；
- 运输安全：将捕捉器固定在车辆中，防止滑动；

- 覆盖保护：用布覆盖捕捉器，减少猫咪应激。

> *“Cover the trap with a sheet or towel to help keep the cat calm during transport. Secure the trap in your vehicle so it does not slide around.”*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

4. 手术环境要求

手术环境应符合以下标准：

手术环境的质量直接关系到手术的安全性和成功率。一个合格的手术环境应具备清洁、无菌的条件，配备适当的麻醉和监测设备，以及必要的急救设施。手术应在正规的兽医诊所或动物医院进行，由具备资质的兽医操作。

手术环境的具体要求：手术室应保持清洁，定期进行消毒；手术器械应经过严格消毒，确保无菌；麻醉设备应功能正常，配备适当的监测仪器；急救药品和设备应随时可用，以应对突发情况；手术台应有保温措施，防止猫咪体温过低。

- 手术室：清洁、无菌的手术环境；
- 麻醉设备：配备适当的麻醉机和监测设备；
- 保温设备：手术台和恢复区应有保温措施；
- 急救设备：配备必要的急救药品和设备。

欧盟动物福利组织强调：“手术应在适当的手术设施中进行，配备适当的麻醉和监测设备。”

四、投喂点设置标准

投喂点的合理设置是 TNR 项目成功的重要保障。规范的投喂点不仅能满足流浪猫的基本营养需求，还能减少人猫冲突，促进社区和谐。本章根据国际最佳实践，制定投喂点设置的标准与规范。

（一）选址原则

1. 隐蔽性原则

投喂点应选择相对隐蔽的位置，以减少对居民生活的干扰。根据 Alley Cat Allies 的建议：“投喂点应设置在远离人行道和居民活动区域的地方，以减少猫咪与人类的直接接触。”

- 远离主要通道：避免设置在人行道、楼梯口等人流密集区域；
- 利用自然屏障：选择灌木丛后、建筑物角落等隐蔽位置；
- 夜间投喂：如果条件允许，选择夜间投喂以减少日间干扰。

2. 安全性原则

投喂点的安全性是首要考虑因素。根据美国人道协会的指南：

- 远离交通：投喂点应远离马路、停车场等交通危险区域；
- 远离危险物品：避免靠近垃圾桶、化学品存放处等；
- 防止其他动物：选择大型动物（如狗）难以到达的位置；
- 稳定环境：避免设置在施工区域或可能变动的位置。

> *“Feeding stations should be placed in areas that are safe for the cats, away from traffic and other hazards.”*
> ***——美国人道协会社区猫管理手册***

3. 便利性原则

投喂点应便于志愿者日常管理和维护：

- 易于到达：志愿者能够方便地到达投喂点；
- 靠近水源：便于清洁食具和提供饮用水；
- 便于观察：能够观察猫咪的健康状况和行为变化；
- 靠近猫窝：投喂点与猫窝保持适当距离（5-10 米）。

4. 合法性原则

投喂点的设置应遵守当地法律法规。根据北京市的相关规定：

- 获得许可：在公共区域设置投喂点应获得相关部门许可；
- 不影响卫生：投喂活动不应影响公共环境卫生；
- 不影响他人：投喂活动不应干扰其他居民的正常生活。

根据《北京市动物防疫条例》和《北京市市容环境卫生条例》，投喂流浪动物应遵守相关规定，不得影响公共环境卫生和他人权益。

（二）建设要求

1. 投喂容器标准

投喂容器的选择直接影响投喂效果和卫生状况。根据国际最佳实践：

投喂容器标准		
项目	标准	说明
材质	不锈钢或食品级塑料	耐用、易清洁、无毒

食盆深度	3-5 厘米	防止食物溢出
水盆深度	5-8 厘米	确保足够饮水量
数量	每只猫 1 个食盆+共用 1-2 个水盆	避免争抢
稳定性	底部防滑或加重	防止翻倒

2. 投喂台/架设计

投喂台或投喂架可以提高投喂的规范性和卫生水平：

- 高度：投喂台高度 15-20 厘米，减少地面污染；
- 材质：使用木材或塑料，便于清洁；
- 遮蔽：设置顶棚，防止雨水和落叶污染食物；
- 排水：底部设计排水孔，防止积水；
- 固定装置：使用重物或地钉固定，防止被风吹倒或动物撞翻。

Alley Cat Rescue 建议："投喂台的设计应考虑当地气候条件。在多雨地区，顶棚的设计尤为重要；在风大的地区，固定装置必不可少。"

> *"Feeding stations can be as simple as a covered area where food and water dishes are placed, or more elaborate structures that protect the food from the elements and keep it off the ground."*
> ***——Alley Cat Allies 社区猫照护指南***

3. 标识设置

在投喂点设置适当的标识可以提高公众理解和支持：

- TNR 标识：标明该区域正在进行 TNR 管理；
- 联系方式：提供照顾者的联系方式；

- 说明文字：简要说明 TNR 的意义和目的；
- 注意事项：提醒不要投喂其他食物。

标识的设计应简洁明了，使用醒目的颜色和字体。标识内容应包括：项目名称、TNR 标志、照顾者联系方式、简要说明文字（如“本区域正在进行流浪猫 TNR 管理，请勿投喂其他食物”）。标识应固定在投喂台或附近的固定物上，防止被风吹走或人为破坏。

4. 投喂点数量配置

投喂点数量的配置应根据猫群规模和分布情况确定。一般原则是：每个投喂点服务的猫群规模不宜过大，以避免猫咪之间的争斗和疾病的快速传播。

投喂点配置建议：小型猫群（1-3 只）设置 1 个投喂点；中型猫群（4-8 只）设置 1-2 个投喂点；大型猫群（9 只以上）设置 2-3 个投喂点。投喂点之间应保持适当距离（10-20 米），避免猫咪之间的冲突。

（三）卫生管理要求

1. 日常清洁

投喂点的日常清洁是维护公共卫生的关键。根据各指南的建议：

日常清洁工作应成为志愿者的固定职责，每次投喂后都应进行清洁。清洁工作包括：清洗食盆和水盆、清理剩余食物、清理周围垃圾、检查投喂点设施是否完好等。良好的日常清洁习惯可以有效防止疾病传播，减少蚊虫滋生，维护公共环境卫生。

- 每日清洁：每次投喂后清洁食盆和水盆；
- 定期消毒：每周至少消毒一次食具；
- 清理残渣：及时清理剩余食物，防止腐败；
- 垃圾处理：将垃圾带走，不留在投喂点；

- 防虫措施：定期清理投喂区域，防止蚊虫滋生；
- 记录管理：记录投喂情况和猫咪健康状况，便于追踪。

卫生管理不仅关系到猫咪的健康，也影响社区居民对 TNR 项目的接受度。一个干净整洁的投喂点能够减少居民的抱怨和投诉，而一个脏乱差的投喂点则可能引发社区矛盾，甚至导致项目被迫停止。因此，志愿者应严格遵守卫生管理规范，确保投喂点的整洁有序。

> *“Feeding stations should be kept clean. Remove uneaten food within 30 minutes to avoid attracting insects and wildlife. Clean food and water dishes regularly.”*
> ***——美国人道协会社区猫管理手册***

2. 食物储存

食物的储存方式直接影响食物质量和卫生安全：

食物储存不当可能导致食物变质、营养流失，甚至引发食物中毒。因此，志愿者应重视食物储存管理，确保食物的新鲜和安全。干粮应储存在密封容器中，放置在阴凉干燥处，避免阳光直射和潮湿。湿粮开封后应及时使用，未使用完的应冷藏保存并在 24 小时内使用完毕。

食物储存的注意事项包括：定期检查食物的保质期，及时清理过期食物；储存容器应定期清洗消毒；避免将食物与化学品或其他可能污染食物的物品存放在一起；储存区域应保持清洁，防止虫害侵入。

- 密封储存：使用密封容器储存干粮；
- 防潮防虫：储存环境应干燥、通风；
- 避免阳光直射：防止食物变质；
- 定期检查：定期检查食物是否过期或变质。

3. 疾病预防

投喂点的管理应注意疾病预防：

疾病是流浪猫群面临的主要威胁之一，也是 TNR 项目需要重点关注的问题。通过合理的投喂点管理，可以有效降低疾病传播的风险。定期清洁和消毒是预防疾病的基础措施，同时，观察猫咪的健康状况，及时发现和处理患病个体，也是疾病防控的重要环节。

常见流浪猫疾病包括：上呼吸道感染、猫瘟、猫白血病、猫免疫缺陷病毒感染等。这些疾病的预防主要依靠疫苗接种和良好的卫生管理。对于已确诊患有传染性疾病的猫咪，应及时隔离治疗，防止疾病在猫群中传播。

- 分开食盆：每只猫使用独立的食盆，减少疾病传播；
- 新鲜水源：每天更换新鲜饮用水；
- 观察健康：注意观察猫咪的健康状况，发现异常及时处理；
- 隔离病猫：发现患病猫咪应及时隔离治疗。

（四）投喂次数和数量

1. 投喂频率

投喂频率应根据猫咪的实际需求和资源条件确定。根据国际最佳实践：

投喂频率建议		
项目	**标准**	**说明**
成年猫	每日 1-2 次	早晚各一次最佳
幼猫（2-6 个月）	每日 3-4 次	少量多餐
怀孕/哺乳期母猫	每日 2-3 次	增加营养供给
老年猫	每日 2 次	易于消化的食物
冬季	每日 2 次	增加热量摄入

夏季	每日 1-2 次	注意食物保鲜

> *“Feed cats once or twice a day, at the same time each day. Cats thrive on routine, and regular feeding times help them feel secure.”*
> ***——Alley Cat Allies 社区猫照护指南***

2. 投喂量标准

投喂量应根据猫咪的体重、年龄和活动量确定。参考标准如下：

每日投喂量参考		
项目	**标准**	**说明**
成年猫（4-5 公斤）	50-70 克干粮	或 150-200 克湿粮
幼猫（1-3 公斤）	30-50 克干粮	根据年龄调整
怀孕母猫	增加 25-50%	根据妊娠阶段调整
哺乳期母猫	增加 50-100%	根据幼崽数量调整
老年猫	40-50 克干粮	易于消化、低热量

Alley Cat Allies 建议：“提供足够的食物让猫咪吃饱，但不要过量。剩余食物会吸引野生动物和昆虫。”

3. 食物类型选择

食物类型的选择应考虑营养平衡、成本和便利性：

- 干粮：便于储存和投喂，成本较低；
- 湿粮：水分含量高，适合老年猫和病猫；
- 自制食物：营养全面，但制作耗时；
- 营养补充：可适当添加维生素和矿物质。

> *“Feed a good quality cat food. Dry food is convenient and can be left out longer, while wet food provides additional moisture. A combination of both is ideal.”*
> ***——Alley Cat Rescue 社区猫管理手册***

4. 投喂记录管理

建立完善的投喂记录管理系统对于 TNR 项目的长期运行至关重要。记录内容应包括：投喂日期和时间、投喂食物类型和数量、到场猫咪数量和特征、健康状况观察、异常情况记录等。这些记录不仅有助于监测猫咪的健康状况，还能为种群数量统计和项目效果评估提供数据支持。

投喂记录的管理方法：可以使用纸质记录表格或电子表格进行记录；建议每次投喂后及时记录，避免遗漏或遗忘；定期整理和分析记录数据，发现问题并及时调整；记录应妥善保存，便于后续查询和分析。

Alley Cat Allies 建议使用社区猫群追踪系统：“使用 Alley Cat Allies 的社区猫群追踪系统记录猫群中的猫数量和每只猫的简要描述，包括健康状况。如可能，包括每只猫的照片。”

Alley Cat Allies 建议使用社区猫群追踪系统：“使用 Alley Cat Allies 的社区猫群追踪系统记录猫群中的猫数量和每只猫的简要描述，包括健康状况。如可能，包括每只猫的照片。”

5. 投喂点与社区关系

投喂点的设置和管理直接影响社区居民对 TNR 项目的接受度。良好的社区关系是 TNR 项目成功的关键。因此，在设置投喂点之前，应与社区居民进行充分沟通，解释 TNR 项目的意义和目的，争取他们的理解和支持。

建立良好社区关系的建议包括：定期向社区居民通报项目进展；及时回应居民的关切和投诉；保持投喂点的整洁卫生；邀请感兴趣的居民参与投喂活动；在项目取得成效后，向社区居民展示成果。通过这些措施，可以增进社区居民对 TNR 项目的理解和支持，减少项目实施中的阻力和冲突。

> *“Community support is essential for the success of TNR programs. Engage with community members, address their concerns, and keep them informed about the*

> *program's progress."*
> ***——美国人道协会社区猫管理手册***

处理居民投诉的建议：认真倾听居民的诉求，理解他们的担忧；耐心解释 TNR 项目的科学性和有效性；承诺并实际行动改善问题（如加强卫生管理、调整投喂时间等）；邀请居民参观 TNR 项目现场，增进了解；必要时寻求社区管理部门的协调和支持。

建立良好社区关系的建议包括：定期向社区居民通报项目进展；及时回应居民的关切和投诉；保持投喂点的整洁卫生；邀请感兴趣的居民参与投喂活动；在项目取得成效后，向社区居民展示成果。

> *"Community support is essential for the success of TNR programs. Engage with community members, address their concerns, and keep them informed about the program's progress."*
> ***——美国人道协会社区猫管理手册***

6. 特殊情况处理

特殊情况下的投喂调整：

特殊情况下的投喂需要根据实际情况灵活调整。捕捉前禁食是确保手术安全的重要措施，但应确保猫咪有足够的水源。术后恢复期的猫咪可能需要特殊饮食，应遵医嘱进行投喂。恶劣天气下应增加投喂频率和热量，帮助猫咪维持体温。患病猫咪可能需要处方粮或特殊饮食，应根据病情调整。

特殊情况处理的具体建议：捕捉前 24 小时停止投喂（但提供水源）；术后猫咪可能需要特殊饮食，遵医嘱；极端天气下增加投喂频率和热量；患病猫咪可能需要处方粮或特殊饮食。

- 捕捉前禁食：捕捉前 24 小时停止投喂（但提供水源）；
- 术后恢复：术后猫咪可能需要特殊饮食，遵医嘱；
- 恶劣天气：极端天气下增加投喂频率和热量；
- 疾病期间：患病猫咪可能需要处方粮或特殊饮食。

五、志愿者安全规范

志愿者是 TNR 项目成功实施的关键力量。保障志愿者的安全不仅是人道责任，也是项目可持续运行的基础。本章根据国际最佳实践，制定志愿者安全规范。

（一）个人防护要求

1. 基本防护装备

志愿者在进行 TNR 相关活动时，应配备适当的防护装备。根据 Alley Cat Allies 的指南：

志愿者防护装备清单		
项目	**标准**	**说明**
厚手套	防抓咬伤	捕捉和搬运时使用
长袖衣物	保护手臂	避免皮肤直接接触
长裤	保护腿部	防止被抓伤
封闭式鞋子	保护脚部	避免穿凉鞋或拖鞋
口罩	防止吸入粉尘	清洁猫窝时使用
护目镜	保护眼睛	处理可能飞溅的情况

> *“Always wear thick gloves when handling cats in traps. Even friendly cats can become frightened and scratch or bite when trapped.”*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

2. 狂犬病预防

狂犬病是志愿者面临的主要健康风险之一。根据国际猫科医学会的建议：

- 疫苗接种：建议所有志愿者接种狂犬病疫苗；
- 暴露后处理：被咬伤或抓伤后立即清洗伤口并就医；
- 观察期：如可能，对涉事猫咪进行 10 天观察；
- 记录信息：记录猫咪特征和事件详情，便于追踪。

> *“Rabies is a fatal viral disease that can be transmitted to humans through the bite of an infected animal. All volunteers working with community cats should consider rabies vaccination.”*
> ***——国际猫科医学会流浪猫管理指南***

3. 个人防护装备使用规范

正确使用个人防护装备是保障志愿者安全的重要环节。厚手套应在捕捉、搬运和清洁时使用，确保覆盖手腕以上部位。手套使用后应及时清洁消毒，如有破损应立即更换。口罩应在清洁猫窝、处理粪便或进入 dusty 环境时佩戴，使用后应正确处理，避免二次污染。

护目镜应在处理可能飞溅的情况时使用，如清洁消毒、处理伤口等。长袖衣物和长裤应覆盖所有暴露的皮肤，防止被抓伤或咬伤。封闭式鞋子应具有良好的防滑性能，确保在各种地面条件下都能安全行走。

4. 其他疾病预防

除狂犬病外，志愿者还应注意预防以下疾病：

- 猫抓病：由巴尔通体细菌引起，通过抓伤或咬伤传播；
- 弓形虫病：通过接触猫粪便传播，孕妇应特别注意；
- 癣菌病：真菌性皮肤病，可通过接触传播；

- 寄生虫：跳蚤、蜱虫等可能携带疾病；
- 沙门氏菌病：通过接触受污染的食物或粪便传播。

预防措施包括：接触猫咪后及时用肥皂和流动水洗手至少 20 秒；避免接触猫咪粪便，如必须接触应佩戴手套；定期为猫咪进行体内外驱虫；发现皮肤问题或异常症状及时就医；保持投喂点和猫窝的清洁卫生。

（二）操作行为规范

1. 捕捉操作规范

捕捉是 TNR 过程中风险最高的环节。根据各指南的建议：

- 使用人道捕捉器：禁止使用可能伤害猫咪的捕捉方法；
- 避免直接接触：不要徒手捕捉流浪猫；
- 覆盖捕捉器：捕捉后立即用布覆盖，减少猫咪应激；
- 不要打开捕捉器：除非在兽医指导下，否则不要打开捕捉器；
- 保持冷静：猫咪能感受到人的情绪，保持冷静有助于减少应激。

> *“Never attempt to handle a community cat with your bare hands, even if the cat appears friendly. Always use a humane trap. Once a cat is trapped, cover the trap immediately with a sheet or towel.”*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

2. 运输操作规范

运输过程中的安全注意事项：

- 固定捕捉器：在车辆中固定捕捉器，防止滑动；
- 保持覆盖：运输过程中保持捕捉器被覆盖；
- 避免急刹车：平稳驾驶，减少猫咪应激；

- 控制温度：避免在极端温度下运输；
- 缩短时间：尽量缩短运输时间；
- 避免噪音：关闭音响，保持车内安静；
- 准备应急：携带急救用品和兽医联系方式。

运输过程中的应激可能导致猫咪出现各种健康问题，包括呕吐、腹泻、体温异常等。因此，志愿者应尽量缩短运输时间，保持车内环境安静舒适。如果运输距离较远，应在途中定期检查猫咪的状况，必要时停车休息。到达目的地后，应尽快将猫咪转移到安全的环境中。

3. 投喂操作规范

投喂过程中的安全注意事项：

- 观察环境：投喂前观察周围环境，确保安全；
- 保持距离：与猫咪保持适当距离，避免直接接触；
- 不要强行接近：如果猫咪表现出恐惧或攻击性，保持距离；
- 注意食物卫生：使用清洁的食具，避免交叉污染；
- 及时清理：投喂后及时清理现场，保持卫生。

4. 清洁操作规范

清洁猫窝和投喂点时的安全注意事项：

- 佩戴手套：清洁时佩戴厚手套；
- 佩戴口罩：处理猫砂或粪便时佩戴口罩；
- 使用消毒剂：使用适当的消毒剂清洁；
- 洗手：清洁后彻底洗手；
- 妥善处理垃圾：将垃圾装入密封袋中处理。

（三）风险上报与应急处理

1. 抓咬伤处理

被抓伤或咬伤后的应急处理程序：

- 立即清洗：用肥皂和流动水彻底清洗伤口至少 15 分钟；
- 消毒处理：使用碘伏或酒精消毒；
- 压迫止血：如有出血，用干净纱布压迫止血；
- 就医处理：尽快就医，评估是否需要狂犬病疫苗或破伤风疫苗；
- 记录信息：记录事件时间、地点、猫咪特征等信息。

> *“If you are bitten or scratched by a cat, wash the wound immediately with soap and running water for at least 15 minutes. Seek medical attention promptly.”*
> ***——国际猫科医学会流浪猫管理指南***

2. 过敏反应处理

对猫咪过敏的应急处理：

- 识别症状：打喷嚏、流鼻涕、眼睛发痒、皮肤红疹、咳嗽、胸闷等；
- 远离过敏原：立即停止接触，远离猫咪；
- 清洗暴露部位：清洗可能接触过敏原的皮肤和衣物；
- 服用抗过敏药：如有需要，服用抗组胺药物如氯雷他定或西替利嗪；
- 使用眼药水：眼睛过敏时可使用抗过敏眼药水缓解症状。

严重过敏反应（过敏性休克）的识别和处理：症状包括呼吸困难、喉咙肿胀、心跳加速、血压下降、意识模糊等。如出现这些症状，应立即拨打急救电话，在等待救援期间让患者平躺，抬高双腿。

- 使用抗过敏药：如有需要，服用抗组胺药物；

- 严重反应就医：如出现呼吸困难等严重症状，立即就医。

3. 心理应激处理

TNR 工作可能对志愿者造成心理应激，特别是面对伤病猫咪或需要安乐死的情况。志愿者应学会识别和应对心理应激，保持心理健康。常见的心理应激症状包括：焦虑、失眠、情绪波动、倦怠感等。

应对心理应激的建议包括：与其他志愿者分享感受和经验；适当休息，避免过度劳累；寻求专业心理咨询帮助；参加志愿者支持小组；保持工作与生活的平衡。项目负责人应关注志愿者的心理健康状况，及时提供支持和帮助。

4. 事件上报流程

建立规范的事件上报流程对于风险管理和项目改进至关重要：

事件上报流程的建立有助于及时发现和处理安全问题，防止类似事件的再次发生。同时，事件记录也是项目评估和改进的重要依据，可以帮助项目管理者了解项目中存在的风险点，并采取针对性的预防措施。

事件上报的具体流程：发生安全事件后立即向项目负责人报告；详细记录事件发生的时间、地点、经过和处理情况；如有伤口，拍照记录；保留就医记录和诊断证明；定期分析安全事件，改进操作流程；如涉及保险，及时提交理赔申请；必要时咨询法律专业人士。

- 立即报告：发生安全事件后立即向项目负责人报告；
- 详细记录：记录事件发生的时间、地点、经过和处理情况；
- 拍照留证：如有伤口，拍照记录；
- 医疗记录：保留就医记录和诊断证明；
- 分析改进：定期分析安全事件，改进操作流程；
- 保险理赔：如涉及保险，及时提交理赔申请；

- 法律咨询：必要时咨询法律专业人士。

建立规范的事件上报流程不仅有助于及时处理安全事件，还能为项目的持续改进提供数据支持。通过定期分析安全事件的类型、原因和发生频率，可以发现潜在的风险点，并采取针对性的预防措施。同时，完整的事件记录也是保险理赔和法律纠纷处理的重要依据。

事件分析的要点：分析事件发生的根本原因，而不仅仅是表面现象；识别事件发生的规律和趋势，预测潜在风险；根据分析结果，制定针对性的预防措施；定期向志愿者通报事件分析结果，提高安全意识；将事件分析结果纳入志愿者培训内容，防止类似事件再次发生。

5. 志愿者培训要求

志愿者培训是保障项目安全和效果的重要环节。所有参与 TNR 项目的志愿者都应接受基本培训，了解 TNR 的原理、流程和安全规范。培训内容应包括：TNR 的基本概念和原理、捕捉技术和设备使用、猫咪行为学基础、个人防护和安全规范、应急处理程序等。

培训方式可以包括：线上培训课程、现场实操培训、经验丰富的志愿者带教、定期复训和技能更新等。培训结束后应进行考核，确保志愿者掌握了必要的知识和技能。对于参与捕捉和运输的志愿者，还应进行专门的实操培训。

培训内容的具体安排：TNR 的基本概念和原理（2 小时）；捕捉技术和设备使用（4 小时，包括实操）；猫咪行为学基础（2 小时）；个人防护和安全规范（2 小时）；应急处理程序（2 小时）。总计约 12 小时的培训，确保志愿者全面掌握 TNR 的相关知识和技能。

培训方式可以包括：线上培训课程、现场实操培训、经验丰富的志愿者带教、定期复训和技能更新等。培训结束后应进行考核，确保志愿者掌握了必要的知识和技能。对于参与捕捉和运输的志愿者，还应进行专门的实操培训。

> *“All volunteers should receive proper training before participating in TNR activities. Training should cover trapping techniques, cat behavior, safety protocols, and emergency procedures.”*
> ***——Alley Cat Allies TNR 指南***

6. 保险与法律责任

志愿者应了解相关的保险和法律责任：

保险和法律责任是 TNR 项目管理中不可忽视的重要环节。志愿者在参与 TNR 活动时可能面临各种风险，包括被抓伤、咬伤、感染疾病等。因此，为志愿者购买适当的保险是保障其权益的重要措施。同时，志愿者也应了解自身的法律责任，避免因不当行为引发法律纠纷。

保险类型的建议：意外伤害保险，覆盖志愿者在 TNR 活动中发生的意外伤害；医疗保险，覆盖因 TNR 活动导致的医疗费用；责任保险，覆盖因志愿者行为导致的第三方损失。保险的具体内容和保额应根据项目规模和风险评估确定。

法律责任的注意事项：志愿者应遵守相关法律法规，不得从事违法活动；志愿者应遵守项目操作规程，避免因违规操作导致事故；志愿者应尊重他人权益，不得侵犯他人财产或人身安全；如发生法律纠纷，应及时寻求法律专业人士的帮助。

知情同意书的内容应包括：TNR 项目的介绍和目的；志愿者可能面临的风险和危险；个人防护装备的使用要求；应急处理程序和联系方式；保险和赔偿责任的相关规定；志愿者的权利和义务。

- 志愿者保险：建议为志愿者购买意外伤害保险；
- 责任界定：明确志愿者、组织和猫咪照顾者的责任；
- 知情同意：志愿者应签署知情同意书，了解风险；
- 法律咨询：必要时咨询法律专业人士。

知情同意书的内容应包括：TNR 项目的介绍和目的；志愿者可能面临的风险和危险；个人防护装备的使用要求；应急处理程序和联系方式；保险和赔偿责任的相关规定；志愿者的权利和义务。

> *“Organizations should consider liability insurance for their TNR programs and volunteers. Volunteers should be informed of potential risks and sign waivers when*

> *appropriate.”*
>
> ***——美国人道协会社区猫管理手册***

结语

流浪猫群护、绝育与救助是一项需要专业知识、技能和持续投入的社会公益事业。随着城市化进程的加快和宠物饲养数量的增加，流浪猫问题日益成为城市管理和公共卫生的重要议题。传统的捕杀方法不仅残忍，而且效果有限，往往导致种群快速恢复甚至增长。相比之下，TNR 方法通过科学的人道管理，能够在保护动物福利的同时有效控制种群数量，是解决流浪猫问题的最佳实践方案，值得在城市管理中广泛推广和应用。

本标准综合了国际猫科医学会（ISFM）、国际伴侣动物管理联盟（ICAM）、美国人道协会（Humane Society of the United States）、美国防虐协会（ASPCA）、Alley Cat Allies、Alley Cat Rescue 以及欧盟动物福利组织等权威机构的指南和最佳实践，结合中国实际情况，为流浪猫 TNR 项目提供了系统、全面的标准规范。这些标准涵盖了 TNR 救助原则、猫窝标准、绝育规范、投喂点设置和志愿者安全等各个方面，为 TNR 项目的规范实施提供了科学依据和操作指南。

本标准的制定参考了大量国际权威文献和实践经验，包括国际猫科医学会的流浪猫管理指南、国际伴侣动物管理联盟的猫种群管理原则、美国人道协会和美国防虐协会的 TNR 技术手册、Alley Cat Allies 和 Alley Cat Rescue 的社区猫管理指南、以及欧盟动物福利组织的 TNR 绝育手册等权威文献。这些文献和实践经验为本标准提供了坚实的理论和实践基础，确保了标准的科学性和可操作性。

TNR 方法已被证明是一种人道、有效的流浪猫种群管理方式。通过规范的捕捉、绝育、耳标和放归流程，可以在不伤害猫咪的前提下，实现种群数量的长期控制和稳定。研究表明，当某一区域内 70%以上的流浪猫完成绝育后，种群出生率将显著下降，种群数量开始趋于稳定；当绝育率达到 100%时，种群数量将显著减少。这种渐进式的种群管理方式，避免了捕杀带来的伦理争议和社会反弹，同时通过耳标标记实现了对绝育猫咪的识别和保护，防止重复捕捉。

TNR 方法的优势不仅体现在种群控制效果上，还体现在动物福利和社区关系方面。与捕杀方法相比，TNR 更加人道，符合现代社会的动物保护理念；与无管理状态相比，TNR 可以有效减少

流浪猫的繁殖，降低种群数量，减少人猫冲突，改善社区环境。因此，TNR 被越来越多的城市和组织采纳为流浪猫管理的首选方案。

同时，合理的猫窝设置、投喂点管理和志愿者安全规范，能够确保 TNR 项目的可持续运行。猫窝为流浪猫提供了温暖、干燥的庇护所，特别是在恶劣天气条件下，能够显著提高猫咪的生存质量。规范的投喂点设置不仅满足猫咪的营养需求，还能减少人猫冲突，促进社区和谐。志愿者安全规范则保障了参与者的健康和安全，是项目长期运行的重要保障。

本标准的实施需要各方的共同努力和配合。政府部门应提供政策支持和资金保障，将 TNR 纳入城市管理的常态化工作体系；兽医行业应提供专业的技术支持，建立流浪猫绝育服务网络；社区应提供场地支持和居民配合，为 TNR 项目的实施创造良好环境；志愿者应提供人力支持和专业投入，确保项目的顺利运行；公众应提高动物保护意识，支持 TNR 项目，不随意弃养宠物。

我们呼吁更多的社区、志愿者和政府部门参与到流浪猫 TNR 事业中来，共同推动人与动物和谐共处的美好愿景。社区的支持和参与是 TNR 项目成功的关键，居民的配合和理解能够大大减少项目实施中的阻力。志愿者的无私奉献是项目运行的基础，他们的专业知识和热情投入使得 TNR 项目得以持续开展。政府部门的支持和引导则为项目提供了政策保障和资源支持，有助于将 TNR 纳入城市管理的常态化工作体系，实现流浪猫问题的长效治理和科学管理。

展望未来，我们希望看到更多的城市将 TNR 纳入官方流浪动物管理政策，建立完善的 TNR 支持体系，包括兽医服务网络、志愿者培训机制和社区教育项目。同时，我们也呼吁从源头上减少流浪猫的产生，通过加强宠物登记管理、推广绝育意识、禁止随意弃养等措施，从根本上解决流浪猫问题。只有政府、社区、志愿者和公众共同努力，才能实现人与动物和谐共处的美好愿景，建设更加文明、友善的城市环境。

TNR 项目的成功实施需要多方协作和持续投入。政府部门应提供政策支持和资金保障，将 TNR 纳入城市管理的常态化工作体系；兽医行业应提供专业的技术支持，建立流浪猫绝育服务网络；社区应提供场地支持和居民配合，为 TNR 项目的实施创造良好环境；志愿者应提供人力支持和专业投入，确保项目的顺利运行；公众应提高动物保护意识，支持 TNR 项目，不随意弃养宠物。只有各方共同努力，才能实现流浪猫问题的有效治理。

参考文献：

中国宠物管理白皮书 (China Pet Management White Paper)

中国宠物行业市场报告 (China Pet Industry Market Report)

北京市动物防疫条例(Beijing Animal Epidemic Prevention Regulations)

北京市市容环境卫生条例(Beijing City Appearance and Environmental Sanitation Regulations)

国际猫科医学会（ISFM）. 流浪猫管理与福利官方指南（ISFM Guidelines on Population Management and Welfare of Unowned Cats）

国际伴侣动物管理联盟（ICAM）. 猫种群管理原则指南（ICAM Cat Population Management Guidance）

美国人道协会（HSUS）. 社区猫管理手册（Humane Society of the United States Community Cat Program Handbook）

美国防虐协会（ASPCA）. 流浪猫绝育技术手册（ASPCA Trap-Neuter-Return Veterinary Protocols）

Alley Cat Allies. 社区猫照护与管理的实操指南（Alley Cat Allies Community Cat Care and Management Guide）

Alley Cat Allies. TNR 指南（Alley Cat Allies Trap-Neuter-Return Guide）

Alley Cat Rescue. 社区猫管理手册（Alley Cat Rescue Community Cat Management Handbook）

Alley Cat Rescue. 冬季猫窝指南（Alley Cat Rescue Winter Shelter Guide）

欧盟动物福利组织. TNR 绝育手册（European Union Animal Welfare Organization TNR Neutering Handbook）

Julie Levy 博士. 佛罗里达大学 Maddie Shelter Medicine Program 流浪猫研究

刘蕾. 北京市流浪动物治理研究

流浪猫群护、绝育与救助标准

Standard Procedures

for Cat TNR / Rescue

北地动物保护协会原创

综合国际指南与国内实践

2025 年 12 月

CUGBAPA@outlook.com