

第11讲 Steiner 树 and TSP

MST-近似 — Steiner 树
MST-松弛 — TSP

G' 必是一棵树, 记作 Steiner 树
 $S' \setminus S$ 中的点为 Steiner 点

先看 Steiner 树问题:

• 给定 $G=(V, E)$, $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$
完全图 (满足度量要求)
 $S \subseteq V$

• 求一个 G 的连通子图 $G'=(S', E')$
 $S \subseteq S'$, 且 $\sum_{e \in E'} w(e)$ 最小

NP-hard


相关问题: 欧氏平面上的 Steiner 树问题, 用最短路表按将平面上给定的点连起来。

NP-hard

近似算法: 用MST求解

分析该算法:

$$S = \{v_1, \dots, v_n\}$$



$$\frac{l_{MST}^*}{l_{SMT}} = \frac{2(n-1)}{n} \rightarrow 2$$

下面证明该算法的近似比就是2

证明: 考虑最优解 T^*

将 T^* 的边复制一遍, 得到图 $2T^*$, 其为欧拉图
从 S 中的一点出发沿着欧拉回路的方向, 跳过所有 Steiner 点和已访问点, 得到一条 S 上的路径 P , 那么:

$$l_{MST} \leq l(P) \leq l(2T^*) = 2l(T^*)$$

研究进展

$\frac{96}{95}$

负面: NO PTAS, if $P \neq NP$

正面: $\frac{11}{6}$ -approx, Zelikovsky
1993

1.59

1999

1.55


2000

$\ln 4 + \epsilon$
 ≈ 1.3863

Byrka et al.

欧氏平面上的 Steiner 树问题

MST: $\sqrt{3}$ -approximation



Gilbert-Pollak 猜想

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$$

一般用 $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$

Arora (1998 JACM)
 $(1+\epsilon)$ -approx

TSP

问题: $G = (V, E)$ 完全图
 $C: E \rightarrow \mathbb{R}^+$
求 G 上费用最小的哈密顿圈 (TSP 环路)

也就是确定顶点的一个顺序 π
使得 $\sum_{i=1}^n C(v_{\pi(i)}, v_{\pi(i+1)})$
最小, $\pi(n+1) = \pi(1)$

若 C 任意 $K = 2^{\text{poly}(n)}$
则不存在 K -近似算法

考虑哈密顿圈问题
反 $G_1 = (V, E_1)$ 是否含 H-圈? NPC
证 \Downarrow
 $G = (V, E)$ 完全图, $c(e) = \begin{cases} 1, & e \in E_1 \\ nk, & e \notin E_1 \end{cases}$

$$C_{\text{opt}} = n \iff C_A \leq nk$$
$$C_{\text{opt}} \geq nk + n - 1 \iff C_A \geq nk + 1$$

假设 C 满足三角不等式, 即


$$C_{uv} \leq C_{uw} + C_{wv}$$

MST 松弛算法

1. 先求 G 的 MST, 得 T^*
2. 将 T^* 扩展为欧拉图, 得 G_e
3. 沿着 G_e 的欧拉回路 **不重复** 地构造一个 H-圈 H_c

$$G_e \xrightarrow{\text{short-cut}} H_c$$

例:




2. 将 T^* 上的边复制
 $G_e = 2T^*$

$$\begin{aligned} \text{知: } C(H_c) &\leq C(G_e) \\ &= 2C(T^*) \\ &\leq 2C(H_c^*) \end{aligned}$$

例子

$2n+1$ 个顶点

T^* : v_0 为中心的星图



G_e : $v_0 v_1 v_0 v_3$
 $v_0 \dots v_{2n-1} v_0$
 $v_2 v_0 v_4 \dots$
 $v_{2n} v_0$

H_c : $v_0 v_1 v_3$
 $\dots v_{2n-1} v_2$
 $\dots v_{2n} v_0$

其它边费用为 2

$$C(H_c^*) = 2n+1$$

$$C(H_c) = 2(2n-1) + 2 = 4n$$

改进

2. 求 T^* 中奇度点的最小权完美匹配 M^* , $G_e = T^* \cup M^*$

$$C(H_c) \leq C(T^*) + C(M^*)$$


$$\leq C(H_c^*) + \frac{1}{2} C(H_c^*) = \frac{3}{2} C(H_c^*)$$



$$\geq 2C(M^*)$$

例3

n 个顶点



$n+1$ 个顶点

其它顶点间的距离由所给边下的最短路径确定

易知: $C(H_c^*) = 2n+1$

T^* 为 $v_1, v_2, \dots, v_{2n+1}$, $C(T^*) = 2n$

M^* 为 v_1, v_{2n+1} $C(M^*) = n$

故

$$\frac{C(H_c)}{C(H_c^*)} = \frac{3n}{2n+1} \rightarrow \frac{3}{2}$$

Review

上述算法来自 Christofides
(1976)

最新进展: 2020 (88页)

摘要: For some $\varepsilon > 10^{-36}$, we give
a $3/2 - \varepsilon$ approximation
algorithm for metric TSP

by Karlin, Klein, Gharan