ICS 65.080.20
CCS B 31

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB13/T 5532—2022

日光温室春黄瓜-秋黄瓜-越冬蒜苗栽培技术规程

2022-02-28 发布　　2022-03-31 实施

河北省市场监督管理局　　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：石家庄市华茂农业开发有限公司、河北省农林科学院经济作物研究所、石家庄市鹿泉区绿康果蔬农民专业合作社、鹿泉区绿翠苑家庭农场、石家庄市鹿泉区特色农产品协会、鹿泉区美田苑家庭农场。

本文件主要起草人：刘云、付吉海、曹岩坡、杨阳、王俊花、梁玉芹、梁文哲、付秀青、左秀丽、王长梅、张红、高志翔、张卫霞、付莉、李瑞敏。

日光温室春黄瓜-秋黄瓜-越冬蒜苗栽培技术规程

1 范围

本文件规定了日光温室春黄瓜-秋黄瓜-越冬蒜苗栽培模式的产地环境、茬口安排、栽培设施要求及早春茬黄瓜、秋延后黄瓜、越冬蒜苗栽培技术等要求。

本文件适用于日光温室春黄瓜-秋黄瓜-越冬蒜苗栽培模式。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16715.1 蔬菜作物种子 瓜类

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 496 肥料合理使用准则

DB13/T 1418 高温闷棚土壤消毒技术规程

DB13/T 2776.4 集约化生产蔬菜种苗质量 第4部分:黄瓜

DB13/T 2844 黄瓜嫁接育苗技术规程

DB13/T 5197 日光温室越冬长季节黄瓜化肥农药减施技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产地环境

产地环境按NY/T 391的要求选择。

5 茬口安排

早春茬黄瓜1月上旬播种，2月中旬定植，6月中旬拉秧。秋延后黄瓜7月中旬直播，11月中旬拉秧。蒜苗11月下旬播种，1月至2月采收。

6 栽培设施要求

选择冬季最低气温在5 ℃以上的日光温室。

7 早春茬黄瓜栽培技术

7.1 品种选择

选用耐低温、早熟、抗病、丰产、商品性好的品种，如津优35、津优315、中农26等。种子质量符合GB/T 16715.1的要求。

7.2 育苗

按DB13/T 2844的要求进行，种苗质量符合DB13/T 2776.4的要求。

7.3 定植前准备

7.3.1 棚室消毒

定植前每亩用45%百菌清烟剂110 g～180 g，密闭熏蒸24 h。

7.3.2 施肥整地

亩施腐熟有机肥4 m^3～5 m^3，或商品有机肥1000 kg～1500 kg，硫酸钾型复混肥（$N-P_2O_5-K_2O$=15-15-15）40 kg～60 kg，土壤深翻整平，起垄，高约15 cm，下宽70 cm～80 cm、上宽50 cm～60 cm、垄距40 cm～50 cm，铺设滴灌管，垄与沟均覆盖地膜。肥料使用符合NY/T 496的要求。

7.4 定植

晴天上午定植，株距25 cm～33 cm。

7.5 定植后管理

7.5.1 温湿度管理

缓苗期，白天温度25 ℃～32 ℃，夜间不低于15 ℃，此阶段基本不放风，空气相对湿度控制在80%～90%；缓苗后，白天温度22 ℃～26 ℃，夜间不低于12 ℃，中午前后不超过30 ℃，注意放风排湿，空气相对湿度调控为60%～80%。结瓜期，白天温度25 ℃～30 ℃，夜间不低于13 ℃。当外界最低温度达15 ℃以上时，昼夜通风。

7.5.2 水肥管理

定植时浇水，亩滴灌15 m^3～25 m^3；定植5 d～7 d后浇缓苗水，至根瓜坐瓜前不旱不浇水，根瓜长15 cm左右时开始浇水，亩滴灌6 m^3～10 m^3，盛瓜期，3 d～5 d 浇一水，亩滴灌10 m^3～12 m^3，隔水施一次肥，亩追施硫酸钾型水溶肥（$N-P_2O_5-K_2O$=20-8-22）5 kg～10 kg。中后期叶面喷施0.2%尿素和0.3%磷酸二氢钾溶液。

7.5.3 光照调节

连阴天，在保证温度的情况下早揭晚盖。

7.6 植株调整

植株25 cm～30 cm高时，拉绳绕蔓；高度超过拉绳顶部时及时落蔓，并保留12～16片功能叶；及时打掉卷须、黄、老、病叶。

7.7 病虫害防治

主要病虫害有霜霉病、细菌性角斑病、白粉病、灰霉病、蚜虫、白粉虱、根结线虫等，防治方法按DB13/T 5197的要求进行。

7.8 采收

根瓜早收，其他瓜达到商品成熟时及时采收。

8 秋延后黄瓜栽培技术

8.1 品种选择

秋延后栽培选用抗病、耐热、高产、商品性好的品种，如津优406号、中农106号等。种子质量符合GB/T 16715.1的要求。

8.2 高温闷棚

前茬黄瓜拉秧后，彻底清理温室。按DB13/T 1418的要求进行。

8.3 整地施肥

同7.3.2。

8.4 播种

按株距30 cm～35 cm挖穴点籽，每穴2～3粒种子，覆土1 cm～2 cm。

8.5 田间管理

8.5.1 温湿度管理

播种后，温度保持25 ℃～33 ℃，高温时采取覆盖遮阳网、喷水等措施降低温度。苗期，小水勤浇，以降低地温，白天温度控制在25 ℃～30 ℃；结瓜期白天温度25 ℃～30 ℃，夜温15 ℃～18 ℃，外界最低气温15 ℃以上时，昼夜通风。结瓜后期，夜温低于13 ℃时封闭温室，夜间最低温度降到8 ℃时，加盖保温被保温。

8.5.2 中耕定苗

子叶展开后中耕松土，及时间苗，3～4片真叶时定苗，每穴留苗一株。

8.5.3 水肥管理

苗期，保持土壤见干见湿，开花前浇水追肥，每亩追施硫酸钾型水溶肥（N-P_2O_5-K_2O=22-12-16）4 kg～6 kg。结瓜前期2 d～4 d浇一次水，结瓜中后期5 d～7 d浇一次水，10 d～15 d追次肥，每次亩施硫酸钾型水溶肥（N-P_2O_5-K_2O=20-8-22）7.5 kg～10 kg。结瓜中后期叶面喷施0.2%尿素或0.3%磷酸二氢钾溶液。

8.6 植株调整

同7.6。

8.7 病虫害防治

同7.7。

8.8 采收

同 7.8。

9 越冬蒜苗栽培技术

9.1 品种选择

选择抗病、耐寒、叶宽且柔软、优质高产的大瓣品种，如中蒜3号。

9.2 播种

精选肥大圆整、蒜瓣整齐、无病斑、无损伤的蒜头，按行距18 cm～20 cm，株距12 cm～15 cm栽植蒜头，埋深5 cm～6 cm。

9.3 田间管理

9.3.1 温度管理

播种后至出苗，白天温度26 ℃～28 ℃；齐苗后，白天温度18 ℃～22 ℃；收获前4 d～5 d，白天温度12 ℃～16 ℃。

9.3.2 水肥管理

出苗前保持土壤湿润，齐苗后浇1水，当幼苗长至7 cm～10 cm时浇 1水，每茬浇水2～3次。第1茬收割后7 d～10 d，喷施叶面肥1次。

9.4 采收

蒜苗高20 cm～25 cm，留茬1.5 cm～2.5 cm收割。