

a
Male share vs GEST (binned, FE-residualised)
Male share, residual (pp)
GEST, residual (°C)
Gestational anomaly (°C)
Hot
Temperate
Cool
b
Baseline climate × anomaly
> 0.75
0.25 to 0.75
±0.25
−0.75 to −0.25
< −0.75
-0.17 -0.22 +0.14 -0.14 -0.08 +0.00 +0.07 +0.02
+0.30 +0.07 +0.02 -0.03 +0.00 +0.08 -0.06 -0.01
-0.07 +0.03 -0.10 +0.01 +0.02 -0.01 +0.02 -0.01
+0.07 -0.05 +0.11 +0.08 -0.04 -0.09 -0.02 +0.04
-0.47 +0.01 -0.06 -0.11 +0.07 +0.19 +0.01 -0.07
<16
16–19
19–21
21–23
23–24.5
24.5–26
26–27
>27
Cell mean temperature, 1991–2020 (°C)
Male share, residual (pp)
c
Timing of exposure (exploratory)
pre-conception
gestation
birth
Cool
Hot
pp per 1 °C in the block
−18 −15 −12 T1 T2 T3 0–2 3–5 6–8 9–11
3-month exposure block (months relative to birth)
d
Country estimates
NG
CD
SN
ET
pooled +0.03; 47 countries
Precision (1/SE)
Country estimate (pp per °C)