初等数论 整除,同余和不定方程

LeyuDame

2024年11月1日

整除的概念与基本性质

对任给的两个整数 $a, b(a \neq 0)$, 如果存在整数 q, 使得 b = aq, 那么称 b 能被 a 整除 (或称 a 能整除 b), 记作 $a \mid b$. 否则, 称 b 不能被 a 整除, 记作 $a \nmid b$. 如果 $a \mid b$, 那么称 a 为 b 的因数, b 为 a 的倍数.

整除的概念与基本性质

性质 1.1

如果 $a \mid b$, 那么 $a \mid (-b)$,反过来也成立; 进一步, 如果 $a \mid b$, 那么 $(-a) \mid b$,反过来也成立.

性质 1.2

如果 a|b,b|c, 那么 a|c. (传递性)

性质 1.3

若 a|b,a|c, 则对任意整数 x,y, 都有 $a\mid bx+cy$. (即 a 能整除 b,c 的任意一个"线性组合")

若 a|n, b|n, 且存在整数 x, y, 使得 ax + by = 1, 证明: $ab \mid n$.

证明: 无论在数 12008 的两个 0 之间添加多少个 3 , 所得的数都是 19 的倍数.

已知一个 1000 位正整数的任意连续 10 个数码形成的 10 位数是 2^{10} 的倍数. 证明: 该正整数为 2^{1000} 的倍数.

设 m 是一个大于 2 的正整数,证明:对任意正整数 n ,都有 $2^m-1 \nmid 2^n+1$.

素数与合数

性质 1.4

设 n 为大于 1 的正整数, p 是 n 的大于 1 的因数中最小的正整数, 则 p 为素数.

性质 1.5

如果对任意 1 到 \sqrt{n} 之间的素数 p, 都有 $p \nmid n$, 那么 n 为素数. 这里 n(>1) 为正整数.

证明.

事实上, 若 n 为合数, 则可写 $n=pq, 2\leqslant p\leqslant q$. 因此 $p^2\leqslant n$, 即 $p\leqslant \sqrt{n}$. 这表明 p 的素因子 $\leqslant \sqrt{n}$, 且它是 n 的因数, 与条件矛盾. 因此 n 为素数.



素数与合数

性质 1.6

素数有无穷多个.

证明.

若只有有限个素数,设它们是 $p_1 < p_2 < \cdots < p_n$. 考虑数

$$x = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$$

其最小的大于 1 的因数 p, 它是一个素数, 因此, p 应为 p_1, p_2, \cdots, p_n 中的某个数. 设 $p=p_i, 1\leqslant i\leqslant n$, 并且 $x=p_iy$, 则 $p_1p_2\cdots p_n+1=p_iy$, 即

$$p_i(y - p_1 p_2 \cdots p_{i-1} p_{i+1} \cdots p_n) = 1.$$

这导致 $p_i | 1$. 矛盾. 所以, 素数有无穷多个.

设 n 为大于 1 的正整数. 证明: 数 $n^5 + n^4 + 1$ 不是素数.

考察下面的数列:

 $101, 10101, 1010101, \cdots$

问: 该数列中有多少个素数?

例 7 求所有的正整数 n, 使得 $\frac{n(n+1)}{2} - 1$ 是一个素数.

对任意正整数 n, 证明: 存在连续 n 个正整数, 它们都是合数.

设 n 为大于 2 的正整数. 证明: 存在一个素数 p, 满足 n .

设 a,b,c,d,e,f都是正整数, S=a+b+c+d+e+f是 abc+def和 ab+bc+ca-de-ef-ed 的因数. 证明: S 为合数.

最大公因数与最小公倍数

带余数除法

设 a, b 是两个整数, $a \neq 0$, 则存在唯一的一对整数 q 和 r, 满足

$$b = aq + r, 0 \leqslant r < |b|$$

其中 q 称为 b 除以 a 所得的商, r 称为 b 除以 a 所得的余数.



性质 1.7 (贝祖 (Bezout) 定理)

设 d = (a, b),则存在整数 x, y,使得

$$ax + by = d$$

性质 1.8

设 d 为 a, b 的公因数, 则 $d \mid (a, b)$.

性质 1.9

设 a, b 是不全为零的整数, 则 a 与 b 互素的充要条件是存在整数 x, y 满足

$$ax + by = 1$$

性质 1.10

设 a|c,b|c, 且 (a,b)=1, 则 $ab\mid c$.

性质 1.11

设 $a \mid bc$, 且(a, b) = 1, 则 $a \mid c$.

性质 1.12

设 p 为素数, $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

公倍数

设 a, b 都是不等于零的整数, 如果整数 c 满足 $a \mid c$ 且 $b \mid c$, 那么称 c 为 a, b 的公倍数.

在 a, b 的所有正的公倍数中,最小的那个称为 a, b 的最小公倍数,记作 [a, b] .

性质 1.13

设 a, b 为非零整数, d, c 分别是 a, b 的一个公因数与公倍数, 则 d|(a, b), [a, b]|c.

性质 1.14

设 a, b 都是正整数, 则 $[a, b] = \frac{ab}{(a, b)}$.

性质 1.15

$$(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n) = ((a_1, a_2), a_3, \cdots, a_n);$$
 $\overrightarrow{\text{fit}} [a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n] = [[a_1, a_2], a_3, \cdots, a_n].$

性质 1.16

存在整数 x_1, x_2, \cdots, x_n , 使得

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$$

性质 1.17

设 m 为正整数,则

$$(ma_1, ma_2, \cdots, ma_n) = m(a_1, a_2, \cdots, a_n),$$
 (1)

$$[ma_1, ma_2, \cdots, ma_n] = m[a_1, a_2, \cdots, a_n].$$
 (2)

设 a,b 为正整数, 且 $\frac{ab}{a+b}$ 也是正整数. 证明: (a,b)>1 .

设正整数 a,b,c 满足 $b^2=ac$. 证明: $(a,b)^2=a(a,c)$.

求所有的正整数 $a, b(a \leq b)$, 使得

$$ab = 300 + 7[a, b] + 5(a, b).$$
 (3)

$$(a,b) + 9[a,b] + 9(a+b) = 7ab.$$
(4)

Fibonacci 数列定义如下: $F_1=F_2=1, F_{n+2}=F_{n+1}+F_n, n=1$, $2,\cdots$. 证明: 对任意正整数 m,n , 都有 $(F_m,F_n)=F_{(m,n)}$.

设 n 为大于 1 的正整数. 证明: 存在从小到大排列后成等差数列 (即从第二项起, 每一项与它前面那项的差为常数的数列) 的 n 个正整数, 它们中任意两项互素.