

# CYANMATH: 创美营讲义（数学）

LeyuDame

2024 年 11 月 2 日

# 目录

第一章 整除, 同余和不定方程	3
1.1 整除	3
1.1.1 整除的概念与基本性质	3
1.1.2 素数与合数	6
1.1.3 最大公因数与最小公倍数	10
1.1.4 算术基本定理	17
1.2 同余	45
1.2.1 同余的概念与基本性质	45
1.2.2 剩余系及其应用	49
1.2.3 费马小定理及其应用	53
1.2.4 奇数与偶数	58
1.2.5 完全平方数	61

符号说明

符号	说明
$a \mid b$	$a$ 整除 $b$
$a \nmid b$	$a$ 不整除 $b$
$(a, b)$	$a$ 与 $b$ 的最大公因数
$[a, b]$	$a$ 与 $b$ 的最小公倍数
$p^\alpha \parallel a$	$p^\alpha \mid a$ 但 $p^{\alpha+1} \nmid a$
$a \equiv b(\text{mod} m)$	$a$ 与 $b$ 对模 $m$ 同余
$a \not\equiv b(\text{mod} m)$	$a$ 与 $b$ 对模 $m$ 不同余
$a^{-1}(\text{mod} m)$	$a$ 对模 $m$ 的数论倒数
$[x]$	不超过 $x$ 的最大整数
$\max\{a, b\}$	实数 $a$ $b$ 中较大的数
$\min\{a, b\}$	实数 $a$ $b$ 中较小的数

表 1: 符号说明

# 第一章 整除, 同余和不定方程

## 1.1 整除

任意两个整数的和, 差或积都是整数, 但是两个整数做除法时所得的结果不一定是整数, 因此, 数论中的许多问题都是在研究整数之间的除法.

### 1.1.1 整除的概念与基本性质

**定义 1.1.1.** 对任给的两个整数  $a, b (a \neq 0)$ , 如果存在整数  $q$ , 使得  $b = aq$ , 那么称  $b$  能被  $a$  整除 (或称  $a$  能整除  $b$ ), 记作  $a \mid b$ . 否则, 称  $b$  不能被  $a$  整除, 记作  $a \nmid b$ .

如果  $a \mid b$ , 那么称  $a$  为  $b$  的因数,  $b$  为  $a$  的倍数.

利用整除的定义, 可以非常容易地推导出下面一些经常被用到的性质.

**性质 1.1.1.** 如果  $a \mid b$ , 那么  $a \mid (-b)$ , 反过来也成立; 进一步, 如果  $a \mid b$ , 那么  $(-a) \mid b$ , 反过来也成立. 因此, 我们经常只讨论正整数之间的整除关系.

**性质 1.1.2.** 如果  $a \mid b, b \mid c$ , 那么  $a \mid c$ . 这表明整除具有传递性.

**性质 1.1.3.** 若  $a \mid b, a \mid c$ , 则对任意整数  $x, y$ , 都有  $a \mid bx + cy$ . (即  $a$  能整除  $b, c$  的任意一个“线性组合”)

**例 1.1.1.** 若  $a \mid n, b \mid n$ , 且存在整数  $x, y$ , 使得  $ax + by = 1$ , 证明:  $ab \mid n$ .

**证明.** 由条件, 可设  $n = au, n = bv, u, v$  为整数. 于是

$$\begin{aligned}
 n &= n(ax + by) \\
 &= nax + nby \\
 &= abvx + abuy \\
 &= ab(vx + uy).
 \end{aligned}$$

因此

$$ab \mid n.$$

□

**注记.** 一般地, 由  $a \mid n, b \mid n$ , 并不能推出  $ab \mid n$ , 例如  $2 \mid 6, 6 \mid 6$ , 但  $12 \nmid 6$ . 题中给出的条件实质上表明  $a, b$  的最大公因数 (见 1.3 节) 为 1, 即  $a$  与  $b$  互素, 在此条件下可推出  $ab \mid n$ .

**例 1.1.2.** 证明: 无论在数 12008 的两个 0 之间添加多少个 3, 所得的数都是 19 的倍数.

**证明.** 记  $a_0 = 12008, a_n = 120 \underbrace{3 \cdots 308}_{n \uparrow 3}, n = 1, 2, \cdots$ .

首先, 因为

$$a_0 = 19 \times 632,$$

故

$$19 \mid a_0.$$

其次, 设  $19 \mid a_n$ , 则由

$$a_{n+1} - 10a_n = 228 = 19 \times 12,$$

可知

$$19 \mid a_{n+1}.$$

所以, 对一切整数  $n$ , 数  $a_n$  都是 19 的倍数.

□

**注记.** 此题的处理过程中运用了递推的思想, 其基本思路是将  $a_{n+1}$  表示为  $a_n$  与 19 的一个线性组合.

**例 1.1.3.** 已知一个 1000 位正整数的任意连续 10 个数码形成的 10 位数是  $2^{10}$  的倍数. 证明: 该正整数为  $2^{1000}$  的倍数.

**证明.** 设该正整数  $x = \overline{a_1 a_2 \cdots a_{1000}}$ , 其中  $a_i$  是十进位数码. 由条件, 可知

$$2^{10} \mid \overline{a_{991} \cdots a_{1000}}, 2^{10} \mid \overline{a_{990} \cdots a_{999}}, \quad (1.1)$$

因此

$$2^{10} \mid \overline{a_{990} \cdots a_{999}} \times 10. \quad (1.2)$$

记  $y = \overline{a_{991} \cdots a_{999}}$ , 则式 1.2 又可写作

$$2^{10} \mid a_{990} \times 10^{10} + 10y,$$

故

$$2^{10} \mid 10y.$$

结合  $2^{10} \mid \overline{a_{991} \cdots a_{1000}}$ , 可知

$$2^{10} \mid 10y + a_{1000},$$

于是

$$2^{10} \mid a_{1000},$$

这要求

$$a_{1000} = 0.$$

类似地, 朝前倒推, 可得

$$a_{11} = \cdots = a_{1000} = 0,$$

即

$$x = \overline{a_1 \cdots a_{10}} \times 10^{990}.$$

再结合条件  $2^{10} \mid \overline{a_1 \cdots a_{10}}$ , 即可得

$$2^{1000} \mid x.$$

□

**注记.** 这里先证明  $a_{11} = \cdots = a_{1000} = 0$  是非常关键的, 在证明中利用  $\overline{a_{991} \cdots a_{999}}$  来过渡也是比较巧妙的.

**例 1.1.4.** 设  $m$  是一个大于 2 的正整数, 证明: 对任意正整数  $n$ , 都有  $2^m - 1 \nmid 2^n + 1$ .

**证明.** 如果存在正整数  $n$ , 使得  $2^m - 1 \mid 2^n + 1$ , 那么取其中最小的那个  $n$ .

由于  $m > 2$ , 知  $n > 1$ , 进一步, 应有  $2^n + 1 \geq 2^m - 1$ , 知  $n \geq m$ , 而  $n = m$  时, 将导致  $2^m - 1 \mid 2$ , 矛盾, 故  $n > m$ .

现在, 设  $2^n + 1 = (2^m - 1)q$ , 这里  $q$  为正整数, 则

$$2^n + 2^m = (2^n + 1) + (2^m - 1) = (2^m - 1)(q + 1).$$

即

$$2^m (2^{n-m} + 1) = (2^m - 1)(q + 1)$$

于是,

$$(2^{n-m} + 1) + (2^m - 1)(2^{n-m} + 1) = (2^m - 1)(q + 1),$$

得  $2^{n-m} + 1 = (2^m - 1)(q - 2^{n-m})$ , 因此,  $2^m - 1 \mid 2^{n-m} + 1$ , 与  $n$  的最小性矛盾.

所以, 命题成立. □

**注记.** 这里用到了两个结论: 一个是“若  $a \mid b, b \neq 0$ , 则  $|a| \leq |b|$ ”, 它由整除的定义可直接证出. 另一个是“任意多个正整数中必有最小元”, 这是著名的“最小数原理”.

### 1.1.2 素数与合数

对任意正整数  $n > 1$ , 如果除 1 与  $n$  以外,  $n$  没有其他的因数, 那么称  $n$  为素数. 否则称  $n$  为合数. 这样, 我们将正整数分为了三类: 1, 素数, 合数.

素数从小到大依次为  $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ . 我们可以非常轻松地写出 100 以内的所有素数, 共 25 个. 但是并不是对每个素数  $p$ , 都能轻易地指出  $p$  后面的一个素数是多少. 事实上, 当  $p$  比较大时, 求出它后面的那个素数是十分困难的. 正是素数的这种无规律性, 初等数论才显得魅力无穷, 具有很强的挑战性和极大的吸引力. 素数与合数具有如下的一些性质.

**性质 1.1.4.** 设  $n$  为大于 1 的正整数,  $p$  是  $n$  的大于 1 的因数中最小的正整数, 则  $p$  为素数.

**性质 1.1.5.** 如果对任意 1 到  $\sqrt{n}$  之间的素数  $p$ , 都有  $p \nmid n$ , 那么  $n$  为素数. 这里  $n(> 1)$  为正整数.

**证明.** 事实上, 若  $n$  为合数, 则可写  $n = pq, 2 \leq p \leq q$ . 因此  $p^2 \leq n$ , 即  $p \leq \sqrt{n}$ .

这表明  $p$  的素因子  $\leq \sqrt{n}$ , 且它是  $n$  的因数, 与条件矛盾. 因此  $n$  为素数.  $\square$

**注记.** 这里素因子是指正整数的因数中为素数的那些数, 此性质是我们检验一个数是否为素数的最常用的方法.

**性质 1.1.6.** 素数有无穷多个.

**证明.** 若只有有限个素数, 设它们是  $p_1 < p_2 < \cdots < p_n$ . 考虑数

$$x = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$$

其最小的大于 1 的因数  $p$ , 它是一个素数, 因此,  $p$  应为  $p_1, p_2, \cdots, p_n$  中的某个数. 设  $p = p_i, 1 \leq i \leq n$ , 并且  $x = p_i y$ , 则  $p_1 p_2 \cdots p_n + 1 = p_i y$ , 即

$$p_i(y - p_1 p_2 \cdots p_{i-1} p_{i+1} \cdots p_n) = 1.$$

这导致  $p_i \mid 1$ . 矛盾.

所以, 素数有无穷多个.  $\square$

**注记.** 如果将所有的素数从小到大依次写出为  $2 = p_1 < p_2 < \cdots$ , 并写  $q_n = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ , 那么

$$q_1 = 3, q_2 = 7, q_3 = 31, q_4 = 211, q_5 = 2311$$

它们都是素数. 是否每一个  $n$  都有  $q_n$  为素数呢? 我们不能被表面现象所迷惑, 再朝下算, 可知  $q_6 = 59 \times 509$  就是一个合数. 事实上, 后面的  $q_7, q_8, q_9, q_{10}$  都是合数. 到目前为止, 人们还不知道数列  $q_1, q_2, \cdots$  中是否有无穷多个素数, 也不知道其中是否有无穷多个合数.

**性质 1.1.7.** 素数中只有一个数是偶数, 它是 2.

**例 1.1.5.** 设  $n$  为大于 1 的正整数. 证明: 数  $n^5 + n^4 + 1$  不是素数.



证明. 注意到

$$n^5 + n^4 + 1 \quad (1.3)$$

$$= n^5 + n^4 + n^3 - (n^3 - 1) \quad (1.4)$$

$$= n^3 (n^2 + n + 1) - (n - 1) (n^2 + n + 1) \quad (1.5)$$

$$= (n^3 - n + 1) (n^2 + n + 1) \quad (1.6)$$

因此, 若  $n^5 + n^4 + 1$  为素数, 则  $n^3 - n + 1 = 1$ , 这要求  $n = 0$  或  $\pm 1$ . 故当  $n > 1$  时,  $n^5 + n^4 + 1$  不是素数.  $\square$

注记. 利用因式分解来判断一个数是否为素数是数论中的常见方法, 后面也将不断用到.

例 1.1.6. 考察下面的数列:

$$101, 10101, 1010101, \dots$$

问: 该数列中有多少个素数?

解. 易知 101 是素数. 下证这是该数列中仅有的一个素数.

记  $a_n = 1 \underbrace{0101 \cdots 01}_{n \uparrow 01}$ , 则当  $n \geq 2$  时, 有

$$\begin{aligned} a_n &= 10^{2n} + 10^{2(n-1)} + \cdots + 1 \\ &= \frac{10^{2(n+1)} - 1}{10^2 - 1} \\ &= \frac{(10^{n+1} - 1)(10^{n+1} + 1)}{99}. \end{aligned}$$

注意到,  $99 < 10^{n+1} - 1$ ,  $99 < 10^{n+1} + 1$ , 而  $a_n$  为正整数, 故  $a_n$  是一个合数 (因为分子中的项  $10^{n+1} - 1$  与  $10^{n+1} + 1$  都不能被 99 约为 1).

注记. 这里需要将因式分解式  $x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + 1)$  反用, 高中阶段它被作为等比数列求和的公式.

例 1.1.7. 求所有的正整数  $n$ , 使得  $\frac{n(n+1)}{2} - 1$  是一个素数.

解. 记  $a_n = \frac{n(n+1)}{2} - 1$ , 则  $a_1 = 0$  不是素数, 因此只需讨论  $n > 1$  的情形. 我们利用  $n$  只能是形如  $4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3$  的数分别讨论.

当  $n$  是形如  $4k+2$  或  $4k+1$  的数时,  $a_n$  都是偶数, 要  $a_n$  为素数, 只能是

$$\begin{aligned} \frac{n(n+1)}{2} - 1 &= 2 \\ n &= 2 \end{aligned}$$

解得

当  $n = 4k$  时, 可得

$$a_n = 2k(4k + 1) - 1 \quad (1.7)$$

$$= 8k^2 + 2k - 1 \quad (1.8)$$

$$= (4k - 1)(2k + 1), \quad (1.9)$$

这是一个合数.

当  $n = 4k + 3$  时, 可得

$$a_n = 2(k + 1)(4k + 3) - 1 \quad (1.10)$$

$$= 8k^2 + 14k + 5 \quad (1.11)$$

$$= (4k + 5)(2k + 1), \quad (1.12)$$

仅当  $k = 0$ , 即  $n = 3$  时,  $a_n$  为素数.

所以, 满足条件的  $n = 2$  或  $3$ .

**注记.** 对  $n$  分类处理一方面是去分母的需要, 另一方面是为进行因式分解做准备.

**例 1.1.8.** 对任意正整数  $n$ , 证明: 存在连续  $n$  个正整数, 它们都是合数.

**证明.** 设  $n$  为正整数, 则

$$(n + 1)! + 2, (n + 1)! + 3, \dots, (n + 1)! + (n + 1)$$

是  $n$  个连续正整数, 并且第  $k$  个数是  $k + 1$  的倍数 (且大于  $k + 1$ ), 故它们是连续的  $n$  个合数.  $\square$

**注记.** 这个结论表明: 对任意正整数  $n$ , 都存在两个素数, 它们之间至少有  $n$  个数, 且这些数都是合数. 但是, 让我们来看一些素数对  $(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), \dots, (1997, 1999)$ , 它们所含的两个素数都只相差 2 (这是两个奇素数的最小差距), 这样的素数对称为孪生素数. 是否存在无穷多对素数, 它们是孪生素数? 这是数论中一个未解决的著名问题.

**例 1.1.9.** 设  $n$  为大于 2 的正整数. 证明: 存在一个素数  $p$ , 满足  $n < p < n!$ .

**证明.** 设  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ , 且  $p_1, p_2, \cdots, p_k$  是所有不超过  $n$  的素数, 考虑数

$$q = p_1 p_2 \cdots p_k - 1$$

在  $n > 2$  时, 2, 3 都在  $p_1, \cdots, p_k$  中出现, 故  $5 \leq q \leq n! - 1 < n!$ , 利用性质 1.1.6 证明中的方法, 可知  $q$  的素因子  $p$  不等于  $p_1, p_2, \cdots, p_k$  中的任何一个. 而  $p_1, p_2, \cdots, p_k$  是所有不超过  $n$  的素数, 因此  $p > n$ , 所以  $n < p \leq q < n!$ .

从而, 命题成立.  $\square$

**注记.** 利用本题的结论亦可证出: 素数有无穷多个. 贝特朗曾猜测在  $m > 1$  时, 正整数  $m$  与  $2m$  之间 (不包括  $m$  与  $2m$ ) 有一个素数. 如果将素数从小到大排列为  $p_1 < p_2 < \cdots$ , 该猜测亦即  $p_{n+1} < 2p_n$ . 这个猜测被契比雪夫证明了. 因此它被称为贝特朗猜想或契比雪夫定理.

**例 1.1.10.** 设  $a, b, c, d, e, f$  都是正整数,  $S = a + b + c + d + e + f$  是  $abc + def$  和  $ab + bc + ca - de - ef - ed$  的因数. 证明:  $S$  为合数.

**证明.** 考虑多项式

$$f(x) = (x+a)(x+b)(x+c) - (x-d)(x-e)(x-f)$$

展开后, 可知

$$f(x) = Sx^2 + (ab + bc + ca - de - ef - fd)x + (abc + def)$$

由条件可知, 对任意  $x \in \mathbb{Z}$ , 都有  $S \mid f(x)$ . 特别地, 取  $x = d$ , 就有  $S \mid f(d)$ , 即  $S \mid (d+a)(d+b)(d+c)$ . 由于  $a, b, c, d, e, f$  都为正整数, 故  $d+a, d+b, d+c$  都小于  $S$ , 所以,  $S$  为合数.  $\square$

**注记.** 对比例 1.1.6, 两个例子中分别用到下面的结论: 若  $x, y, z$  为正整数, 且  $\frac{xy}{z}$  亦为整数, 则如果  $x, y > z$ , 那么  $\frac{xy}{z}$  为合数; 如果  $x, y < z$ , 那么  $z$  为合数.

### 1.1.3 最大公因数与最小公倍数

设  $a, b$  是不全为零的两个整数,  $d$  是一个非零整数, 如果  $d \mid a$  且  $d \mid b$ , 那么称  $d$  为  $a, b$  的公因数.

注意到, 当  $d \mid a$  且  $d \mid b$  时, 则  $d \leq |a|$  或  $d \leq |b|$  中必有一个成立 (对  $a, b$  中不为零的数成立). 因此,  $a, b$  的公因数中有一个最大的, 这个

在讨论最大公因数的性质之前, 我们不加证明地引入一个在小学就接触到的、数论中最基本、最常用的结论.

$$b = aq + r, 0 \leq r < |b|$$
$$ax + by = d$$

不妨设  $a, b$  都不为零 (当  $a, b$  中有一个为零时, 结论是显然的), 且  $|a| \leq |b|$ .

除到此为止; 否则用  $a$  去除以  $r_1$ , 得等式  $a = r_1 q_2 + r_2, 0 \leq r_2 < r_1$ ; 依此讨论, 由于  $r_1 > r_2 > r_3 > \cdots$ , 因此辗转相除到某一步后, 所得的  $r_{k+1} = 0$ , 于是, 我们得到了如下的一系列式子:

[illegible]

$$d \mid r_1, d \mid r_2, \dots, d \mid r_k,$$
$$r_k \mid r_{k-1}, r_k \mid r_{k-2}, \dots, r_k \mid r_1, r_k \mid a, r_k \mid b,$$

所以,  $r_k$  又是  $a, b$  的公因数, 结合  $d$  为  $a, b$  的最大公因数知  $r_k \leq d$ , 又  $d \mid r_k$ , 故  $d \leq r_k$ , 因此,  $d = r_k$ . 也就是说, 我们求出了  $a, b$  的最大公因数.

现在, 利用  $d = r_k$  及第  $k$  个式子, 可知

$$d = r_{k-2} - r_{k-1}q_k$$

再由

$$r_{k-1} = r_{k-3} - r_{k-2}q_{k-1} \text{ (第 } k-1 \text{ 个式子变形得),}$$

代入上式, 可知  $d$  可以表示为  $r_{k-2}$  与  $r_{k-3}$  的“线性组合”(见性质 1.1.3), 依此倒推, 可知  $d$  可以表示为  $a, b$  的“线性组合”, 即存在整数  $x, y$  使得

$$d = ax + by.$$

□

注记. 反过来, 设  $x, y$  为整数,  $d' = ax + by$ , 并不能推出  $d'$  为  $a, b$  的最大公因数. 事实上, 可以证明:  $a, b$  的最大公因数是形如  $ax + by$  ( $x, y$  为任意整数) 的正整数中最小的那个.

**性质 1.1.9.** 设  $d$  为  $a, b$  的公因数, 则  $d \mid (a, b)$ .

这个性质可由前面的贝祖定理证出. 事实上, 贝祖定理也是初等数论中的一个基本定理, 应用非常广泛, 下面的性质是它的一个直接推论.

**性质 1.1.10.** 设  $a, b$  是不全为零的整数, 则  $a$  与  $b$  互素的充要条件是存在整数  $x, y$  满足

$$ax + by = 1$$

**性质 1.1.11.** 设  $a \mid c, b \mid c$ , 且  $(a, b) = 1$ , 则  $ab \mid c$ .

这个性质的证明见例 1.1.1.

**性质 1.1.12.** 设  $a \mid bc$ , 且  $(a, b) = 1$ , 则  $a \mid c$ .

**证明.** 由性质 1.1.10, 知存在整数  $x, y$  使得

$$ax + by = 1$$

故  $acx + bcy = c$ , 由  $a \mid bc$  及  $a \mid acx$ , 可知  $a \mid c$ .

□

**性质 1.1.13.** 设  $p$  为素数,  $p \mid ab$ , 则  $p \mid a$  或  $p \mid b$ .

**证明.** 由于  $p$  只有两个正约数, 故  $(p, a) = 1$  或者  $(p, a) = p$ . 若  $(p, a) = 1$ , 则由性质 5 知  $p \mid b$ ; 若  $(p, a) = p$ , 则  $p \mid a$ .  $\square$

下面引入公倍数的一些概念和性质.

设  $a, b$  都是不等于零的整数, 如果整数  $c$  满足  $a \mid c$  且  $b \mid c$ , 那么称  $c$  为  $a, b$  的公倍数. 在  $a, b$  的所有正的公倍数中, 最小的那个称为  $a, b$  的最小公倍数, 记作  $[a, b]$ .

**性质 1.1.14.** 设  $a, b$  为非零整数,  $d, c$  分别是  $a, b$  的一个公因数与公倍数, 则  $d \mid (a, b), [a, b] \mid c$ .

**证明.** 这个性质在本质上反映了最大公因数与最小公倍数的属性. 前者是性质 1.1.9 的结论, 这里再次列出是为了对比.

对于后者, 采用反证法予以证明.

若  $[a, b] \nmid c$ , 设  $c = [a, b] \cdot q + r, 0 < r < [a, b]$ , 则由  $a \mid c$  及  $a \mid [a, b]$ , 可知  $a \mid r$ , 同理  $b \mid r$ , 即  $r$  为  $a, b$  的公倍数, 但  $r < [a, b]$ , 这与  $[a, b]$  是  $a, b$  的最小公倍数矛盾. 所以  $[a, b] \mid c$ .  $\square$

**性质 1.1.15.** 设  $a, b$  都是正整数, 则  $[a, b] = \frac{ab}{(a, b)}$ .

**证明.** 记  $c = \frac{ab}{(a, b)}$ , 则由  $(a, b) \mid a$  及  $(a, b) \mid b$  知  $b \mid c, a \mid c$ . 即  $c$  为  $a, b$  的公倍数, 故  $[a, b] \mid c$ .

反过来, 由贝祖定理, 知存在整数  $x, y$ , 使得

$$ax + by = (a, b),$$

即

$$\frac{a}{(a, b)}x + \frac{b}{(a, b)}y = 1,$$

于是

$$\frac{a[a, b]}{(a, b)}x + \frac{b[a, b]}{(a, b)}y = [a, b],$$

由  $b \mid [a, b]$  及  $a \mid [a, b]$ , 可知

$$c \left| \frac{a[a, b]}{(a, b)}, c \left| \frac{b[a, b]}{(a, b)}, \right.$$

所以

$$c \mid [a, b],$$

综上, 可知

$$[a, b] = \frac{ab}{(a, b)}.$$

□

一般地, 对  $n$  个整数 (非零)  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , 可以类似地引入最大公因数与最小公倍数的概念, 分别记为  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  和  $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ . 容易得到下面的一些结论:

**性质 1.1.16.**  $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = ((a_1, a_2), a_3, \dots, a_n)$ ;

而  $[a_1, a_2, a_3, \dots, a_n] = [[a_1, a_2], a_3, \dots, a_n]$ .

**性质 1.1.17.** 存在整数  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 使得

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

特别地,  $(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$ , 即  $a_1, a_2, \dots, a_n$  互素的充要条件是: 存在整数  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 使得

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 1$$

注意,  $n$  个数互素, 并不能保证它们两两互素, 例如  $(2 \times 3, 2 \times 5, 3 \times 5) = 1$ , 但 6, 10, 15 两两不互素. 反过来, 若  $n$  个数中有两个数互素, 则这  $n$  个数互素. 因此, 在  $n$  个数中, “两两互素” 的条件比 “它们互素” 的条件要强得多.

**性质 1.1.18.** 设  $m$  为正整数, 则

$$(ma_1, ma_2, \dots, ma_n) = m(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad (1.13)$$

$$[ma_1, ma_2, \dots, ma_n] = m[a_1, a_2, \dots, a_n]. \quad (1.14)$$

**例 1.1.11.** 设  $a, b$  为正整数, 且  $\frac{ab}{a+b}$  也是正整数. 证明:  $(a, b) > 1$ .

**证明.** 若  $(a, b) = 1$ , 则  $(a, a+b) = 1$  (这由性质 1.1.13 可推得), 从而, 由  $a+b \mid ab$  及  $(a, a+b) = 1$ , 得  $a+b \mid b$ , 但是  $a+b > b$ , 故  $a+b \mid b$  不可能成立. 所以,  $(a, b) > 1$ . □

**注记.** 在辗转相除求  $a, b$  的公因数的讨论中, 可知对任意整数  $x$ , 都有  $(a, b) = (a, b+ax)$ , 这一点在利用最大公因数处理数论问题时经常被用到.

**例 1.1.12.** 设正整数  $a, b, c$  满足  $b^2 = ac$ . 证明:  $(a, b)^2 = a(a, c)$ .

**证明.** 如果我们能够证明:  $(a, b)^2 = (a^2, b^2)$ , 那么结合性质 1.1.18, 可知

$$(a, b)^2 = (a^2, b^2) = (a^2, ac) = a(a, c),$$

命题获证.

为此, 记  $d = (a, b)$ , 设  $a = du, b = dv$ , 则由性质 1.1.18 可知  $u, v$  是两个互素的正整数, 为证  $(a^2, b^2) = d^2$ , 只需证明:  $(u^2, v^2) = 1$ .

利用贝祖定理, 知存在整数  $x, y$ , 使得  $ux + vy = 1$ , 故  $u^2x^2 = (1 - vy)^2 = 1 + v(vy^2 - 2y)$ , 结合性质 3 可知  $(u^2, v) = 1$ , 交换  $u^2$  与  $v$  的位置, 同上再做一次, 即有  $(v^2, u^2) = 1$ .

所以, 命题成立.  $\square$

**注记.** 利用下一节的算术基本定理可以非常方便地证出:  $(a^2, b^2) = (a, b)^2$ , 但遗憾的是我们还没给出该定理的证明, 通常都是先建立最大公因数理论再去证算术基本定理, 这里不用该定理是不希望掉入“循环论证”的漩涡, 读者在学习时应认真掌握其中的逻辑结构.

**例 1.1.13.** 求所有的正整数  $a, b (a \leq b)$ , 使得

$$ab = 300 + 7[a, b] + 5(a, b). \quad (1.15)$$

**解.** 设  $[a, b] = x, (a, b) = y$ , 由性质 1.1.15 可知  $ab = xy$ , 于是, 式 1.15 变为

$$xy = 300 + 7x + 5y,$$

即  $(x - 5)(y - 7) = 5 \times 67$ .

由于  $[a, b] \geq (a, b)$ , 故  $x \geq y$ , 进而  $x - 5 > y - 7$ , 只有如下的两种情形.

**情形一**  $x - 5 = 67$  且  $y - 7 = 5$ ; 此时,  $x = 72, y = 12$ , 于是, 可设  $a = 12n, b = 12m, (m, n) = 1$ , 并有  $(12n)(12m) = ab = xy = 12 \times 72$ , 结合  $a \leq b$ , 只能是  $(m, n) = (1, 6)$  或  $(2, 3)$ , 对应的  $(a, b) = (12, 72)$  或  $(24, 36)$ .

**情形二**  $x - 5 = 335$  且  $y - 7 = 1$ ; 对应地,  $x = 340, y = 8$ , 但  $y = (a, b)$  是  $x = [a, b]$  的因数, 而  $8 \nmid 340$ , 所以, 此时无解.

综上, 符合条件的  $(a, b) = (12, 72)$  或  $(24, 36)$ .

**例 1.1.14.** 求所有的正整数  $a, b$ , 使得

$$(a, b) + 9[a, b] + 9(a + b) = 7ab. \quad (1.16)$$



解. 记  $(a, b) = d$ , 设  $a = dx, b = dy$ , 则  $(x, y) = 1$  (由性质 1.1.18 知),  $[a, b] = dxy$  (由性质 1.1.15 知), 于是代入式 1.16 可得

$$1 + 9xy + 9(x + y) = 7dxy, \quad (1.17)$$

$$7d = 9 + 9\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) + \frac{1}{xy},$$

所以

$$9 < 7d \leq 9 + 9\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{1}\right) + \frac{1}{1 \times 1} = 28,$$

故

$$2 \leq d \leq 4,$$

当  $d = 2$  时, 由式 1.17 得

$$5xy - 9(x + y) = 1,$$

两边乘以 5, 并将左边因式分解, 得

$$(5x - 9)(5y - 9) = 86 = 2 \times 43,$$

故  $(5x - 9, 5y - 9) = (1, 86), (86, 1), (2, 43), (43, 2)$ . 分别求解可知只能是  $(x, y) = (2, 19), (19, 2)$ , 对应的  $(a, b) = (4, 38), (38, 4)$ .

分别就  $d = 3, 4$  同上讨论, 得  $(a, b) = (4, 4)$ .

所以, 满足条件的  $(a, b) = (4, 38), (38, 4), (4, 4)$ .

**例 1.1.15.** Fibonacci 数列定义如下:  $F_1 = F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, n = 1, 2, \dots$ . 证明: 对任意正整数  $m, n$ , 都有  $(F_m, F_n) = F_{(m,n)}$ .

**证明.** 当  $m = n$  时, 命题显然成立. 现在不妨设  $m < n$ , 注意到

$$\begin{aligned} F_n &= F_2 F_{n-1} + F_1 F_{n-2} \\ &= F_2 (F_{n-2} + F_{n-3}) + F_1 F_{n-2} \\ &= (F_2 + F_1) F_{n-2} + F_2 F_{n-3} \\ &= F_3 F_{n-2} + F_2 F_{n-3} \\ &= F_3 (F_{n-3} + F_{n-4}) + F_2 F_{n-3} \\ &= F_4 F_{n-3} + F_3 F_{n-4} \\ &= \dots \\ &= F_m F_{n-m+1} + F_{m-1} F_{n-m}, \end{aligned}$$

因此, 设  $d \mid F_m$  且  $d \mid F_n$ , 则由上式可知  $d \mid F_{m-1}F_{n-m}$ . 又对任意正整数  $m$ , 有  $(F_m, F_{m-1}) = (F_{m-1} + F_{m-2}, F_{m-1}) = (F_{m-1}, F_{m-2}) = \cdots = (F_2, F_1) = 1$ , 所以,  $(d, F_{m-1}) = 1$ , 故  $d \mid F_{n-m}$ ; 反过来, 若  $d' \mid F_{n-m}$  且  $d' \mid F_m$ , 则由上式又可知  $d' \mid F_n$ . 依此可知  $(F_n, F_m) = (F_{n-m}, F_m)$ .

利用上述结论, 对下标进行辗转相除, 就可证得  $(F_n, F_m) = F_{(m,n)}$ . 说明由本题的结论还可以推出一个有趣的性质: 若  $F_n$  为素数, 则  $n = 4$  或者  $n$  为素数.

事实上, 设  $F_n$  为素数, 而  $n$  为合数, 可设  $n = p \cdot q, 2 \leq p \leq q, p, q$  为正整数, 则由前面的结论, 可知  $(F_n, F_p) = F_{(n,p)} = F_p, (F_n, F_q) = F_{(n,q)} = F_q$ . 结合 Fibonacci 数列的定义, 可知  $F_n > F_p, F_n > F_q$ , 而  $F_n$  为素数, 故  $(F_n, F_p) = (F_n, F_q) = 1$ , 所以,  $F_p = F_q = 1$ , 再由  $2 \leq p \leq q$ , 可知只能是  $p = q = 2$ , 即  $n = 4$ . 所以, 性质成立.  $\square$

**例 1.1.16.** 设  $n$  为大于 1 的正整数. 证明: 存在从小到大排列后成等差数列 (即从第二项起, 每一项与它前面那项的差为常数的数列) 的  $n$  个正整数, 它们中任意两项互素.

**证明.** 考虑下面的  $n$  个数:

$$n! + 1, 2 \times (n!) + 1, \cdots, n \times (n!) + 1$$

这  $n$  个正整数组成一个公差为  $n!$  的等差数列.

我们证明其中任意两项是互素的.

事实上, 若存在  $1 \leq i < j \leq n$ , 使得数  $i \times (n!) + 1$  与数  $j \times (n!) + 1$  不互素, 设  $d = (i \times (n!) + 1, j \times (n!) + 1) > 1$ . 考虑  $d$  的素因子  $p$ , 可知

$$p \mid (j \times (n!) + 1) - (i \times (n!) + 1)$$

即  $p \mid (j - i) \times n!$ . 由性质 6 知  $p \mid j - i$  或  $p \mid n!$ , 结合  $1 \leq j - i < n$ , 可知  $(j - i) \mid n!$ , 所以, 总有  $p \mid n!$ . 但是,  $p \mid d, d \mid i \times (n!) + 1$ , 故  $p \mid i \times (n!) + 1$ , 结合  $p \mid n!$ , 导致  $p \mid 1$ , 矛盾.

所以, 命题成立.  $\square$

**注记.** 此题为导出与反设矛盾的结论, 采用了素因子分析的方法. 该方法在数论中有广泛的应用.

#### 1.1.4 算术基本定理

在前面我们引入了素数与合数的概念, 对每个大于 1 的正整数  $n$ , 如果  $n$  为合数, 那么可写  $n = n_1 n_2$ , 其中  $2 \leq n_1 \leq n_2$ . 再分别对  $n_1, n_2$

重复这样的讨论, 即可将  $n$  表示为一些素数的乘积. 对这个过程认真思考, 就能得到下面的重要定理, 在解数论的问题时经常会直接或间接地用到它.

**定理 1.1.2** (算术基本定理). 设  $n$  是大于 1 的正整数, 则  $n$  可以分解成若干个素数的乘积的形式, 并且在不考虑这些素数相乘时的前后次序时, 这种分解是唯一的. 即对任意大于 1 的正整数  $n$ , 都存在唯一的一种素因数分解形式:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

这里  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$  为素数,  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$  为正整数.

**证明.** 利用前面的分析, 可证得存在性, 下面证明唯一性.

若  $n$  有两种素因数分解形式:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \cdots q_l^{\beta_l}$$

其中  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k, q_1 < q_2 < \cdots < q_l$ , 且都是素数,  $\alpha_i, \beta_j$  都为正整数,  $1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq l$ .

我们证明  $k = l$  且  $p_i = q_i, \alpha_i = \beta_i$ .

事实上, 由 (1) 知  $p_i \mid q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \cdots q_l^{\beta_l}$ , 利用性质 1.1.13 可知, 存在某个  $j$  使  $p_i \mid q_j^{\beta_j}$ , 再用一次性质 1.1.13, 知  $p_i \mid q_j$ , 这要求  $p_i = q_j$ . 即对  $1 \leq i \leq k$  及每个  $p_i$ , 在  $q_1, q_2, \cdots, q_l$  中总有一个  $q_j$ , 使得  $p_i = q_j$ . 反过来对  $q_j$  分析, 又有对  $1 \leq j \leq l$  及每个  $q_j$ , 在  $p_1, p_2, \cdots, p_k$  中总有一个  $p_i$ , 使得  $q_j = p_i$ . 这表明  $k = l$ , 且  $q_1, q_2, \cdots, q_l$  是  $p_1, p_2, \cdots, p_k$  的一个排列, 结合  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$  及  $q_1 < q_2 < \cdots < q_l$ , 知  $p_i = q_i, 1 \leq i \leq k$ . 进一步证明  $\alpha_i = \beta_i$  是容易的.  $\square$

利用正整数  $n$  的素因数分解式, 我们可以简单地得到下面的一些结论.

**推论 1.1.1.** 设  $n$  的所有正因数 (包括 1 和  $n$ ) 的个数为  $d(n)$ , 那么

$$d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

由此公式易知:  $n$  是一个完全平方数的充要条件是  $d(n)$  为奇数.

**推论 1.1.2.** 设  $n$  的所有正因数之和为  $\sigma(n)$ , 那么

$$\sigma(n) = (1 + p_1 + \cdots + p_1^{\alpha_1})(1 + p_2 + \cdots + p_2^{\alpha_2}) \cdots (1 + p_k + \cdots + p_k^{\alpha_k})$$

由此可知:  $\sigma(n)$  为奇数的充要条件是  $n$  为完全平方数或者某个完全平方数的两倍.

**推论 1.1.3.** 设  $n, m$  的素因数分解分别为

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, m = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k},$$

这里  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ , 都为素数,  $\alpha_i, \beta_i$  都是非负整数, 并且对每个  $1 \leq i \leq k$ ,  $\alpha_i$  与  $\beta_i$  不全为零, 那么, 我们有  $(m, n) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \cdots p_k^{\gamma_k}$ ;  $[m, n] = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \cdots p_k^{\delta_k}$ , 其中  $\gamma_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\}$ ,  $\delta_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\}$ ,  $1 \leq i \leq k$ .

**例 1.1.17.** 在一个走廊上依次排列着编号为  $1, 2, \cdots, 2012$  的灯共 2012 盏, 最初每盏灯的状态都是开着的. 一个好动的学生做了下面的 2012 次操作: 对  $1 \leq k \leq 2012$ , 该学生第  $k$  次操作时, 将所有编号是  $k$  的倍数的灯的开关都拉了一下. 问: 最后还有多少盏灯是开着的?(提示:  $44^2 = 1936, 45^2 = 2025$ )

**解.** 设  $1 \leq n \leq 2012$ , 我们来考察第  $n$  盏灯的状态, 依题意, 该盏灯的开关被拉了  $d(n)$  次. 而偶数次拉动开关不改变灯的初始状态, 奇数次拉动开关, 灯的状态与初始状态不同.

利用  $d(n)$  的性质及前面的讨论, 因为  $1, 2, \cdots, 2012$  中恰有 44 个数为完全平方数, 可知最后还有  $2012 - 44 = 1968$  盏灯是开着的.

**例 1.1.18.** 求所有的正整数  $n$ , 使得  $n = d(n)^2$ .

**解.** 当  $n = 1$  时, 符合条件, 下面考虑  $n > 1$  的情形.

由条件知  $n$  为完全平方数, 因此  $d(n)$  为奇数, 设  $d(n) = 2k + 1$ . 鉴于对任意正整数  $d$ , 当  $d \mid n$  时, 有  $\frac{n}{d} \mid n$ , 因此, 我们将  $d$  与  $\frac{n}{d}$  配对后, 可知  $d(n)$  等于数  $1, 2, \cdots, 2k - 1$  中为  $n$  的因数的个数的两倍加上 1. 又  $1, 2, \cdots, 2k - 1$  中的偶数都不是  $n (= (2k + 1)^2)$  的因数, 因此结合  $d(n) = 2k + 1$ , 可知  $1, 2, \cdots, 2k - 1$  中的每一个奇数都是  $n$  的因数.

注意到, 当  $k > 1$  时,  $(2k - 1, 2k + 1) = (2k - 1, 2) = 1$ , 故  $2k - 1 \nmid (2k + 1)^2$ . 所以  $k > 1$  时,  $n = (2k + 1)^2$  不符合要求, 故  $k = 1, n$  只能等于 9.

直接验证, 可知 1 和 9 满足条件, 所以  $n = 1$  或 9.

**注记.** 此题考虑了  $n$  的因数关于  $\sqrt{n}$  的对称性, 分析出一个非常强的条件, 从而解决了问题.

它还有一个一般性的处理方法, 需要用到如下的估计: 设  $p$  为不小于 5 的素数, 则  $p^\alpha > (\alpha + 1)^2$ . 而  $\alpha \geq 2$  时,  $3^\alpha \geq (\alpha + 1)^2$ . 这两个不等式都可以用数学归纳法予以证明 (对  $\alpha$  归纳).

现在设  $n(> 1)$  是一个满足条件的正整数, 则  $n$  为一个奇数的平方, 于是, 可设  $n = 3^\alpha \cdot p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}$ , 其中  $3 < p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ , 并且  $\alpha, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$  都是偶数. 如果  $k > 0$ , 那么由前面的分析, 知  $n > (\alpha + 1)^2 (\beta_1 + 1)^2 \cdots (\beta_k + 1)^2 = d(n)^2$ , 矛盾, 故  $n = 3^\alpha$ . 进一步分析, 可知  $\alpha > 2$  时, 有  $3^\alpha > (\alpha + 1)^2$ , 故  $\alpha = 2$ , 即  $n = 9$ .

**例 1.1.19.** 设  $n$  为正整数. 证明: 数  $2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + 1$  至少有  $n$  个不同的素因子.

**证明.** 我们作如下的分解:

$$\begin{aligned}
 & 2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + 1 \\
 &= \left(2^{2^{n-1}} + 1\right)^2 - 2^{2^{n-1}} \\
 &= \left(2^{2^{n-1}} + 2^{2^{n-2}} + 1\right) \left(2^{2^{n-1}} - 2^{2^{n-2}} + 1\right) \\
 &= \left(2^{2^{n-2}} + 2^{2^{n-3}} + 1\right) \left(2^{2^{n-2}} - 2^{2^{n-3}} + 1\right) \left(2^{2^{n-1}} - 2^{2^{n-2}} + 1\right) \\
 &= \cdots \\
 &= \left(2^{2^1} + 2^{2^0} + 1\right) \left(2^{2^1} - 2^{2^0} + 1\right) \left(2^{2^2} - 2^{2^1} + 1\right) \cdots \left(2^{2^{n-1}} - 2^{2^{n-2}} + 1\right)
 \end{aligned}$$

这样, 我们将  $2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + 1$  表示为  $n$  个大于 1 的正整数之积, 为证明它有  $n$  个不同的素因子, 只需证明这  $n$  个大于 1 的正整数两两互素.

注意到, 当  $m > l$  时,  $2^{2^m} + 2^{2^{m-1}} + 1$  与  $2^{2^l} - 2^{2^{l-1}} + 1$  都是  $2^{2^m} + 2^{2^{m-1}} + 1$  的因数, 因此

$$\left(2^{2^m} - 2^{2^{m-1}} + 1, 2^{2^l} \pm 2^{2^{l-1}} + 1\right) \quad (1.18)$$

$$\leq \left(2^{2^m} - 2^{2^{m-1}} + 1, 2^{2^m} + 2^{2^{m-1}} + 1\right) \quad (1.19)$$

$$= \left(2^{2^m} - 2^{2^{m-1}} + 1, 2 \times 2^{2^{m-1}}\right) \quad (1.20)$$

由于,  $2 \times 2^{2^{m-1}}$  中只有一个素因子 2, 而  $2^{2^m} - 2^{2^{m-1}} + 1$  为奇数, 故

$$\left(2^{2^m} - 2^{2^{m-1}} + 1, 2 \times 2^{2^{m-1}}\right) = 1,$$

因此

$$\left(2^{2^m} - 2^{2^{m-1}} + 1, 2^{2^l} \pm 2^{2^{l-1}} + 1\right) = 1.$$

所以,  $2^{2^1} + 2^{2^0} + 1, 2^{2^1} - 2^{2^0} + 1, 2^{2^2} - 2^{2^1} + 1, \dots, 2^{2^{n-1}} - 2^{2^{n-2}} + 1$  两两互素, 进而  $2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + 1$  至少有  $n$  个不同的素因子.  $\square$

**例 1.1.20.** 设  $m, n$  是正整数, 且  $m$  的所有正因数之积等于  $n$  的所有正因数之积. 问:  $m$  与  $n$  是否必须相等?

**解.**  $m$  与  $n$  必须相等.

事实上, 将  $m$  的正因数  $d$  与  $\frac{m}{d}$  配对, 可知  $m$  的所有正因数之积为  $m^{\frac{d(m)}{2}}$ , 因此, 条件等价于

$$m^{d(n)} = n^{d(n)}, \quad (1.21)$$

此式表明  $m, n$  有相同的素因子, 可设

$$m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, n = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k},$$

其中  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$  为素数  $\alpha_i$  与  $\beta_i$  都是正整数,  $1 \leq i \leq k$ .

代入 1.21 式, 利用算术基本定理, 可知

$$\alpha_i d(m) = \beta_i d(n), 1 \leq i \leq k, \quad (1.22)$$

若  $d(m) > d(n)$ , 则对  $1 \leq i \leq k$ , 都有  $\alpha_i < \beta_i$ , 于是,  $\alpha_i + 1 < \beta_i + 1$ , 故  $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1) < (\beta_1 + 1)(\beta_2 + 1) \cdots (\beta_k + 1)$ , 这导致  $d(m) < d(n)$ , 矛盾. 同样, 由  $d(m) < d(n)$ , 利用 1.22 式也可导出矛盾. 所以  $d(m) = d(n)$ , 进而由 1.21 式得  $m = n$ .

**注记.** 一般地, 由  $\sigma(m) = \sigma(n)$  (即考虑  $m, n$  所有正因数之和) 并不能导出  $m = n$  (例如  $\sigma(6) = \sigma(11) = 12$ ), 此题是对两个正整数的所有正因数作乘积方面的思考得出的结论.

**例 1.1.21.** 求所有的正整数  $x, y$ , 使得

$$y^x = x^{50}$$

**解.** 设  $x, y$  为满足条件的正整数, 并且  $x = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$  为  $x$  的素因数分解式, 则

由  $y$  为正整数, 知对  $1 \leq i \leq k$ , 都有  $x \mid 50\alpha_i$ . 现在先讨论  $x$  的素因子.

如果  $x$  有一个不同于 2 和 5 的素因子  $p$ , 并设  $p^\alpha \parallel x$ , 那么由前面的结果知  $x \mid 50\alpha$ , 当然有  $p^\alpha \mid 50\alpha$ , 又  $p \neq 2, 5$ , 故  $p^\alpha \mid \alpha$ . 但是, 对任意素数  $p$  及正整数  $\alpha$ , 有  $p^\alpha > \alpha$ , 所以,  $p^\alpha \mid \alpha$  不能成立, 这表明  $x$  的素因子只能为 2 或 5.

于是, 我们可设  $x = 2^\alpha \cdot 5^\beta$  (其中  $\alpha, \beta$  为非负整数), 这时  $x|50\alpha, x|50\beta$ , 故  $2^\alpha | 50\alpha, 5^\beta | 50\beta$ , 前者要求  $2^{\alpha-1} | \alpha$ , 后者要求  $5^{\beta-2} | \beta$ . 注意到, 当  $\alpha \geq 3$  时,  $2^{\alpha-1} > \alpha$ , 而  $\beta \geq 3$  时,  $5^{\beta-2} > \beta$ , 所以,  $0 \leq \alpha \leq 2, 0 \leq \beta \leq 2$ . 这表明  $x$  只能取  $1, 2, 2^2, 5, 5^2, 2 \times 5, 2^2 \times 5, 2 \times 5^2, 2^2 \times 5^2$ .

将  $x$  的上述取值逐个代入 (1) 式, 可得到全部解为  $(x, y) = (1, 1), (2, 2^{25}), (2^2, 2^{25}), (5, 5^{10}), (5^2, 5^4), (10, 10^5), (50, 50), (100, 10)$ , 共 8 组解.

**注记.** 上面两例直接用到算术基本定理, 所涉及的变量数看似增加或会变难, 但这时不等式估计的手段可介入, 问题求解反而有了着力点.

**例 1.1.22.** 给定正整数  $n > 1$ , 设  $d_1, d_2, \dots, d_n$  都是正整数, 满足:  $(d_1, d_2, \dots, d_n) = 1$ , 且对  $j = 1, 2, \dots, n$  都有  $d_j | \sum_{i=1}^n d_i$  (这里  $\sum_{i=1}^n d_i = d_1 + d_2 + \dots + d_n$ ).

(1) 证明:  $d_1 d_2 \cdots d_n | (\sum_{i=1}^n d_i)^{n-2}$ ;

(2) 举例说明:  $n > 2$  时, 上式右边的幂次不能减小.

**证明.** (1) 设  $p$  为  $d_1 d_2 \cdots d_n$  的素因数, 且  $k$  为各  $d_i$  的素因数分解式中  $p$  的幂次的最大值, 则由  $d_j | \sum_{i=1}^n d_i$  可知,  $p^k | \sum_{i=1}^n d_i$ , 故  $p^{k(n-2)} | (\sum_{i=1}^n d_i)^{n-2}$ .

而  $(d_1, d_2, \dots, d_n) = 1$ , 故存在  $d_i$ , 使得  $p \nmid d_i$ , 结合  $p | \sum_{i=1}^n d_i$ , 可知  $d_1, d_2, \dots, d_n$  中至少有两个数不是  $p$  的倍数. 所以,  $p$  在  $d_1 d_2 \cdots d_n$  中的幂次不超过  $k(n-2)$ , 依此可知结论成立.

(2) 设  $d_1 = 1, d_2 = n-1, d_i = n, 3 \leq i \leq n$ , 则  $\sum_{i=1}^n d_i = n(n-1)$  是每个  $d_i$  的倍数, 且  $(d_1, d_2, \dots, d_n) = 1$ .

此时,  $d_1 d_2 \cdots d_n = n^{n-2}(n-1)$ , 结合  $(n, n-1) = 1$ , 可知满足  $n^{n-2}(n-1) | (n(n-1))^m$  的最小正整数  $m = n-2$ .  $\square$

## 习题 1

1. 设  $n$  为大于 1 的正整数. 证明:  $n^4 + 4^n$  是一个合数.
2. 求使得  $|4x^2 - 12x - 27|$  为素数的所有整数  $x$ .
3. 设  $m$  为大于 1 的正整数, 且  $m \mid (m-1)! + 1$ . 证明:  $m$  是一个素数.
4. 是否存在 3 个不同的素数  $p, q, r$ , 使得下面的整除关系都成立?

$$qr \mid p^2 + d, rp \mid q^2 + d, pq \mid r^2 + d$$

其中 (1)  $d = 10$ ; (2)  $d = 11$ .

5. 设  $p$  为正整数, 且  $2^p - 1$  是素数. 求证:  $p$  为素数.
6. 设  $n$  为正整数, 且  $2^n + 1$  是素数. 证明: 存在非负整数  $k$ , 使得  $n = 2^k$ .
7. 求所有形如  $n^n + 1$  且不超过  $10^{19}$  的素数, 这里  $n$  为正整数.
8. 设  $a, b, c, d$  都是整数, 且  $a \neq c, a - c \mid ab + cd$ . 证明:  $a - c \mid ad + bc$ .
9. 设  $a, b, c, d$  为整数, 且  $ac, bc + ad, bd$  都是某个整数  $u$  的倍数. 证明: 数  $bc$  和  $ad$  也是  $u$  的倍数.
10. 设  $a, b, n$  为给定的正整数, 且对任意正整数  $k (\neq b)$ , 都有  $b - k \mid a - k^n$ . 证明:  $a = b^n$ .
11. 已知正整数  $n$  的正因数中, 末尾数字为  $0, 1, 2, \dots, 9$  的正整数都至少有一个. 求满足条件的最小的  $n$ .
12. 求一个 9 位数  $M$ , 使得  $M$  的数码两两不同且都不为零, 并对  $m = 2, 3, \dots, 9$ , 数  $M$  的左边  $m$  位数都是  $m$  的倍数.
13. 对于一个正整数  $n$ , 若存在正整数  $a, b$ , 使得  $n = ab + a + b$ , 则称  $n$  是一个”好数”, 例如  $3 = 1 \times 1 + 1 + 1$ , 故 3 为一个”好数”. 问: 在  $1, 2, \dots, 100$  中, 有多少个”好数”?
14. 设素数从小到大依次为  $p_1, p_2, p_3, \dots$ . 证明: 当  $n \geq 2$  时, 数  $p_n + p_{n+1}$  可以表示为 3 个大于 1 的正整数 (可以相同) 的乘积的形式.



15. 设  $n$  为大于 1 的正整数. 证明:  $n$  为合数的充要条件是存在正整数  $a, b, x, y$ , 使得  $n = a + b, \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ .
16. 证明: 数列 10001, 100010001, 1000100010001,  $\dots$  中, 每一个数都是合数.
17. 设  $a, b, c, d$  都是素数, 且  $a > 3b > 6c > 12d, a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 1749$ . 求  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$  的所有可能值.
18. 数列  $\{a_n\}$  的每一项都是正整数,  $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots$ , 且对任意正整数  $k$ , 该数列中恰有  $k$  项等于  $k$ . 求所有的正整数  $n$ , 使得  $a_1 + a_2 + \dots + a_n$  是素数.
19. 由正整数组成的数列  $\{a_n\}$  满足: 对任意正整数  $m, n$ , 若  $m \mid n, m < n$ , 则  $a_m \mid a_n$ , 且  $a_m < a_n$ . 求  $a_{2000}$  的最小可能值.
20. 设  $p$  为奇素数, 正整数  $m, n$  满足  $\frac{m}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{p-1}$ . 证明:  $p \mid m$ .
21. 设  $a, m, n$  为正整数,  $a > 1$ , 且  $a^m + 1 \mid a^n + 1$ . 证明:  $m \mid n$ .
22. 证明: 对任意正整数  $n$  及正奇数  $m$ , 都有  $(2^m - 1, 2^n + 1) = 1$ .
23. 费马数  $F_n$  定义为  $F_n = 2^{2^n} + 1$ . 证明: 对任意两个不同的正整数  $m, n$ , 都有  $(F_n, F_m) = 1$ .
24. 已知正整数  $a, b, c, d$  的最小公倍数为  $a + b + c + d$ . 证明:  $abcd$  是 3 或 5 的倍数.
25. 记  $M_n$  为正整数  $1, 2, \dots, n$  的最小公倍数. 求所有的正整数  $n (> 1)$ , 使得  $M_n = M_{n-1}$ .
26. 设  $a, m, n$  为正整数,  $a > 1$ . 证明:  $(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m,n)} - 1$ .
27. 设  $a, n$  为正整数,  $a > 1$ , 且  $a^n + 1$  是素数. 证明:  $d(a^n - 1) \geq n$ .
28. 对怎样的正整数  $n (> 2)$ , 存在  $n$  个连续正整数, 使得其中最大的数是其余  $n - 1$  个数的最小公倍数的因数?
29. 设正整数  $a, b, m, n$  满足:  $(a, b) = 1, a > 1$ , 且  $a^m + b^m \mid a^n + b^n$ . 证明:  $m \mid n$ .
30. 证明: 存在 2012 个不同的正整数, 使得其中任意两个不同的数  $a, b$  都满足  $(a - b)^2 \mid ab$ .

31. 设  $a, b$  为正整数, 且  $(a, b) = 1$ . 证明: 对任意正整数  $m$ , 数列

$$a, a+b, a+2b, \dots, a+nb, \dots$$

中, 有无穷多个数与  $m$  互素.

32. 已知正整数数对  $(a, b)$  满足: 数  $a^a \cdot b^b$  在十进制表示下, 末尾恰有 98 个零. 求  $ab$  的最小值.

33. 求所有的正整数  $m$ , 使得  $m = d(m)^4$ .

34. 证明: 每一个正整数都可以表示为两个正整数之差, 且这两个正整数的素因子个数相同.

35. 求所有的正整数  $a, b, c$ , 使得  $a^2 + 1$  和  $b^2 + 1$  都是素数, 且满足

$$(a^2 + 1)(b^2 + 1) = c^2 + 1$$

36. 用  $p(k)$  表示正整数  $k$  的最大奇因数. 证明: 对任意正整数  $n$ , 都有  $\frac{2}{3}n < \sum_{k=1}^n \frac{p(k)}{k} < \frac{2}{3}(n+1)$

37. 设  $a, b, c$  都是大于 1 的正整数. 求代数式  $\frac{a+b+c}{2} - \frac{[a,b]+[b,c]+[c,a]}{a+b+c}$  的最小可能值.

38. 对任意给定的素数  $p$ , 有多少个整数组  $(a, b, c)$ , 使得 (1)  $1 \leq a, b, c \leq 2p^2$ ; (2)  $\frac{[a,c]+[b,c]}{a+b} = \frac{p^2+1}{p^2+2} \cdot c$ .

39. 黑板上写着数  $1, 2, \dots, 33$ . 每次允许进行下面的操作: 从黑板上任取两个满足  $x \mid y$  的数  $x, y$ , 将它们从黑板上去掉, 写上数  $\frac{y}{x}$ . 直至黑板上不存在这样的两个数. 问: 黑板上至少剩下多少个数?

40. 设  $n$  是一个正整数. 证明: 数  $1 + 5^n + 5^{2n} + 5^{3n} + 5^{4n}$  是一个合数.

## 习题 1 解答

1. 当  $n$  为偶数时,  $n^4 + 4^n$  是大于 2 的偶数, 从而它是合数. 当  $n$  为奇数时, 设  $n = 2k + 1$ , 则

$$n^4 + 4^n = n^4 + 4 \times (2^k)^4$$

利用

$$x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2)^2 - 4x^2y^2 \quad (1.23)$$

$$= (x^2 - 2xy + 2y^2)(x^2 + 2xy + 2y^2) \quad (1.24)$$

可得出  $n^4 + 4 \times (2^k)^4$  为合数.

2. 由  $|4x^2 - 12x - 27| = |(2x + 3)(2x - 9)|$ , 可知只有  $|2x + 3| = 1$  或  $|2x - 9| = 1$  时, 数  $|4x^2 - 12x - 27|$  才可能为素数. 依此可得所求的  $x = -2, -1, 4$  或  $5$ , 对应的  $|4x^2 - 12x - 27|$  分别为 13, 11, 11 或 13, 都是素数.

3. 若  $m$  为合数, 则存在正整数  $p$ , 使  $2 \leq p < m$ , 且  $p \mid m$ , 此时有  $p \mid (m-1)!$ , 但  $m \mid (m-1)! + 1$ , 故  $p \mid (m-1)! + 1$ , 这导致  $p \mid 1$ , 矛盾.

4. 不妨设  $p < q < r$ , 则

$$q \geq p + 1, r \geq q + 2 \geq p + 3$$

对  $d = 10$  的情形, 由  $qr \mid p^2 + 10$ , 应有

$$p^2 + 10 \geq (p + 1)(p + 3)$$

这要求  $4p \leq 7$ , 即  $p \leq 1$ , 矛盾. 故  $d = 10$  时不存在符合要求的  $p, q, r$ .

当  $d = 11$  时,  $p = 2, q = 3, r = 5$  满足条件.

5. 若  $p$  为合数, 设  $p = qr, 2 \leq q \leq r$ , 则

$$2^p - 1 = (2^q)^r - 1 = (2^q - 1) \left( (2^q)^{r-1} + (2^q)^{r-2} + \cdots + 1 \right),$$

这导致  $2^q - 1 \mid 2^p - 1$ , 与  $2^p - 1$  是素数矛盾. 故  $p$  为素数.

6. 由算术基本定理知, 可写  $n = 2^k \cdot q, k \geq 0, q$  为奇数. 若  $q > 1$ , 则

$$2^n + 1 = \left( 2^{2^k} \right)^q + 1 \quad (1.25)$$

$$= (x + 1)(x^{q-1} - x^{q-2} + \cdots - x + 1) \quad (1.26)$$

是两个大于 1 的正整数之积, 不是素数, 其中  $x = 2^{2^k}$ . 依此可知, 由  $2^n + 1$  为素数可得  $q = 1$ , 即命题成立.

7. 当  $n = 1$  时,  $n^n + 1 = 2$  满足条件. 当  $n > 1$  时, 设  $n = 2^k q$ ,  $q$  为奇数, 若  $q > 1$ , 同上题可知  $n^n + 1$  不是素数, 故  $n = 2^k$ ,  $k$  为正整数. 此时

$$n^n + 1 = 2^{k \cdot 2^k} + 1 = \left(2^{2^k}\right)^k + 1$$

进一步的分析, 可知存在非负整数  $m$ , 使得  $k = 2^m$ , 故

$$n^n + 1 = 2^{2^{2^m+m}} + 1$$

当  $m \geq 2$  时,  $2^m + m \geq 6$ , 故  $2^{2^m+m} \geq 2^6$ , 因此

$$n^n + 1 \geq 2^{2^6} + 1 = 2^{64} + 1 \quad (1.27)$$

$$= 16 \times (1024)^6 + 1 \quad (1.28)$$

$$> 16 \times (10^3)^6 + 1 \quad (1.29)$$

$$> 10^{19} \quad (1.30)$$

故由  $n^n + 1 \leq 10^{19}$  知  $m \leq 1$ . 分别令  $m = 0, 1$ , 知  $n^n + 1 = 5, 257$ , 这两个都是素数.

综上, 所求的素数为 2, 5 和 257.

8. 利用

$$(ad + bc) - (ab + cd) \quad (1.31)$$

$$= d(a - c) - b(a - c) \quad (1.32)$$

$$= (d - b)(a - c) \quad (1.33)$$

及  $a - c \mid ab + cd$ , 可得  $a - c \mid ad + bc$ .

9. 由恒等式

$$(bc + ad)^2 + (bc - ad)^2 = 4abcd = 4(ac)(bd)$$

结合条件, 可知  $u^2 \mid (bc - ad)^2$ , 故  $u \mid bc - ad$ .

现在, 我们设  $bc + ad = ux$ ,  $bc - ad = uy$ , 则由 (1) 知,

$$x^2 + y^2 = 4 \left( \frac{ac}{u} \right) \left( \frac{bd}{u} \right)$$

故  $x^2 + y^2$  为偶数, 进而  $x + y$  与  $x - y$  都是偶数, 所以, 由

$$bc = \frac{x + y}{2} \cdot u, ad = \frac{x - y}{2} \cdot u$$

可得  $bc, ad$  都是  $u$  的倍数.

10. 注意到, 对任意正整数  $k (\neq b)$ , 都有  $b - k \mid b^n - k^n$ , 结合  $b - k \mid a - k^n$

, 可知  $b - k \mid a - b^n$ . 这表明  $a - b^n$  是每个正整数的倍数, 故  $a - b^n = 0$ , 得  $a = b^n$ .

11. 满足条件的最小的  $n = 270$ .

事实上, 由条件知  $10 \mid n$ , 从  $n$  的末尾数字为 9 的因数出发来讨论. 若  $9 \mid n$ , 则  $90 \mid n$ , 此时直接验证可知 90 和 180 都不是某个末尾为 7 的数的倍数; 若  $19 \mid n$ , 则  $190 \mid n$ , 而  $n = 190$  不是某个末尾为 7 的数的倍数. 而 270 分别是 10, 1, 2, 3, 54, 5, 6, 27, 18, 9 的倍数, 符合条件. 故  $n$  最小为 270.

12. 设  $M = \overline{a_1 a_2 \cdots a_9}$  是一个满足条件的数, 由条件可知  $a_5 = 5$ , 并且  $a_2, a_4, a_6, a_8$  是 2, 4, 6, 8 的一个排列, 进而,  $a_1, a_3, a_7, a_9$  是 1, 3, 7, 9 的排列. 依此可知

$$a_4 = 2 \text{ 或 } 6 \text{ (因为 } 4 \mid \overline{a_3 a_4} \text{)},$$

而进一步, 还有

$$8 \mid \overline{a_7 a_8}$$

因此

$$a_8 = 2, 6$$

故

$$(a_4, a_8) = (2, 6), (6, 2)$$

对这两种情况作进一步的分析, 就可找到一个满足条件的  $M = 381654729$ .

13. 设  $n$  是一个好数, 则  $n + 1 = (a + 1)(b + 1)$  为一个合数, 反过来, 若  $n + 1$  为合数, 则可写

$$n + 1 = pq, 2 \leq p \leq q$$

于是令  $a = p - 1, b = q - 1$ , 就有  $n = ab + a + b$  是一个好数. 所以, 只需求 1, 2,  $\dots$ , 100 中使  $n + 1$  为合数的  $n$  的个数, 依此可知恰有 74 个好数.

14. 当  $n \geq 2$  时,  $p_n$  与  $p_{n+1}$  都是奇数, 于是,  $q = \frac{p_n + p_{n+1}}{2}$  是正整数, 又  $p_n < q < p_{n+1}$ ,  $p_n$  与  $p_{n+1}$  是两个相邻的素数, 故  $q$  必为合数. 从而  $q$  可以写为两个大于 1 的正整数之积, 依此可知命题成立.

15. 若存在  $a, b, x, y$ , 使得

$$n = a + b, \text{ 且 } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

我们记  $d = (a, b)$ , 若  $d = 1$ , 由

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

知

$$bx + ay = ab,$$

所以

$$a|bx, b|ay$$

结合  $(a, b) = 1$ , 导出  $a|x, b|y$ , 从而

$$ab = bx + ay \geq ab + ba = 2ab$$

矛盾. 所以  $d > 1$ , 这时  $n = a + b = d \left( \frac{a}{d} + \frac{b}{d} \right)$  为合数.

反过来, 设  $n$  为合数, 设  $n = pq, 2 \leq p \leq q$ , 则令  $(a, b, x, y) = (p, p(q-1), 1, (p-1)(q-1))$ , 就有

$$n = a + b, \text{ 且 } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

16. 注意到  $10001 = 73 \times 137$  为合数, 而从第二项起, 我们有

$$a_n = \underbrace{100010001 \cdots 0001}_{n \text{ 个 } 0001} \quad (1.34)$$

$$= 10^{4n} + 10^{4(n-1)} + \cdots + 10^4 + 1 \quad (1.35)$$

$$= \frac{10^{4(n+1)} - 1}{10^4 - 1} \quad (1.36)$$

$$= \frac{(10^{2(n+1)} - 1)(10^{2(n+1)} + 1)}{10^4 - 1}, \quad (1.37)$$

由于  $n \geq 2$  时,  $10^4 - 1 < 10^{2(n+1)} - 1 < 10^{2(n+1)} + 1$ , 所以,  $a_n$  是一个合数.

17. 由  $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 1749$  为奇数, 知  $a, b, c, d$  中必有一个数为偶数, 这表明  $d = 2$ . 进而

$$a^2 - b^2 + c^2 = 1753$$

再由

$$a > 3b > 6c > 12d$$

可知  $c \geq 5, b \geq 2c + 1, a \geq 3b + 1$ , 所以

$$a^2 - b^2 + c^2 \geq (3b + 1)^2 - b^2 + c^2 \quad (1.38)$$

$$= 8b^2 + 6b + c^2 + 1 \quad (1.39)$$

$$\geq 8(2c + 1)^2 + 6(2c + 1) + c^2 + 1 \quad (1.40)$$

$$= 33c^2 + 44c + 15 \quad (1.41)$$

故

$$33c^2 + 44c + 15 \leq 1753$$

于是,  $c < 7$ , 结合  $c \geq 5$  及  $c$  为素数, 可知  $c = 5$ , 进而

$$a^2 - b^2 = 1728 = 2^6 \times 3^3$$

利用

$$b \geq 2c + 1 = 11, a \geq 3b + 1$$

可知

$$a - b \geq 2b + 1 \geq 23, a + b \geq 4b + 1 \geq 45$$

由  $(a - b)(a + b) = 2^6 \times 3^3$  及  $a, b$  都是奇素数, 可知

$$(a - b, a + b) = (32, 54)$$

因此

$$(a, b) = (43, 11)$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1749 + 2 \times (11^2 + 2^2) = 1999$$

18. 对正整数  $n$ , 设正整数  $k$  满足  $\frac{k(k+1)}{2} \leq n < \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ , 则

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad (1.42)$$

$$= 1 \times 1 + 2 \times 2 + \cdots + k \times k + (k + 1) \times \left[ n - \frac{k(k+1)}{2} \right] \quad (1.43)$$

$$= \frac{1}{6}k(k+1)(2k+1) + \frac{2n - k(k+1)}{2}(k+1) \quad (1.44)$$

$$= \frac{1}{6}(k+1)[6n - k(k+2)]. \quad (1.45)$$

由于当  $k \geq 6$  时,  $k+1 > 6$ , 有

$$6n - k(k+2) \geq 3k(k+1) - k(k+2) = 2k^2 + k > 6$$

所以, 此时  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  为合数, 即只需考虑  $k \leq 5$  的情形, 考察数列

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6$$

从第一项起求和得到的素数分别是: 3, 5, 11, 61, 67, 73, 79, 共 7 个. 所以仅当  $n = 2, 3, 5, 16, 17, 18, 19$  时,  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  为素数.

19. 由条件可知, 当  $m \mid n$ , 且  $m < n$  时, 有  $a_n \geq 2a_m$ . 所以,  $a_1 \geq 1, a_2 \geq 2, a_4 \geq 2a_2 \geq 2^2$ , 类似地,  $a_8 \geq 2^3, a_{16} \geq 2^4, a_{80} \geq 2^5, a_{400} \geq 2^6, a_{2000} \geq 2^7$ , 即  $a_{2000} \geq 128$ .

另一方面, 对任意正整数  $n$ , 设  $n$  的素因数分解式为

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

其中  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$  为素数,  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$  为正整数, 定义

$$a_n = 2^{a_1 + a_2 + \cdots + a_k},$$

则数列  $\{a_n\}$  符合题中的要求, 并且

$$a_{2000} = 2^{4+3} \leq 2^7$$

所以,  $a_{2000}$  的最小值为 128.

20. 由条件, 可知

$$\frac{2m}{n} = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{p-1}\right) + \left(\frac{1}{p-1} + \frac{1}{p-2} + \cdots + 1\right) \quad (1.46)$$

$$= \left(1 + \frac{1}{p-1}\right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{p-2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{p-1} + 1\right) \quad (1.47)$$

$$= \frac{p}{1 \times (p-1)} + \frac{p}{2 \times (p-2)} + \cdots + \frac{p}{(p-1) \times 1} \quad (1.48)$$

上式将右边通分后, 可知存在正整数  $M$ , 使得  $\frac{2m}{n} = \frac{pM}{(p-1)!}$ , 即  $pnM = 2m(p-1)!$ , 由  $p$  为奇素数, 可知  $p \nmid 2, p \nmid (p-1)!$ , 所以,  $p \mid m$ .

21. 若  $m \nmid n$ , 由  $a^m + 1 \mid a^n + 1$  及  $a > 1$ , 可知  $m < n$ . 故可设  $n = mq + r$ , 其中  $q, r$  为正整数,  $0 < r < m$ . 此时, 利用  $a^m + 1 \mid a^n + 1$ , 可知

$$a^m + 1 \mid (a^n + 1) - (a^m + 1)$$



即

$$a^m + 1 \mid (a^{m-n} + 1) a^m,$$

而

$$(a^m + 1, a^m) = (1, a^m) = 1$$

所以

$$a^m + 1 \mid a^{n-m} + 1$$

依次递推, 可得

$$a^m + 1 \mid a^{n-2m} + 1, \dots, a^m + 1 \mid a^{n-mq} + 1$$

即有

$$a^m + 1 \mid a^r + 1$$

但  $a > 1$  时,  $a^m + 1 > a^r + 1$ , 矛盾.

所以,  $m \mid n$ .

22. 设  $d = (2^m - 1, 2^n + 1)$ , 则

$$d \mid 2^m - 1$$

$$d \mid (2^m)^n - 1^n$$

$$d \mid 2^m - 1$$

另外  $d \mid 2^n + 1$ , 又  $m$  为奇数, 故

$$2^n + 1 \mid (2^n)^m + 1^m$$

所以

$$d \mid 2^{mn} + 1$$

对比所得的两个式子, 知  $d \mid 2$ , 又  $2^m - 1$  为奇数, 故  $d = 1$ .

23. 不妨设  $m < n$ , 利用平方差公式知

$$F_n - 2 = 2^{2^n} - 1 \tag{1.49}$$

$$= (2^{2^{n-1}} - 1)(2^{2^{n-1}} + 1) \tag{1.50}$$

$$= (2^{2^{n-2}} - 1)(2^{2^{n-2}} + 1)(2^{2^{n-1}} + 1) \tag{1.51}$$

$$= \dots \tag{1.52}$$

$$= (2^{2^m} - 1)(2^{2^m} + 1)(2^{2^{m+1}} + 1) \dots (2^{2^{n-1}} + 1) \tag{1.53}$$

所以,  $F_m \mid F_n - 2$ , 从而  $(F_n, F_m) = (2, F_m)$ , 而  $F_m$  为奇数, 故  $(2, F_m) = 1$ , 即  $(F_n, F_m) = 1$ .

24. 由条件可知  $a, b, c, d$  不全相等, 不妨设  $d$  是其中最大的数, 则

$$d < a + b + c + d < 4d$$

又  $a + b + c + d$  为  $a, b, c, d$  的最小公倍数, 故  
于是

$$\begin{aligned} d &\mid a + b + c + d, \\ a + b + c + d &= 2d \text{ 或 } 3d. \end{aligned}$$

如果  $a + b + c + d = 3d$ , 那么由  $abcd$  为  $a, b, c, d$  的公倍数, 可知

$$a + b + c + d \mid abcd$$

即

$$3d \mid abcd$$

故

$$3 \mid abcd$$

如果  $a + b + c + d = 2d$ , 那么  $a + b + c = d$ . 不妨设  $a \leq b \leq c$ , 由  $a + b + c + d$  为  $a, b, c, d$  的最小公倍数, 可知

$$a \mid 2d, b \mid 2d, c \mid 2d$$

设  $2d = ax = by = cz$ , 则  $x \geq y \geq z \geq 3$ , 并且

$$\frac{2}{x} + \frac{2}{y} + \frac{2}{z} = 1$$

即

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2}$$

又当  $z = 3$  时, 有  $3 \mid 2d$ , 进而  $3 \mid d$ , 故  $abcd$  为 3 的倍数, 因此只需考虑  $z > 3$  的情形.

而当  $z \geq 6$  时, 有

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

故只能是  $x = y = z = 6$ , 此时  $abcd$  为 3 的倍数.

所以, 只需考虑  $z = 4$  或 5 的情形, 注意到  $z = 5$  时, 有  $5 \mid 2d$ , 可知  $abcd$  是 5 的倍数, 进而只需考虑  $z = 4$  的情形, 此时

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4}$$

即

$$xy - 4x - 4y = 0$$

$$(x - 4)(y - 4) = 16$$

结合  $x > y$ , 可知

$$(x - 4, y - 4) = (16, 1), (8, 2), (4, 4)$$

分别对应

$$2d = 20a = 5b = 4c, \quad (1.54)$$

$$2d = 12a = 6b = 4c \quad (1.55)$$

$$2d = 8a = 8b = 4c \quad (1.56)$$

第一种情形要求  $5 \mid d$ , 第二种情形要求  $3 \mid d$ , 第三种情形要求

$$a = b, c = 2a, d = 4a,$$

此时  $a, b, c, d$  的最小公倍数为  $d$ , 而不是  $a + b + c + d$ , 矛盾.

综上可知,  $abcd$  是 3 或 5 的倍数.

25. 如果  $n$  至少有两个不同的素因子, 那么可记  $n = pq$ , 其中  $2 \leq p < q$ ,  $p, q$  为正整数, 且  $(p, q) = 1$ . 此时,  $2 \leq p < q < n - 1$ , 从而  $n \mid M_{n-1}$ , 因此  $M_n = M_{n-1}$ .

如果  $n = p^\alpha$ ,  $p$  为素数,  $\alpha$  为正整数, 那么  $1, 2, \dots, n - 1$  中每一个数含  $p$  的幂次小于  $\alpha$ , 此时  $M_n = pM_{n-1}$ .

所以, 当且仅当  $n$  有至少两个不同的素因子时,  $M_n = M_{n-1}$ .

26. 不妨设  $m > n$ , 则

$$(a^m - 1, a^n - 1) = (a^m - a^n, a^n - 1) \quad (1.57)$$

$$= (a^n(a^{m-n} - 1), a^n - 1), \quad (1.58)$$

而

$$(a^n, a^n - 1) = 1,$$

故

$$(a^m - 1, a^n - 1) = (a^{m-n} - 1, a^n - 1)$$

依次递推, 对指数进行“辗转相除”, 可知结论成立.

27. 由  $a^n + 1$  为素数, 可知  $a$  为偶数, 与第 6 题类似, 可知存在非负整数  $k$ , 使得  $n = 2^k$ , 于是

$$a^n - 1 \quad (1.59)$$

$$= a^{2^k} - 1 \quad (1.60)$$

$$= (a^{2^{k-1}} - 1)(a^{2^{k-1}} + 1) \quad (1.61)$$

$$= \dots \quad (1.62)$$

$$= (a - 1)(a + 1)(a^2 + 1) \cdots (a^{2^{k-1}} + 1) \quad (1.63)$$

进一步,  $(a^{2^{k-1}} - 1, a^{2^{k-1}} + 1) = (a^{2^{k-1}} - 1, 2) = 1$  (最后一步用到  $a$  为偶数), 依次倒推, 可知  $a + 1, a^2 + 1, a^{2^2} + 1, \dots, a^{2^{k-1}} + 1$  两两互素, 从而它们中任取若干个数作乘积形成的  $2^k$  个数两两不同, 当然, 这  $2^k$  个数都是  $a^n - 1$  的因数, 所以,  $d(a^n - 1) \geq 2^k = n$ .

28. 当  $n = 3$  时, 对任意三个连续正整数  $a - 1, a, a + 1$ , 若

则

而

故

$$a + 1 \mid [a - 1, a] \quad (1.64)$$

$$a + 1 \mid a(a - 1) \quad (1.65)$$

$$(a + 1, a) = 1 \quad (1.66)$$

$$a + 1 \mid a - 1 \quad (1.67)$$

矛盾.

当  $n > 3$  时, 若  $n$  为偶数, 记  $n = 2m$ , 则数  $2m - 1, 2m, \dots, 2(2m - 1)$  中, 最大的数  $2(2m - 1)$  是其余  $2m - 1$  个数 (它们中有  $2m - 1$  与  $2m$ ) 的最小公倍数的因数; 若  $n$  为奇数, 记  $n = 2m + 1$ , 则数  $2m - 2, 2m - 1, \dots, 2(2m - 1)$  是  $n$  个连续正整数 (注意, 这里用到  $m > 1$ ), 它们中最大的数是其余  $n - 1$  个数的最小公倍数的因数.

所以,  $n > 3$  时, 正整数  $n$  符合条件.

29. 利用

$$a^n + b^n = (a^{n-m} + b^{n-m})(a^m + b^m) - (a^m b^{n-m} + a^{n-m} b^m)$$

知若  $n \geq 2m$ , 则

$$a^n + b^n = (a^{n-m} + b^{n-m})(a^m + b^m) - a^m b^m (a^{n-2m} + b^{n-2m}),$$

于是

$$a^m + b^m \mid a^m b^m (a^{n-2m} + b^{n-2m})$$

由

$$(a, b) = 1$$

得

$$(a^m, b^m) = 1$$

进而

$$(a^m + b^m, a^m) = (a^m + b^m, b^m) = 1$$

故

$$(a^m + b^m, a^m b^m) = 1$$

因此

$$a^m + b^m \mid a^{n-2m} + b^{n-2m}$$

用  $n - 2m$  代替  $n$ , 重复上述讨论, 最终可将  $n$  变为小于  $2m$  的正整数. 此时, 由  $a^m + b^m \mid a^n + b^n$  及  $a > 1$ , 知  $n \geq m$ . 如果  $n = m$ , 那么命题已经成立; 如果  $m < n < 2m$ , 那么由

$$a^n + b^n = (a^{n-m} + b^{n-m})(a^m + b^m) - a^{n-m} b^{n-m} (a^{2m-n} + b^{2m-n}),$$

同上讨论, 将有

$$a^m + b^m \mid a^{2m-n} + b^{2m-n}$$

而  $2m - n < m$ , 这在  $a > 1$  时是不可能的.

综上可知  $m \mid n$  (注意: 事实上推出了  $n$  为  $m$  的奇数倍).

30. 将命题一般化, 可证: 对任意  $n(\geq 2)$ , 都存在  $n$  个不同的正整数, 使得其中任意两个不同的数  $a, b$  满足  $(a-b)^2 \mid ab$ . 证明如下:

当  $n=2$  时, 取  $a_1=1, a_2=2$ , 则它们满足条件.

现在设  $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$  是  $n(\geq 2)$  个满足要求的正整数, 即对  $1 \leq i < j \leq n$ , 都有  $(a_i - a_j)^2 \mid a_i a_j$ .

考虑下面的  $n+1$  个数

$$a_n!, a_n! + a_1, a_n! + a_2, \cdots, a_n! + a_n$$

容易证明这  $n+1$  个正整数满足要求.

31. 对任意正整数  $m$ , 由  $(a, b) = 1$ , 可写  $m = m_1 m_2$ , 使得  $m_1$  的素因子都是  $a$  的素因子, 且

$$(a, m_2) = 1, (m_1, b) = 1, (m_1, m_2) = 1$$

(这只需将  $m, a, b$  作素因数分解后, 各部分予以恰当分配即可达到要求).

取正整数  $k$ , 使得  $(k, m_1) = 1$ , 这样的  $k$  有无穷多个, 令  $n = m_2 k$ , 我们证明:  $(a + nb, m_1) = 1$ .

事实上, 设  $d = (a + nb, m_1)$ , 若  $d > 1$ , 取  $d$  的素因子  $p$ , 则  $p \mid m_1$ , 进而  $p \mid a$ , 所以,  $p \mid nb$ .

但由  $(m_1, k) = (m_1, m_2) = (m_1, b) = 1$ , 知  $p \nmid m_2 k b$ , 即  $p \nmid nb$ . 矛盾. 所以

$$(a + nb, m_1) = 1$$

又  $(a + nb, m_2) = (a + m_2 k b, m_2) = (a, m_2) = 1$ , 从而

$$(a + nb, m_1 m_2) = 1$$

即

$$(a + nb, m) = 1$$

命题获证.

32. 设  $a, b$  的素因数分解式中 2, 5 的幂次分别为  $\alpha_1, \beta_1$  和  $\alpha_2, \beta_2$ , 则

$$\begin{cases} a \cdot \alpha_1 + b \cdot \alpha_2 \geq 98 \\ a \cdot \beta_1 + b \cdot \beta_2 \geq 98 \end{cases}$$

并且 (1) 与 (2) 中必有一个取等号.

如果 (2) 取等号, 即  $a \cdot \beta_1 + b \cdot \beta_2 = 98$ , 那么当  $\beta_1$  与  $\beta_2$  都是正整数时, 左边为 5 的倍数, 当  $\beta_1$  或  $\beta_2$  中有一个为零时, 另一个必大于零, 此时左边仍然是 5 的倍数, 都导致矛盾. 所以 (1) 取等号.

由  $a \cdot \alpha_1 + b \cdot \alpha_2 = 98$ , 知若  $\alpha_1, \alpha_2$  中有一个为零, 不妨设  $\alpha_2 = 0$ , 则  $\alpha_1 > 0$ . 此时  $a \cdot \alpha_1 = 98$ , 若  $\alpha_1 \geq 2$ , 则  $4 \mid a$ , 矛盾. 故  $\alpha_1 = 1$ , 进而  $a = 98$ . 代入 (2), 由  $a = 98$  知  $\beta_1 = 0$ , 从而  $b \cdot \beta_2 > 98$ , 结合  $\alpha_2 = 0$ , 求得  $b$  最小为 75.

如果  $\alpha_1$  与  $\alpha_2$  都是正整数, 不妨设  $\alpha_1 \geq \alpha_2$ , 若  $\alpha_2 \geq 2$ , 则有  $4 \mid a, 4 \mid b$ , 导致  $4 \mid 98$ , 矛盾, 故  $\alpha_2 = 1$ . 进一步, 若  $\alpha_1 = 1$ , 则  $a + b = 98$ , 但  $\frac{a}{2}$  与  $\frac{b}{2}$  都是奇数, 故  $\frac{a}{2} + \frac{b}{2}$  为偶数, 矛盾, 故  $\alpha_1 > 1$ . 此时, 若  $\beta_1$  与  $\beta_2$  都是正整数, 则  $5 \mid a, 5 \mid b$ , 与  $a \cdot \alpha_1 + b \cdot \alpha_2 = 98$  矛盾, 故  $\beta_1$  与  $\beta_2$  中有一个为零. 若  $\beta_1 = 0$ , 则由 (2) 知  $b\beta_2 > 98$ , 此时  $b^b$  的末尾零的个数大于 98 (因为, 此时  $10 \mid b$ . 当  $\beta_2 = 1$  时,  $b \geq 100$ , 此时  $10^{100} \mid b^b$ . 而当  $\beta_2 \geq 2$  时,  $50 \mid b$ , 若  $b > 50$ , 则  $10^{100} \mid b^b$ ; 若  $b = 50$ , 则  $a \cdot \alpha_1 = 48$ , 这时当  $\alpha_1 \geq 4$  时,  $2^5 \mid a \cdot \alpha_1$ , 而  $\alpha_1 \leq 3$  时,  $2^4 \nmid a \cdot \alpha_1$  都导致矛盾, 所以,  $b^b$  的末尾零的个数大于 98).

类似地, 若  $\beta_2 = 0$ , 则  $a \cdot \beta_1 > 98$ , 同样可知  $a^a$  的末尾零的个数大于 98, 矛盾. 综上可知,  $ab$  的最小值为 7350 (当  $(a, b) = (98, 75)$  或  $(75, 98)$  时取到).

33. 由条件可知  $m$  为一个 4 次方数, 因此, 可设

$$m = 2^{4\alpha_2} \cdot 3^{4\alpha_3} \cdot 5^{4\alpha_5} \cdot 7^{4\alpha_7} \cdots$$

其中  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5, \alpha_7, \cdots$  都是非负整数. 而

$$d(m) = (4\alpha_2 + 1)(4\alpha_3 + 1) \cdots$$

是一个奇数, 故  $\alpha_2 = 0$ , 并且

$$1 = \frac{4\alpha_3 + 1}{3^{\alpha_3}} \cdot \frac{4\alpha_5 + 1}{5^{\alpha_5}} \cdot \frac{4\alpha_7 + 1}{7^{\alpha_7}} \cdots = x_3 x_5 x_7 \cdots$$

这里

$$x_3 = \frac{4\alpha_3 + 1}{3^{\alpha_3}}, x_5 = \frac{4\alpha_5 + 1}{5^{\alpha_5}}, \cdots$$

当  $\alpha_3 = 1$  时,  $x_3 = \frac{5}{3}$ ;  $\alpha_3 = 0$  或 2 时,  $x_3 = 1$ ; 而  $\alpha_3 \geq 3$  时,  $3^{\alpha_3} > 4\alpha_3 + 1$ , 故此时  $x_3 < 1$ .

当  $\alpha_5 = 0$  或 1 时,  $x_5 = 1$ ;  $\alpha_5 \geq 2$  时,  $5^{\alpha_5} \geq 12\alpha_5 + 1$ , 故  $5^{\alpha_5} \geq \frac{25}{9}(4\alpha_5 + 1)$ , 即  $x_5 \leq \frac{9}{25}$ .

当  $p > 5$ ,  $p$  为素数时, 在  $\alpha_p = 0$  时,  $x_p = 1$ , 而  $\alpha_p = 1$  时,  $p^\alpha p_p > 5 = 4\alpha_p + 1$ , 故  $x_p < 1$ ; 而  $\alpha_p > 1$  时,  $x_p < \frac{9}{25}$ .

上述讨论表明: 若  $\alpha_3 \neq 1$ , 则

故

$$x_3 = x_5 = x_7 = \cdots = 1$$

而

$$\alpha_3 = 0 \text{ 或 } 2, \alpha_5 = 0 \text{ 或 } 1,$$

$$\alpha_7 = \alpha_{11} = \cdots = 0$$

即

$$m = 1, 3^8, 5^4 \text{ 或 } 45^4.$$

若  $\alpha_3 = 1$ , 则  $3 \mid m$ , 此时, 由  $m = d(m)^4$ , 知

$$m = 5^4 \times (4\alpha_5 + 1)^4 \times (4\alpha_7 + 1)^4 \cdots$$

于是存在素数  $p \geq 5$ , 使得  $3 \mid 4\alpha_p + 1$ , 这要求  $\alpha_p \geq 2$ , 从而  $x_p < \frac{9}{25}$ . 此导致

$$x_3 x_5 x_7 \cdots \leq \frac{5}{3} \times \frac{9}{25} = \frac{3}{5} < 1$$

矛盾.

所以

$$m = 1, 5^4, 3^8, 3^8 \cdot 5^4$$

(直接验证, 可知它们确实满足条件).

34. 设  $n$  为正整数, 如果  $n$  为偶数, 那么表示  $n = (2n) - n$  符合要求. 如果  $n$  为奇数, 设  $p$  是不整除  $n$  的最小奇素数, 那么表示  $n = pn - (p-1)n$  中,  $pn$  的素因子个数等于  $n$  的素因子个数加上 1; 而  $p-1$  是偶数, 且由  $p$  的定义, 知  $p-1$  的每个奇素因子都是  $n$  的素因子, 所以,  $(p-1)n$  的素因子个数也等于  $n$  的素因子个数加上 1. 命题获证.

35. 不妨设  $a \leq b$ , 由条件知

$$a^2(b^2 + 1) = c^2 + 1 - b^2 - 1 = (c-b)(c+b)$$



故  $b^2 + 1 \mid c - b$  或者  $b^2 + 1 \mid c + b$  (这里用到  $b^2 + 1$  为素数).  
若

$$b^2 + 1 \mid c - b$$

则

$$c - b \geq b^2 + 1 \text{ (注意 } c > b \text{ 是显然的),}$$

即

$$c \geq b^2 + b + 1$$

此时

$$c^2 + 1 \geq (b^2 + b + 1)^2 + 1 > (b^2 + 1)^2 \geq (a^2 + 1)(b^2 + 1)$$

矛盾.

若

$$b^2 + 1 \mid c + b$$

则

$$c + b \geq b^2 + 1$$

即

$$c \geq b^2 - b + 1$$

于是

$$c^2 + 1 \geq (b^2 - b + 1)^2 + 1 \tag{1.68}$$

$$= (b^2 + 1)^2 - 2b(b^2 + 1) + b^2 + 1 \tag{1.69}$$

$$= (b^2 + 1)((b - 1)^2 + 1) \tag{1.70}$$

注意到, 若  $a = b$ , 则  $c^2 + 1 = (a^2 + 1)^2$ , 这在  $a, c$  都是正整数时不能成立 (因为两个正整数的平方差至少为 3), 所以,  $a < b$ , 即有  $a \leq b - 1$ , 因此

$$c^2 + 1 \geq (b^2 + 1)((b - 1)^2 + 1) \geq (b^2 + 1)(a^2 + 1)$$

结合条件, 可知

$$a = b - 1, c = b^2 - b + 1$$

此时, 由  $a^2 + 1$  与  $b^2 + 1$  都是素数, 知  $b^2 + 1$  为奇数,  $b$  为偶数, 从而  $a = b - 1$  为奇数,  $a^2 + 1$  为偶数, 所以  $a = 1$ , 进而  $b = 2, c = 3$ . 又当  $(a, b, c) = (1, 2, 3)$  或  $(2, 1, 3)$  时, 条件满足, 它们就是要求的答案.

36. 记  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{p(k)}{k}$ , 则由  $p(k)$  的定义可知

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{p(k)}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{p(2k-1)}{2k-1} + \sum_{k=1}^n \frac{p(2k)}{2k} \quad (1.71)$$

$$= n + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{p(2k)}{k} = n + \frac{1}{2} S_n \quad (1.72)$$

类似可知

$$S_{2n+1} = n + 1 + \frac{1}{2} S_n$$

回到原题, 当  $n = 1$  时, 命题显然成立. 现设命题对  $1 \leq n \leq m$  都成立, 考虑  $n = m + 1$  的情形.

如果  $m + 1$  为偶数, 那么, 由 (1) 结合归纳假设, 可知

$$\frac{m+1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \left( \frac{m+1}{2} \right)}{3} < \frac{m+1}{2} + \frac{1}{2} S_{\frac{m+1}{2}} = S_{m+1} < \frac{m+1}{2} + \frac{1}{2} \quad (1.73)$$

$$\frac{2 \left( \frac{m+1}{2} + 1 \right)}{3} \quad (1.74)$$

即有  $\frac{2}{3}(m+1) < S_{m+1} < \frac{2}{3}(m+2)$ , 知命题对  $m+1$  亦成立.

如果  $m + 1$  为奇数, 同上利用 (2) 亦可知命题对  $m + 1$  成立.

所以, 结论成立.

37. 由对称性, 不妨设  $a \geq b \geq c$ , 注意到, 当  $(a, b, c) = (2, 2, 2), (3, 2, 2), (3, 3, 2), (4, 2, 2)$  时, 所给代数式  $A$  的值分别为  $2, \frac{3}{2}, \frac{17}{8}, \frac{11}{4}$ . 这表明: 当  $a + b + c \leq 8$  时,  $A \geq \frac{3}{2}$ .

下证: 当  $a + b + c \geq 9$  时, 有  $A \geq \frac{3}{2}$ .

事实上,

$$A \geq \frac{3}{2} \Leftrightarrow (a+b+c)^2 - 2([a, b] + [b, c] + [c, a]) \geq 3(a+b+c) \quad (1.75)$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2 \sum (ab - [a, b]) \geq 3(a+b+c). \quad (1.76)$$

由于对正整数  $x, y$ , 都有  $xy \geq [x, y]$ , 因此, 只要证明:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 3(a + b + c)$$

结合  $a + b + c \geq 9$ , 可知为证明 (1) 成立, 只要证明:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{3}(a + b + c)^2 \quad (1.77)$$

$$\Leftrightarrow 3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a + b + c)^2 \quad (1.78)$$

$$\Leftrightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) - 2(ab + bc + ca) \geq 0 \quad (1.79)$$

$$\Leftrightarrow (a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \geq 0. \quad (1.80)$$

最后一式显然成立.

所以, 所求代数式的最小值为  $\frac{3}{2}$ .

38. 记  $u = (a, c), v = (b, c)$ , 则条件 (2) 变为

$$\frac{\frac{ac}{u} + \frac{bc}{v}}{a + b} = \frac{p^2 + 1}{p^2 + 2} \cdot c$$

即

$$\frac{a}{u} + \frac{b}{v} = \frac{p^2 + 1}{p^2 + 2}(a + b)$$

由于  $\frac{1}{2} < 1 - \frac{1}{p^2 + 2} = \frac{p^2 + 1}{p^2 + 2} < 1$ , 结合 (1) 知

$$\frac{a + b}{2} < \frac{a}{u} + \frac{b}{v} < a + b$$

若  $u, v$  都不小于 2, 则 (2) 的左边不等式不成立; 若  $u = v = 1$ , 则 (2) 的右边不等式不成立. 因此  $u, v$  中恰有一个等于 1.

由对称性, 不妨设  $u = 1, v \geq 2$ . 并记  $b_1 = \frac{b}{v}$ , 代入 (1) 得  $(p^2 + 2)(a + b_1) = (p^2 + 1)(a + b_1 v)$ , 于是,

$$a = b_1 \left( (p^2 + 1)v - (p^2 + 2) \right).$$

若  $v \geq 3$ , 则由 (3) 得  $a \geq 3(p^2 + 1) - (p^2 + 2) = 2p^2 + 1$ , 与条件 (1) 不符, 故  $v = 2$ . 此时 (3) 式变为  $a = p^2 b_1$ , 结合  $a \leq 2p^2$ , 知  $b_1 \leq 2$ .

注意到,  $(a, c) = u = 1, (b, c) = v = 2$ , 知  $c$  是一个偶数, 且与  $p^2 b_1$  互素. 这表明  $p$  为奇素数, 且  $b_1$  为奇数, 结合  $b_1 \leq 2$ , 知  $b_1 = 1$ , 进而  $b = 2$ . 所以,  $(a, b, c) = (p^2, 2, c)$ , 其中  $c$  为偶数但不是  $p$  的倍数, 这样的数组共有  $p^2 - p$  组.

综上可知, 当  $p = 2$  时, 不存在符合条件的数组; 当  $p > 2$  时, 满足条件的数组共有  $p^2 - p$  组.

39. 考虑目标函数  $S =$  黑板上所有数之积.

最初  $S = 33! = 2^{31} \cdot 3^{15} \cdot 5^7 \cdot 7^4 \cdot 11^3 \cdot 13^2 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31$ , 每一步操作针对  $x, y (x | y)$ , 记  $y = kx$ , 去掉  $x, y$  代之以  $k$  后,  $S$  变为  $\frac{S}{xy} \cdot k = \frac{S}{x^2}$ , 这表明每次操作,  $S$  的每个素因子的幂次的奇偶性保持不变, 特别地,  $2, 3, 5, 11$  都整除每次操作后所得的  $S$ . 而  $2 \times 3 \times 5 \times 11 > 33$ , 因而, 最后留下的数中, 至少需要两个数, 使得它们之积为  $2 \times 3 \times 5 \times 11$  的倍数.

又注意到, 素数  $17, 19, 23, 29, 31$  的每一个大于自身的倍数都大于  $33$ , 因而, 任何一次操作都不能去掉其中的任何一个数.

上述讨论表明: 黑板上至少剩下 7 个数.

下面的例子表明可以恰好剩下 7 个数:

$$\begin{aligned} & (32, 16) \rightarrow 2, (30, 15) \rightarrow 2, (28, 14) \rightarrow 2, (26, 13) \rightarrow 2, (24, 12) \rightarrow 2, \\ & (22, 11) \rightarrow 2; (27, 9) \rightarrow 3, (21, 7) \rightarrow 3, (18, 6) \rightarrow 3; (25, 5) \rightarrow 5, \\ & (20, 4) \rightarrow 5; (8, 2) \rightarrow 4. \\ & (5, 5) \rightarrow 1; (4, 2) \rightarrow 2; (3, 3) \rightarrow 1, (3, 3) \rightarrow 1, (2, 2) \rightarrow 1, (2, 2) \rightarrow 1, \\ & (2, 2) \rightarrow 1. \end{aligned}$$

这样, 黑板上留下  $10, 17, 19, 23, 29, 31, 33$  共 7 个数和 7 个 1, 而 7 个 1 再经与 17 搭配操作 7 次即可全部去掉.

综上可知, 至少有 7 个数被留下.

40. 当  $n$  为偶数时, 设  $n = 2m, x = 5^m$ , 则

$$A = 1 + 5^n + 5^{2n} + 5^{3n} + 5^{4n} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8 \quad (1.81)$$

$$= \frac{x^{10} - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x^5 - 1)(x^5 + 1)}{(x - 1)(x + 1)} \quad (1.82)$$

$$= (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1). \quad (1.83)$$

由于  $x = 5^m > 1$ , 可知上式右边两个式子中的数都大于 1, 因此,  $A$  为合数.

当  $n$  为奇数时, 设  $n = 2m + 1, y = 5^m, z = 5y^2$ , 则

$$A = 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 \quad (1.84)$$

$$= (1 + 3z + z^2)^2 - 5z^3 - 10z^2 - 5z \quad (1.85)$$

$$= (1 + 3z + z^2)^2 - 5z(z + 1)^2 \quad (1.86)$$

$$= (1 + 5y^2 + 25y^4)^2 - 25y^2(1 + 5y^2)^2 \quad (1.87)$$

$$= (1 + 5y^2 + 25y^4 - 5y(1 + 5y^2)) (1 + 5y^2 + 25y^4 + 5y(1 + 5y^2)) \quad (1.88)$$

当  $m > 0$ , 即  $y \geq 5$  时, 上式右边两式都大于 1, 此时,  $A$  为合数,  
当  $m = 0$  时,  $A = 1 + 5 + 5^2 + 5^3 + 5^4 = 781 = 11 \times 71$  也是合数.

所以, 对任意正整数  $n, A$  为合数, 命题获证.

## 1.2 同余

同余是由大数学家高斯引入的一个概念. 我们可以将它理解为“余同”, 即余数相同. 正如奇数与偶数是依能否被 2 整除而得到的关于整数的分类一样, 考虑除以  $m(\geq 2)$  所得余数的不同, 可以将整数分为  $m$  类. 两个属于同一类中的数相对于“参照物”  $m$  而言, 具有“余数相同”这个性质. 这种为对比两个整数的性质, 引入一个参照物的思想是同余理论的一个基本出发点.

同余是初等数论中的一门语言, 是一件艺术品. 它为许多数论问题的表述赋予了统一的, 方便的和本质的形式.

### 1.2.1 同余的概念与基本性质

定义 如果  $a, b$  除以  $m(\geq 1)$  所得的余数相同, 那么称  $a, b$  对模  $m$  同余, 记作  $a \equiv b(\text{mod } m)$ . 否则, 称  $a, b$  对模  $m$  不同余, 记作  $a \not\equiv b(\text{mod } m)$ .

性质 1  $a \equiv b(\text{mod } m)$  的充要条件是  $m \mid a - b$ .

性质 2 若  $a \equiv b(\text{mod } m), c \equiv d(\text{mod } m)$ , 则  $a + c \equiv b + d(\text{mod } m)$ ,  $a - c \equiv b - d(\text{mod } m), ac \equiv bd(\text{mod } m)$ .

证明这些结论与等式的一些相关结论极其相似, 它们都容易证明. 我们只给出第 3 个式子的证明.

只需证明:  $m \mid ac - bd$ .

因为

$$ac - bd = ac - bc + bc - bd \quad (1.89)$$

$$= (a - b)c + b(c - d) \quad (1.90)$$

由条件  $m \mid a - b, m \mid c - d$ , 知  $m \mid ac - bd$ .

说明与同余有关的许多结论都要用到性质 1, 事实上, 很多数论教材中利用性质 1 来引入同余的定义.

性质 3 若  $a \equiv b(\text{mod } m), n$  为正整数, 则  $a^n \equiv b^n(\text{mod } m)$ .

性质 4 若  $a \equiv b(\text{mod } m_1), a \equiv b(\text{mod } m_2)$ , 则  $a \equiv b(\text{mod } [m_1, m_2])$ .

性质 5 若  $ab \equiv ac(\text{mod } m)$ , 则  $b \equiv c \left( \text{mod } \frac{m}{(a, m)} \right)$ .

在同余式两边约去一个数时, 应将该数与  $m$  的最大公因数在“参照物”中同时约去.

性质 6 如果  $(a, m) = 1$ , 那么存在整数  $b$ , 使得  $ab \equiv 1(\text{mod } m)$ . 这个  $b$  称  $a$  对模  $m$  的数论倒数, 记为  $a^{-1}(\text{mod } m)$ , 在不会引起误解时常常简记为  $a^{-1}$ .

证明利用贝祖定理, 可知存在整数  $x, y$  使得

$$ax + my = 1$$

于是,  $m \mid ax - 1$ , 即  $ax \equiv 1(\text{mod } m)$ , 故存在符合条件的  $b$ .

说明由数论倒数的定义, 易知当  $(a, m) = 1$  时,  $(a^{-1})^{-1} \equiv a(\text{mod } m)$ .

例 1 求所有的素数  $p, q, r (p \leq q \leq r)$ , 使得

$$pq + r, pq + r^2, qr + p, qr + p^2, rp + q, rp + q^2$$

都是素数.

解若  $p > 2$ , 则  $p, q, r$  都是奇数, 此时  $pq + r$  是一个大于 2 的偶数, 矛盾, 故  $p = 2$ . 现在, 数

$$2q + r, 2q + r^2, qr + 2, qr + 4, 2r + q, 2r + q^2$$

都是素数.

若  $q, r$  中有偶数, 则  $qr + 2$  为一个大于 2 的偶数, 矛盾, 故  $q, r$  都是奇素数. 若  $q > 3$ , 则  $3 \nmid qr$ . 此时, 若  $qr \equiv 1(\text{mod } 3)$ , 则  $qr + 2 \equiv 0(\text{mod } 3)$ , 与  $qr + 2$  为素数矛盾; 若  $qr \equiv 2(\text{mod } 3)$ , 则  $qr + 4 \equiv 0(\text{mod } 3)$ , 与  $qr + 4$  为素数矛盾, 故  $q = 3$ . 这样, 数

$$6 + r, 6 + r^2, 3r + 2, 3r + 4, 2r + 3, 2r + 9$$

都是素数.

若  $r \neq 5$ , 则  $r \neq 0(\text{mod } 5)$ , 但分别当  $r \equiv 1, 2, 3, 4(\text{mod } 5)$  时, 对应地, 数  $3r + 2, 3r + 4, 2r + 9, 6 + r$  为 5 的倍数, 矛盾, 故  $r = 5$ .

直接验证, 可知它们满足条件, 所求的素数为

$$p = 2, q = 3, r = 5$$

例 2 设  $n$  为大于 1 的正整数, 且  $1!, 2!, \dots, n!$  中任意两个数除以  $n$  所得的余数不同. 证明:  $n$  是一个素数.

证明注意到,  $n! \equiv 0(\text{mod } n)$ , 而  $n = 4$  时, 有  $2! \equiv 3!(\text{mod } 4)$ . 因此,

如果能够证明: 当  $n$  为大于 4 的合数, 都有  $(n-1)! \equiv 0(\text{mod } n)$ , 就能依题中的条件导出矛盾. 从而证出  $n$  为素数.

事实上, 若  $n$  为大于 4 的合数, 则可对  $n$  作分解, 变为下述两种情形.

情形一可写  $n = pq, 2 \leq p < q, p, q$  为正整数, 这时  $1 < p < q < n-1$ , 从而  $pq \mid (n-1)!$ , 即  $(n-1)! \equiv 0(\text{mod } n)$ .

情形二当  $n = p^2$ ,  $p$  为素数时, 由  $n > 4$ , 知  $p \geq 3$ , 故  $1 < p < 2p < (n-1)$ , 从而  $p \cdot (2p) \mid (n-1)!$ , 于是,  $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$ .

综上可知,  $n$  只能是素数.

说明反过来, 当  $n$  为素数时, 并不能保证  $1!, 2!, \dots, n!$  中任意两个数对模  $n$  不同余. 例如  $p = 5$  时,  $3! \equiv 1! \pmod{5}$ .

例 3 设整数  $x, y, z$  满足

$$(x-y)(y-z)(z-x) = x+y+z.$$

证明:  $x+y+z$  是 27 的倍数.

证明考虑  $x, y, z$  除以 3 所得的余数, 如果  $x, y, z$  中任意两个对模 3 不同余, 那么

$$x+y+z \equiv 0+1+2 \equiv 0 \pmod{3}$$

但是  $3 \nmid (x-y)(y-z)(z-x)$ , 这与 (1) 矛盾.

现在  $x, y, z$  中必有两个对模 3 同余, 由对称性, 不妨设  $x \equiv y \pmod{3}$ , 这时由 (1) 式知

$$3 \mid x+y+z,$$

于是

$$z \equiv -(x+y) \equiv -2x \equiv x \pmod{3}$$

这表明

$$x \equiv y \equiv z \pmod{3}$$

从而由 (1) 式知

$$27 \mid x+y+z.$$

例 4 是否存在 19 个不同的正整数, 使得在十进制表示下, 它们的数码和相同, 并且这 19 个数之和为 1999?

解此题需要用到一个熟知的结论: 在十进制表示下, 每个正整数与它的数码和对模 9 同余. (这个结论只需利用  $10^k \equiv 1 \pmod{9}$  即可得证)

若存在 19 个满足条件的不同正整数, 则由它们的数码和相同 (设这个相同的数码和为  $k$ ), 可知  $1999 \equiv 19k \pmod{9}$ , 故  $k \equiv 1 \pmod{9}$ . 又这 19 个数之和为 1999, 故其中必有一个数不大于  $\frac{1999}{19}$ , 即有一个数  $\leq 105$ , 所以  $k \leq 18$ . 结合  $k \equiv 1 \pmod{9}$ , 知  $k = 1$  或  $10$ .



若  $k = 1$ , 则这 19 个数为  $1, 10, 100, \dots$ , 和不可能为 1999, 所以,  $k =$

10. 而当  $k = 10$  时, 最小的数码和为 10 的 20 个正整数是

$$19, 28, 37, \dots, 91, 109, 118, 127, \dots, 190, 208$$

前面 19 个数之和为 1990, 故符合要求的 19 个正整数中必有一个  $\geq 208$ , 此时

$$\text{这19个数之和} \geq 208 + (19 + 28 + \dots + 91) + \quad (1.91)$$

$$(109 + 118 + 127 + \dots + 181) \quad (1.92)$$

$$= 2198 > 1999 \quad (1.93)$$

矛盾.

所以不存在 19 个不同的整数满足条件.

例 5 设  $m, n, k$  为正整数,  $n \geq m + 2$ ,  $k$  为大于 1 的奇数, 并且  $p = k \times 2^n + 1$  为素数,  $p \mid 2^{2^m} + 1$ . 证明:  $k^{2^{n-1}} \equiv 1 \pmod{p}$ .

证明由条件知  $2^{2^m} \equiv -1 \pmod{p}$ , 而  $n \geq m + 2$ , 故  $2^{m+1}$  是  $n \cdot 2^{n-1}$  的因数, 所以,  $2^{n \cdot 2^{n-1}} \equiv (-1)^{2^t} = 1 \pmod{p}$  (这里  $t = n \cdot 2^{n-m-2}$ ).

现在, 由  $k \cdot 2^n \equiv -1 \pmod{p}$ , 知  $k^{2^{n-1}} \cdot 2^{n \cdot 2^{n-1}} \equiv (-1)^{2^{n-1}} = 1 \pmod{p}$ , 结合上面的结论, 即可得  $k^{2^{n-1}} \equiv 1 \pmod{p}$ .

说明本题的背景是讨论费马数 (形如  $F_m = 2^{2^m} + 1$  的数为费马数) 的素因数的性质.

例 6 设  $m$  为正整数, 证明: 存在整数  $a, b, k$ , 使得  $a, b$  都是奇数, 而  $k \geq 0$ , 并且

$$2m = a^{20} + b^{11} + k \cdot 2^{2011}$$

证明 (1) 式等价于 (在左边不小于右边的情形下)

$$2m \equiv a^{20} + b^{11} \pmod{2^{2011}}$$

我们先证明: 满足 (2) 的奇数  $a, b$  是存在的.

注意到, 对任意奇数  $x, y$ , 有

$$x^{11} - y^{11} = (x - y)(x^{10} + x^9y + \dots + y^{10})$$

上式右边  $x^{10} + x^9y + \dots + y^{10}$  是 11 个奇数之和, 它应为奇数, 因此,  $x^{11} - y^{11} \equiv 0 \pmod{2^{2011}} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{2^{2011}}$ . 这表明: 在  $\text{mod } 2^{2011}$  的

意义下, 数  $1^{2011}, 3^{2011}, \dots, (2^{2011} - 1)^{11}$  是数  $1, 3, 5, \dots, 2^{2011} - 1$  的一个排列, 从而, 存在奇数  $b_0$ , 使得  $b_0^{11} \equiv 2m - 1 \pmod{2^{2011}}$ .

现在, 取一个充分小的负奇数  $b$ , 使得  $b \equiv b_0 \pmod{2^{2011}}$ , 且  $2m - 1 - b^{11} \geq 0$ , 则  $2m - 1 - b^{11} \equiv 2m - 1 - b_0^{11} \equiv 0 \pmod{2^{2011}}$ , 于是, 令  $(a, b, k) = (1, b, \frac{2m-1-b^{11}}{2^{2011}})$ , 则符合 (1). 所以, 满足条件的  $a, b, k$  存在.

### 1.2.2 剩余系及其应用

对任意正整数  $m$  而言, 一个整数除以  $m$  所得的余数只能是  $0, 1, 2, \dots, m - 1$  中的某一个, 依此可将整数分为  $m$  个类 (例如  $m = 2$  时, 就是奇数或偶数), 从每一类中各取一个数所组成的集合就称为模  $m$  的一个完全剩余系, 简称为模  $m$  的完系. 依此定义, 可以容易地得到下面的两个性质.

性质 1 若整数  $a_1, a_2, \dots, a_m$  对模  $m$  两两不同余, 则  $a_1, a_2, \dots, a_m$  构成模  $m$  的一个完系.

性质 2 任意连续  $m$  个整数构成模  $m$  的一个完系, 其中必有一个数为  $m$  的倍数.

引入完系的概念, 蕴含了“整体处理”的思想, 在用同余方法处理数论问题时, 我们常常需要选择不同的完系来达到目的, 做出恰当地分析.

例 1 证明: 在十进制表示下, 任意 39 个连续正整数中, 必有一个数的数码和是 11 的倍数.

证明由于连续 10 个正整数中必有一个为 10 的倍数, 故连续 39 个正整数中必有 3 个数为 10 的倍数, 这 3 个数中必有一个数的十位数字不大于 8, 且该数后有至少 19 个数在所取的 39 个连续的正整数中. 设这个数为  $a$ , 并设它的数码和为  $S(a)$ , 现在考虑数

$$a, a + 1, \dots, a + 9, a + 19$$

这 11 个数都是所取的 39 个数中的数, 并由  $a$  的选择知, 它们的数码和分别为  $S(a), S(a) + 1, \dots, S(a) + 10$ , 构成 11 个连续的正整数, 其中必有一个数为 11 的倍数. 命题获证.

说明是否命题对连续 38 个连续正整数也对呢? 答案是否定的, 原因是可能找不到由数码和构成的模 11 的完系. 一个反例是: 999981, 999982, ..., 1000018, 这 38 个数中没有一个数的数码和是 11 的倍数.

例 2 设  $n$  为正奇数. 证明: 数

$$2 - 1, 2^2 - 1, \dots, 2^{n-1} - 1$$

中必有一个数是  $n$  的倍数.

证明当  $n = 1$  时, 命题显然成立.

考虑  $n > 1$  的情形, 此时, 在数

$$1, 2, \dots, 2^{n-1}$$

中没有一个数为  $n$  的倍数, 故它们除以  $n$  所得的余数只能是  $1, 2, \dots, n-1$ . 所以, 这  $n$  个数中必有两个数对模  $n$  同余, 即存在  $0 \leq i < j \leq n-1$ , 使得  $2^i \equiv 2^j \pmod{n}$ . 又  $n$  为奇数, 故  $(2^i, n) = 1$ , 所以,  $2^{j-i} \equiv 1 \pmod{n}$ , 即  $n \mid 2^{2^i} - 1$ . 命题获证.

说明在处理数论中的一些存在性问题时, 经常需要将同余方法与抽屉原则相结合.

例 3 设  $m, n$  为正整数,  $m$  为奇数, 且  $(m, 2^n - 1) = 1$ . 证明: 数  $1^n + 2^n + \dots + m^n$  是  $m$  的倍数.

证明由于  $m$  为奇数, 而  $1, 2, \dots, m$  是模  $m$  的一个完系, 故  $2 \times 1, 2 \times 2, \dots, 2 \times m$  也是模  $m$  的一个完系, 所以,

$$1^n + 2^n + \dots + m^n \equiv (2 \times 1)^n + (2 \times 2)^n + \dots + (2 \times m)^n \pmod{m}.$$

即  $m \mid (2^n - 1)(1^n + 2^n + \dots + m^n)$ , 结合  $(m, 2^n - 1) = 1$  可知命题成立.

说明这里凸现了“整体处理”的妙处. 一个有趣的技巧是: 当  $n$  为奇数时, 利用因式分解可知对  $1 \leq k \leq m-1$ , 有  $k^n + (m-k)^n$  是  $m$  的倍数, 因此, 可对和数  $1^n + \dots + m^n$  进行配对处理后证出结论. 但这个方法对  $n$  是偶数的情形就失效了.

例 4 (1) 证明: 存在无穷多组整数  $(x, a, b, c)$ , 使得

$$x^2 + a^2 = (x+1)^2 + b^2 = (x+2)^2 + c^2$$

(2) 问: 是否存在整数组  $(x, a, b, c, d)$ , 使得

$$x^2 + a^2 = (x+1)^2 + b^2 = (x+2)^2 + c^2 = (x+3)^2 + d^2?$$

解 (1) 对大于 1 的正整数  $k$ , 令  $x = 4k^3 - 1, a = 2k^2 + 2k, b = 2k^2 + 1, c = 2k^2 - 2k$ , 可知整数组  $(x, a, b, c)$  符合要求.

这里  $(x, a, b, c)$  的构造思路如下:

由题目的要求, 知  $a^2 - b^2 = 2x + 1, b^2 - c^2 = 2x + 3$ , 于是, 设  $b = c + n, a = b + m = c + n + m$ , 应有

$$\begin{cases} 2cn + n^2 = 2x + 3 \\ 2cm + 2mn + m^2 = 2x + 1 \end{cases}$$

这要求  $m, n$  都为奇数, 两式相减后, 得  $c = \frac{1+mm}{n-m} - \frac{n+m}{2}$ , 为使其为整数,

取  $n = m + 2$ , 得  $c = \frac{1+m(m+2)}{2} - \frac{2m+2}{2} = \frac{m^2-1}{2}$ , 令  $m = 2k + 1$ , 就得到了我们的构造.

(2) 不存在这样的整数组.

事实上, 对任意整数  $y$ , 我们有

$$y^2 \equiv \begin{cases} 0(\text{mod}8), & \text{若 } y \equiv 0(\text{mod}4); \\ 1(\text{mod}8), & \text{若 } y \equiv 1 \text{ 或 } 3(\text{mod}4); \\ 4(\text{mod}8), & \text{若 } y \equiv 2(\text{mod}4). \end{cases}$$

所以, 对整数  $y, z$  有

$$y^2 + z^2 \equiv \begin{cases} 0, 1 \text{ 或 } 4(\text{mod}8), & \text{若 } y \equiv 0(\text{mod}4); \\ 1, 2 \text{ 或 } 5(\text{mod}8), & \text{若 } y \equiv 1 \text{ 或 } 3(\text{mod}4); \\ 0, 4 \text{ 或 } 5(\text{mod}8), & \text{若 } y \equiv 2(\text{mod}4). \end{cases}$$

如果存在符合要求的整数组  $(x, a, b, c, d)$ , 记  $T = x^2 + a^2$ , 由于  $x, x+1, x+2, x+3$  构成模 4 的一个完系, 不妨设  $x \equiv 0(\text{mod}4)$ , 那么  $x+1 \equiv 1(\text{mod}4), x+2 \equiv 2(\text{mod}4)$ , 所以, 应有

$$T(\text{mod}8) \in \{0, 1, 4\} \cap \{1, 2, 5\} \cap \{0, 4, 5\} = \emptyset$$

这是一个矛盾.

例 5 设  $n$  为正整数. 证明: 存在一个各数码都是奇数的正整数, 它是  $5^n$  的倍数.

证明我们利用递推方法构造符合条件的  $n$  位正整数.

当  $n = 1$  时, 取  $a_1 = 5$ , 即可.

设  $n = m$  时, 存在一个各数码都是奇数的  $m$  位正整数  $a_m$ , 使得  $5^m \mid a_m$ .

设  $a_m = 5^m \times q$ , 其中  $q \equiv r(\text{mod}5), r = 0, 1, 2, 3 \text{ 或 } 4$ . 现在考虑数

$$10^m, 3 \times 10^m, 5 \times 10^m, 7 \times 10^m, 9 \times 10^m$$

它们除以  $5^m$  后, 所得的商数分别为

$$2^m, 3 \times 2^m, 5 \times 2^m, 7 \times 2^m, 9 \times 2^m$$

其中任意两个数之差不是 5 的倍数, 它们构成模 5 的一个完全系. 故其中必有一个数  $\equiv 5 - r \pmod{5}$ , 设  $a \times 2^m \equiv 5 - r \pmod{5}$ , 这里  $a$  是 1, 3, 5, 7, 9 中的某个数. 令  $a_{m+1} = a \times 10^m + a_m$ , 则

$$5^m \mid a_{m+1}$$

且

$$\frac{a_{m+1}}{5^m} \equiv a \times 2^m + r \equiv 5 - r + r \equiv 0 \pmod{5}$$

故

$$5^{m+1} \mid a_{m+1}$$

因此, 存在一个  $m+1$  位正整数  $a_{m+1}$ , 其各数码都是奇数, 且  $5^{m+1} \mid a_{m+1}$ . 命题获证.

说明这里我们采用了加强命题的方式, 证明了不仅存在满足条件的数, 并且该数还是一个  $n$  位数. 在递推构造中, 这个加强带来了很大的方便.

例 6 一次圆桌会议共有 2012 个人参加, 中场休息后, 他们依不同的次序重新围着圆桌坐下. 证明: 至少有两个人, 他们之间的人数在休息前与休息后是相等的.

证明记  $n = 1006$ , 我们对每个座位标号, 将座位的号码依顺时针方向依次记为

$$1, 2, 3, \dots, 2n$$

因而, 每一个人可对应一个数对  $(i, j)$ , 其中  $i, j$  分别为他在休息前后的座位号. 显然, 所有的“横坐标” $i$  与“纵坐标” $j$  都取遍  $(1)$ , 亦即恰好构成模  $2n$  的完全剩余系.

如果每两个人  $(i_1, j_1), (i_2, j_2)$  在休息前后, 坐在他们之间的人数都不相同, 则应有

$$j_2 - j_1 \neq i_2 - i_1.$$

注意, 上式中当  $j_2 < j_1$  (或  $i_2 < i_1$ ) 时,  $j_2$  应换成  $2n + j_2$  (或  $i_2$  应换  $2n + i_2$ ). 当然更好的写法是

$$j_2 - j_1 \not\equiv i_2 - i_1 \pmod{2n}$$

也就是

$$j_2 - i_2 \not\equiv j_1 - i_1 \pmod{2n}$$

上式的含义是任意两个人的纵横坐标之差都对模  $2n$  不同余, 从而

$$j_1 - i_1, j_2 - i_2, \dots, j_{2n} - i_{2n}$$

也是模  $2n$  的一个完全剩余系.

考虑到模  $2n$  的每一个完全剩余系的各数之和应与

$$1 + 2 + 3 + \dots + 2n = \frac{2n(2n+1)}{2} = n(2n+1)$$

对模  $2n$  同余, 但  $n(2n+1) \not\equiv 0 \pmod{2n}$ , 故 (2) 中各数之和不能被  $2n$  整除, 从而不能等于 0. 这与

$$\sum_{k=1}^{2n} (j_k - i_k) = \sum_{k=1}^{2n} j_k - \sum_{k=1}^{2n} i_k = \sum_{k=1}^{2n} j - \sum_{k=1}^{2n} i = 0$$

矛盾. 这表明至少有两个人, 他们之间的人数在休息前后是相同的. 说明本质上是因为模  $2n$  的两个完系对应各数之差不能构成模  $2n$  的一个完系, 才会有本题的结论.

### 1.2.3 费马小定理及其应用

费马 (Fermat) 小定理是初等数论中的一个重要定理, 数学竞赛中经常需要用到.

Fermat 小定理设  $p$  为素数,  $a$  为整数, 则  $a^p \equiv a \pmod{p}$ . 特别地, 若  $p \nmid a$ , 则  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

请注意该定理中  $p$  为素数这个条件, 下面的证明中这个条件是非常重要的.

证明当  $p \mid a$  时, 结论显然成立.

当  $p \nmid a$  时, 设  $x_1, x_2, \dots, x_{p-1}$  是  $1, 2, \dots, p-1$  的一个排列, 我们先证:  $ax_1, ax_2, \dots, ax_{p-1}$  中任意两个数对模  $p$  不同余.

事实上, 若存在  $1 \leq i < j \leq p-1$ , 使得  $ax_i \equiv ax_j \pmod{p}$ , 则  $p \mid a(x_i - x_j)$ , 而  $p \nmid a$ , 故  $p \mid x_i - x_j$  (注意, 这里用到  $p$  为素数), 但  $x_i$  与  $x_j$  对模  $p$  不同余, 矛盾.

又  $ax_1, ax_2, \dots, ax_{p-1}$  中显然没有一个数为  $p$  的倍数, 因此,  $ax_1, ax_2, \dots, ax_{p-1}$  除以  $p$  所得的余数是  $1, 2, \dots, p-1$  的一个排列, 利用同余的性质, 知

$$(ax_1)(ax_2) \cdots (ax_{p-1}) \equiv x_1 x_2 \cdots x_{p-1} \pmod{p}$$

再由  $x_1 x_2 \cdots x_{p-1} = (p-1) \cdots 1$ , 它不是  $p$  的倍数 (注意, 这里再次用到  $p$  为素数), 所以,  $a^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p)$ .

说明这个证明体现了整体处理的思想, 它将模  $p$  的余数全体对等考虑, 分别将模  $p$  的两个剩余系 (都不包括零) 作乘积后得到一个同余式, 然后证出要证的式子.

例 1 设  $n$  为正整数. 证明:  $7 \mid 3^n + n^3$  的充要条件是  $7 \mid 3^n n^3 + 1$ .  
证明若

$$7 \mid 3^n + n^3,$$

于是, 由 Fermat 小定理, 知

$$n^6 \equiv 1(\text{mod } 7)$$

从而, 由

$$7 \mid 3^n + n^3,$$

知

$$7 \mid (3^n + n^3) n^3,$$

故

$$7 \mid 3^n n^3 + 1$$

反过来, 若

则

并且

即

利用 Fermat 小定理知

故

命题获证.

说明涉及指数的同余式经常需要用到 Fermat 小定理, 因为由 Fermat 小定理得出的结论中, 同余式的一边是 1, 这带来很大的方便.

例 2 设  $x$  为整数,  $p$  是  $x^2 + 1$  的奇素因数, 证明:  $p \equiv 1(\text{mod } 4)$ .  
证明由于  $p$  为奇素数, 若  $p \not\equiv 1(\text{mod } 4)$ , 则  $p \equiv 3(\text{mod } 4)$ , 可设  $p = 4k + 3$ , 此时, 由  $x^2 \equiv -1(\text{mod } p)$ , 得

$$x^{p-1} = x^{4k+2} = (x^2)^{2k+1} \equiv (-1)^{2k+1} \equiv -1(\text{mod } p)$$

而由 Fermat 小定理, 应有

$$x^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p)$$

结合上式将导出  $p \mid 2$ . 矛盾.

所以,  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .

说明利用此题的结论, 我们可以证明: 存在无穷多个模 4 余 1 的正整数为素数.

事实上, 若只有有限个素数模 4 余 1, 设它们是  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . 考虑数  $(2p_1p_2 \cdots p_n)^2 + 1$  的素因数即可导出矛盾.

例 3 设  $x$  为整数,  $p$  是数  $x^6 + x^5 + \cdots + 1$  的素因数. 证明:  $p = 7$  或  $p \equiv 1 \pmod{7}$ .

证明当  $x = 1$  时,  $p = 7$ ; 当  $x \neq 1$  时,  $p$  是  $\frac{x^7-1}{x-1}$  的素因子, 因此,  $x^7 \equiv 1 \pmod{p}$ , 这表明  $p \nmid x$ , 于是, 由 Fermat 小定理, 可知  $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ , 进而  $x^{(7 \cdot p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$ .

如果  $7 \nmid p-1$ , 即  $p \not\equiv 1 \pmod{7}$ , 那么  $(7, p-1) = 1$ , 得  $x \equiv 1 \pmod{p}$ , 于是,

$$0 \equiv x^6 + x^5 + \cdots + 1 \equiv 1^6 + 1^5 + \cdots + 1 = 7 \pmod{p}$$

得  $p = 7$ .

所以, 命题成立.

说明本题的解答中用到下面的结论: 若  $(a, m) = 1$ , 且  $a^u \equiv 1 \pmod{m}$ ,  $a^v \equiv 1 \pmod{m}$ , 则  $a^{(u,v)} \equiv 1 \pmod{m}$ .

它可以由下面的方法来得到.

由贝祖定理, 知存在整数  $x, y$ , 使得  $ux + vy = (u, v)$ , 于是,

$$a^{(u,v)} = a^{ux+vy} = (a^u)^x \cdot (a^v)^y \equiv 1^x \cdot 1^y = 1 \pmod{m}$$

这里在  $x, y$  为负整数时, 用数论倒数去理解.

另一方面, 本题的结论可推广为: 设  $q$  为奇素数,  $x$  为整数, 则数  $x^{q-1} + \cdots + 1$  的素因数  $p$  满足:  $p = q$  或者  $p \equiv 1 \pmod{q}$ .

例 4 设  $p$  为素数. 证明: 存在无穷多个正整数  $n$ , 使得  $p \mid 2^n - n$ . 证明如果  $p = 2$ , 那么取  $n$  为偶数, 就有  $p \mid 2^n - n$ , 命题成立.

设  $p > 2$ , 则由 Fermat 小定理知

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

因此, 对任意正整数  $k$ , 都有

$$2^{k(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$$

所以, 只需证明存在无穷多个正整数  $k$ , 使得

$$k(p-1) \equiv 1 \pmod{p} \quad (\text{这样, 令 } n = k(p-1), \text{ 就有 } p \mid 2^n - n).$$



而这只需  $k \equiv -1 \pmod{p}$ , 这样的  $k$  当然有无穷多个.  
所以, 命题成立.

说明用 Fermat 小定理处理数论中的一些存在性问题有时非常方便, 简洁.

例 5 由 Fermat 小定理知, 对任意奇素数  $p$ , 都有  $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .  
问: 是否存在合数  $n$ , 使得  $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$  成立?

解这样的合数  $n$  存在, 而且有无穷多个. 其中最小的满足条件的合数  $n = 341 = 11 \times 31$  (它是从两个不同奇素数作乘积去试算出来的).

事实上, 由于

$$2^{10} - 1 = 1023 = 341 \times 3, \quad (1.94)$$

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{341} \quad (1.95)$$

$$2^{340} \equiv 1^{34} \equiv 1 \pmod{341} \quad (1.96)$$

故

所以

故 341 符合要求.

进一步, 设  $a$  是一个符合要求的奇合数, 则  $2^a - 1$  也是一个奇合数 (这一点利用因式分解可知). 再设  $2^{a-1} - 1 = a \times q$ ,  $q$  为正奇数, 则

$$2^{2^a-1-1} - 1 = 2^{2(2^{a-1}-1)} - 1 \quad (1.97)$$

$$= 2^{2aq} - 1 \quad (1.98)$$

$$= (2^a)^{2q} - 1 \quad (1.99)$$

$$\equiv 1^{2q} - 1 \quad (1.100)$$

$$\equiv 0 \pmod{2^a - 1} \quad (1.101)$$

因此  $2^a - 1$  也是一个符合要求的数. 依此递推 (结合 341 符合要求), 可知有无穷多个满足条件的合数.

说明满足题中的合数  $n$  称为“伪素数”, 如果对任意  $(a, n) = 1$  都有  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$  成立, 那么合数  $n$  称为“绝对伪素数”. 请读者寻找“绝对伪素数”.

例 6 求所有的素数  $p$ , 使得  $\frac{2^{p-1}-1}{p}$  是一个完全平方数.

解设  $p$  是一个满足条件的素数, 则显然  $p$  是一个奇素数. 由 Fermat 小定理知

而

$$p \mid 2^{p-1} - 1$$

故

$$2^{p-1} - 1 = \left(2^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(2^{\frac{p-1}{2}} + 1\right),$$

$$p \mid 2^{\frac{p-1}{2}} - 1 \text{ 或 } p \mid 2^{\frac{p-1}{2}} + 1.$$

由于  $\left(2^{\frac{p-1}{2}} - 1, 2^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) = \left(2^{\frac{p-1}{2}} - 1, 2\right) = 1$ , 所以,  $p \mid 2^{\frac{p-1}{2}} - 1$  与  $p \mid 2^{\frac{p-1}{2}} + 1$  中恰有一个成立.

若  $p \mid 2^{\frac{p-1}{2}} - 1$ , 则由条件及  $\left(2^{\frac{p-1}{2}} - 1, 2^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) = 1$  可知存在正整数  $x$ , 使得

$$2^{\frac{p-1}{2}} + 1 = x^2,$$

此时

$$(x-1)(x+1) = 2^{\frac{p-1}{2}},$$

这表明  $x-1$  与  $x+1$  都是 2 的幂次, 而  $x$  为奇数, 故  $x-1$  与  $x+1$  是两个相邻的偶数, 所以, 只能是

$$x-1 = 2, x+1 = 4$$

故

$$x = 3 \tag{1.102}$$

$$p = 7 \tag{1.103}$$

此时

若  $p \mid 2^{\frac{p-1}{2}} + 1$ , 则同上知存在正整数  $x$ , 使得

$$2^{\frac{p-1}{2}} - 1 = x^2$$

当  $p > 3$  时, 导致

$$x^2 = 2^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv -1 \pmod{4}$$

矛盾, 故  $p = 3$ .

另一方面, 当  $p = 3$  和 7 时,  $\frac{2^{p-1}-1}{p}$  分别为 1 和 9, 都是完全平方数.

综上可知  $p = 3$  或 7.

### 1.2.4 奇数与偶数

奇数与偶数是对整数的最简单的分类, 初等数论经常需要对式子两边进行奇偶性分析, 导出矛盾或得出某个变量的特性, 奇偶分析法是一种重要的解题方法.

性质 1 奇数  $\neq$  偶数.

这个简单的事实对导出矛盾是十分重要的.

性质 2 奇数的因数都是奇数, 即偶数不能整除奇数.

注意, 反过来, 偶数是有奇因数的.

性质 3 奇数个奇数之和为奇数, 偶数个奇数之和为偶数. 任何整数加上一个偶数, 其奇偶性不变, 加上一个奇数, 其奇偶性改变; 任何整数乘以一个奇数, 其奇偶性不变, 乘以一个偶数都变为偶数.

这一节和下一节都是专题讨论, 一个是重要的方法, 另一个是内容丰富的特殊数. 它们在初中阶段是研究和学习的重点之一.

例 1 已知  $p$  为素数, 求所有的整数对  $(x, y)$ , 使得  $|x+y|+(x-y)^2 = p$ .

解注意到,  $x+y$  与  $x-y$  要么都是奇数, 要么都是偶数, 故  $|x+y|+(x-y)^2$  为偶数, 从而  $p=2$ . 这表明  $|x+y|+(x-y)^2=2$ .

由于  $|x+y|$  与  $(x-y)^2$  具有相同的奇偶性, 又  $(x-y)^2$  是一个完全平方数, 故  $(|x+y|, (x-y)^2) = (2, 0), (1, 1)$ . 分别求解, 可知  $(x, y) = (1, 1), (-1, -1), (0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)$ .

说明从奇偶性出发, 先确定式子中的素数应具有的一些特性, 然后再处理就容易了.

例 2 将  $1, 2, \dots, 49$  填入一个  $7 \times 7$  的表格 (每格一个数), 分别计算每行, 每列中的各数之和, 得到 14 个和数. 用  $A$  表示这 14 个和数中的奇数之和,  $B$  表示这 14 个和数中的偶数之和. 问: 是否存在一种填表方式, 使得  $A=B$ ?

解若有一种填表方式, 使得  $A=B$ , 则

$$A=B=\frac{1}{2}(A+B)=\frac{1}{2} \times 2 \times (1+2+\dots+49)=25 \times 49$$

这要求  $B$  为奇数, 但是  $B$  是若干个偶数之和, 不可能为奇数, 矛盾. 所以, 不存在使  $A=B$  成立的填表方式.

说明这里  $A+B$  是表格中所有行和之和 (它等于表格中所有数之和) 与所有列和之和 (也等于表格中所有数之和) 的和, 因此 (1) 成立. 这里蕴含了整体处理的思想.

例 3 在十进制表示下, 将某个 17 位数加上它的反序数. 证明: 所得的和数中必有一个数码为偶数.

又问: 将 17 改为一般的正整数  $n$ , 命题成立吗? 对怎样的  $n$  成立? 证明若存在一个 17 位数  $\overline{a_1 a_2 \cdots a_{17}}$ , 使得  $M = \overline{a_1 \cdots a_{17}} + \overline{a_{17} a_{16} \cdots a_1}$  的各数码都是奇数, 则考察个位数, 可知  $a_1 + a_{17}$  为奇数. 现在再考察最前面一位的求和, 若  $a_2 + a_{16}$  产生进位, 则由  $a_1 + a_{17}$  为奇数, 可知  $M$  中有一位为偶数, 矛盾. 故  $a_2 + a_{16}$  不产生进位. 依此可知  $\overline{a_3 a_4 \cdots a_{15}} + \overline{a_{15} a_{14} \cdots a_3}$  的各数码都是奇数. 同样的推导可知  $\overline{a_5 \cdots a_{13}} + \overline{a_{13} \cdots a_5}$  的各数码都是奇数,  $\cdots$ , 最后  $a_9 + a_9$  为奇数, 这是一个矛盾. 所以,  $M$  中必有一个数码为偶数.

对一般的正整数  $n$ , 同上讨论, 可知  $n \equiv 1(\text{mod } 4)$  时, 命题依然成立. 当  $n$  为偶数时, 设  $n = 2m$ , 则数  $\underbrace{4 \cdots 5}_{m \uparrow} \underbrace{5 \cdots 4}_{m \uparrow}$  与其反序数之和的各数码都是奇数; 当  $n \equiv 3(\text{mod } 4)$  时, 设  $n = 4k + 3$ , 则数  $\underbrace{6464 \cdots 645}_{k+1 \uparrow 64} \underbrace{45 \cdots 45}_{k \uparrow 45}$  与其反序数之和的各数码都是奇数.

所以, 当且仅当  $n \equiv 1(\text{mod } 4)$  时, 命题成立.

例 4 (1) 已知存在  $n$  个整数, 它们的和等于零, 而它们的积等于  $n$ . 证明:  $4 \mid n$ ;

(2) 设正整数  $n$  是 4 的倍数. 证明: 存在  $n$  个整数, 其和为零, 而积为  $n$ .

解 (1) 设整数  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  满足:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0 \\ a_1 a_2 \cdots a_n = n \end{cases}$$

若  $n$  为奇数, 则由 (2) 知  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  为奇数, 故  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  是奇数个 ( $n$  个) 奇数之和, 这与 (1) 矛盾. 所以,  $n$  为偶数.

现在若  $n$  不是 4 的倍数, 则由 (2) 知  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  中恰有一个数为偶数, 此时  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  是一个偶数加上奇数个 ( $n - 1$  个) 奇数, 其和为奇数, 同样与 (1) 矛盾. 所以,  $4 \mid n$ .

(2) 只需给出一个例子, 按  $n \equiv 0(\text{mod } 8)$  与  $n \equiv 4(\text{mod } 8)$  分别处理.

当  $n \equiv 0(\text{mod } 8)$  时, 设  $n = 8k$ , 此时存在  $n$  个整数

$$4k, 2, \underbrace{1, \cdots, 1}_{2k-2 \uparrow}, \underbrace{-1, -1, \cdots, -1}_{6k \uparrow}$$

满足和为零, 积为  $n$ .

当  $n \equiv 4(\text{mod } 8)$  时, 设  $n = 8k + 4$ , 则存在  $n$  个整数

$$4k + 2, -2, \underbrace{1, \cdots, 1}_{2k+1 \uparrow}, \underbrace{-1, \cdots, -1}_{6k+1 \uparrow}$$

满足和为零, 积为  $n$ .

所以, 命题成立.

例 5 已知 4 枚硬币中可能混有假币, 其中真币每枚重 10 克, 假币每枚重 9 克. 现有一台托盘秤, 它可以称出托盘中物体的总重量. 问: 至少需要称几次, 才能保证可以鉴别出每一枚硬币的真假?

解至少称 3 次可以做到.

事实上, 设 4 枚硬币分别是  $a, b, c, d$ . 分 3 次称出  $a + b + c, a + b + d, a + c + d$  的重量. 这 3 个重量之和等于  $3a + 2(b + c + d)$ , 因此, 如果这 3 个重量之和为奇数, 那么  $a$  为假币, 否则  $a$  为真币. 当  $a$  确定后, 解关于  $b, c, d$  的三元一次方程组可确定  $b, c, d$  的真假. 所以, 3 次是足够的.

下证: 只称两次不能保证测出每枚硬币的真假.

注意到, 如果有两枚硬币, 例如  $a, b$ , 它们在每次称量中要么同时出现, 要么同时不出现, 那么在  $a, b$  是一真一假时, 改变  $a, b$  的真假对称量结果没有影响, 故不能确定  $a, b$  的真假.

现在如果有一次称量中至多只出现两枚硬币, 例如  $a, b$ , 那么另一次称量中  $c, d$  只能恰有一个在托盘中出现 (否则对换  $c, d$  的奇偶性不影响结果), 此

时, 有一枚硬币在两次称量中都不出现, 它的真假改变不影响称量结果, 从而不能断定它的真假. 故每次称量托盘中都至少有 3 枚硬币, 这时必有两枚硬币同时在两次称量中出现, 亦导致矛盾.

综上可知, 至少需要称 3 次.

例 6 一个边长为 3 的正方体被分割为 27 个单位正方体, 将  $1, 2, \dots, 27$  随机地放入单位正方体, 每个单位正方体中一个数. 计算每一行 (横, 竖, 列) 上 3 个数之和, 得到 27 个和数. 问: 这 27 个和数中至多有多少个奇数?

解计算这 27 个和数的和  $S$ , 由于每个数恰在 3 行中出现, 故

$$S = 3 \times (1 + 2 + \dots + 27) = 3 \times 27 \times 14$$

即  $S$  为偶数, 所以, 这 27 个和数中奇数的个数为偶数.

若这 27 个和数中有 26 个奇数, 不妨设那个偶数为图 1 中的第一横行上的 3 个数之和, 即  $a_1 + a_2 + a_3$  为偶数, 而图 1 中其余的 5 个行和都是奇数. 这时, 分别按横行和竖行求图 1 中的各数之和, 得

$a_1$	$a_2$	$a_3$
$a_4$	$a_5$	$a_6$
$a_7$	$a_8$	$a_9$

图 1

$$(a_1 + a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6) + (a_7 + a_8 + a_9) \quad (1.104)$$

$$= (a_1 + a_4 + a_7) + (a_2 + a_5 + a_8) + (a_3 + a_6 + a_9) \quad (1.105)$$

但此式左边为两奇一偶, 右边为 3 个奇数之和, 导出左边为偶数, 而右边为奇数, 矛盾.

所以, 这 27 个和数中至多有 24 个数为奇数.

下面的例子 (如图 2 所示) 表明存在一种填数方式, 使得 27 个和数中可以有 24 个为奇数. 图 2 各表中的 0 表示偶数, 1 表示奇数, 从左到右依次为最上层, 中层和最下层的单位正方体.

0	1	0
1	1	1
0	1	0

1	1	1
1	0	0
1	0	0

0	1	1
1	0	0
0	0	1

图 2

所以, 这 27 个和数中最多有 24 个为奇数.

### 1.2.5 完全平方数

数学竞赛中的许多问题涉及到完全平方数, 需要用到完全平方数的一些特性.

性质 1 完全平方数  $\equiv 0$  或  $1 \pmod{4}$ , 奇数的平方  $\equiv 1 \pmod{8}$ .

性质 2 相邻两个完全平方数之间没有一个正整数是完全平方数. (这个性质经常用来证明某一类数不是完全平方数)

性质 3 若两个互素的正整数之积是完全平方数, 则这两个数都是完全平方数.

注意, ”两个完全平方数之积是完全平方数”这个结论是显然的. 这里的性质 2 与性质 3 对一般的  $n$  次方数都成立, 而性质 1 只列出了完全平方数模 4 和模 8 的性质, 模其余的数亦有一些相应的性质. 例如: 完全平方数  $\equiv 0$  或  $1(\bmod 3)$ , 完全平方数的末尾数字只能是 0, 1, 4, 5, 6, 9 等等.

例 1 设素数从小到大依次排列为  $p_1, p_2, \dots$ . 证明: 对任意大于 1 的正整数  $n$ , 数  $p_1 p_2 \cdots p_n - 1$  和  $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$  都不是完全平方数.

证明注意到,  $n \geq 2$  时,  $3 \mid p_1 p_2 \cdots p_n$ , 故

$$p_1 p_2 \cdots p_n - 1 \equiv 2(\bmod 3)$$

所以,  $p_1 p_2 \cdots p_n - 1$  不是完全平方数.

又  $n \geq 2$  时,  $p_2 \cdots p_n$  为奇数, 设  $p_2 \cdots p_n = 2k + 1$ , 就有

$$p_1 p_2 \cdots p_n + 1 = 2(2k + 1) + 1 = 4k + 3 \equiv 3(\bmod 4)$$

所以,  $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$  也不是完全平方数.

说明在处理与完全平方数有关的问题时, 经常要用到同余的方法, 其中取恰当的”参照物”(即模哪个数)是非常关键的.

例 2 已知正整数  $a, b$  满足关系式

$$2a^2 + a = 3b^2 + b$$

证明:  $a - b$  和  $2a + 2b + 1$  都是完全平方数.

证明由条件, 知

$$b^2 = 2a^2 + a - (2b^2 + b) = (a - b)(2a + 2b + 1)$$

上式左边大于零, 右边中  $2a + 2b + 1$  大于零, 故  $a - b$  大于零.

由 (1) 知, 要证  $a - b$  与  $2a + 2b + 1$  都是完全平方数, 只需证明

$$(a - b, 2a + 2b + 1) = 1$$

设  $(a - b, 2a + 2b + 1) = d$ , 则由 (1) 知  $d^2 \mid b^2$ , 故  $d \mid b$ . 进而结合  $d \mid a - b$ , 知  $d \mid a$ , 故  $d \mid 2(a + b)$ . 又  $d \mid 2a + 2b + 1$ , 所以,  $d \mid 1$ , 进而  $d = 1$ .

命题获证.

说明这里我们并没有求出 (1) 中  $a, b$  的值 (这是比较困难的), 但是我们对 (1) 作恰当变形, 使一边为完全平方数, 另一边是两个式子之积后, 问题解决起来就容易了.

例 3 设正整数  $x, y, z$  满足  $(x, y, z) = 1$ , 并且  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ . 证明:  $x + y, x - z, y - z$  都是完全平方数.

证明设  $(x, y) = m$ , 并设  $x = mn, y = ml$ , 这里  $m, l, n$  都是正整数, 且  $(l, n) = 1$ . 从而, 由条件可知

$$(l + n)z = mln$$

利用  $(x, y, z) = 1$ , 知  $(m, z) = 1$ , 于是, 由 (1) 知  $z \mid ln$ . 而  $(l, n) = 1$ , 故  $(l, l + n) = 1, (n, l + n) = 1$ , 因此, 由 (1) 知  $l \mid z, n \mid z$ , 再由  $(l, n) = 1$ , 知  $ln \mid z$ . 所以,  $z = ln$ , 进而  $m = l + n$ . 这样, 我们有

$$\begin{aligned} x + y &= m(l + n) = (l + n)^2 \\ x - z &= mn - ln = n(m - l) = n^2 \\ y - z &= ml - ln = l(m - n) = l^2 \end{aligned}$$

命题获证.

说明另一种处理方式基于下面的变形:

$$\frac{x + y}{xy} = \frac{1}{z} \Rightarrow \frac{x + y}{x} = \frac{y}{z} \quad (1.106)$$

$$\Rightarrow \frac{x + y}{x} = \frac{x}{x - z} \quad (1.107)$$

$$\Rightarrow (x + y)(x - z) = x^2 \quad (1.108)$$

然后对最后一式利用上例的方法可证  $x + y$  与  $x - z$  都是完全平方数, 这种处理或许更能体现问题的本质.

例 4 求所有的素数  $p$ , 使得  $p^3 - 4p + 9$  是一个完全平方数.

解设  $p^3 - 4p + 9 = x^2$ ,  $x$  为非负整数, 则  $p \mid x^2 - 9$ , 即  $p \mid (x - 3)(x + 3)$ , 结合  $p$  为素数, 可设  $x = kp \pm 3, k$  为非负整数. 于是,

$$p^3 - 4p = x^2 - 9 = k^2 p^2 \pm 6kp$$

得  $p^2 - 4 = k^2 p \pm 6k$ , 这表明:  $p \mid 6k \pm 4$ .

当  $p > 2$  时,  $p$  为奇素数, 可知  $p \mid 3k \pm 2$ , 故总有  $p \leq 3k + 2$ , 这表明:  $\frac{1}{3}(p^2 - 2p - 9) \leq pk - 3 \leq x$ .

若  $x \leq \frac{p^2}{4}$ , 则  $\frac{1}{3}(p^2 - 2p - 9) \leq \frac{p^2}{4}$ , 得  $p \leq 8 + \frac{36}{p}$ , 可知  $p \leq 11$ ; 若  $x > \frac{p^2}{4}$ , 则  $p^3 - 4p + 9 = x^2 > \frac{p^4}{16}$ , 得  $p < 16 - \frac{16(4p-9)}{p^3}$ , 可知  $p \leq 13$ .



综上可知,  $p \leq 13$ , 直接枚举, 得  $(p, x) = (2, 3), (7, 18), (11, 36)$ . 求得  $p = 2, 7$  或  $11$ .

说明此例所处理的等式两边不是齐次的, 想方设法得到素数  $p$  的一个范围后去枚举是常用的方法, 这时一些数论知识的运用结合不等式估计往往是有效的.

例 5 已知  $n$  为正整数, 且  $2n+1$  与  $3n+1$  都是完全平方数. 证明:  $40 \mid n$ . 证明设  $2n+1 = x^2, 3n+1 = y^2$ , 其中  $x, y$  都是正整数. 由性质 1, 知  $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$  (因为  $x^2$  为奇数, 故  $x$  为奇数), 从而

$$n \equiv 0 \pmod{4}$$

进而  $3n+1$  为奇数, 故  
即

$$y^2 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$3n+1 \equiv 1 \pmod{8}$$

于是

$$n \equiv 0 \pmod{8}$$

另一方面, 对任意整数  $a$ , 有

$$a \equiv 0, \pm 1, \pm 2 \pmod{5}$$

$$a^2 \equiv 0, 1 \text{ 或 } 4 \pmod{5}.$$

故

由条件知  $x^2 + y^2 = 5n + 2 \equiv 2 \pmod{5}$ ,  
结合前面推出的结论, 可知

故

从而

$$x^2 \equiv y^2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2n+1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$n \equiv 0 \pmod{5}$$

利用  $(5, 8) = 1$ , 可知  $40 \mid n$ .

说明最小的使得  $2n+1$  与  $3n+1$  都是完全平方数的正整数  $n = 40$ , 请读者找到下一个符合要求的正整数  $n$ .

例 6 若  $a, b$  是使得  $ab+1$  为完全平方数的正整数, 则记  $a \sim b$ . 证明: 若  $a \sim b$ , 则存在正整数  $c$ , 使得  $a \sim c, b \sim c$ .

证明由  $a \sim b$ , 可设  $ab+1 = x^2$ , 这里  $x$  为正整数, 下一个与  $a, b, x$  有关的完全平方数是  $(a+x)^2$  或  $(b+x)^2$ , 于是, 我们取  $c = 2x + a + b$ , 则

$$ac + 1 = a(2x + a + b) + 1 \quad (1.109)$$

$$= 2ax + a^2 + ab + 1 \quad (1.110)$$

$$= 2ax + a^2 + x^2 = (x + a)^2 \quad (1.111)$$

$$bc + 1 = (x + b)^2 \quad (1.112)$$

命题获证.

说明此题对代数式变形的能力要求较高. 在寻找完全平方数时, 往往需要构造完全平方式, 因为当一个整式中的字母都取整数时, 这个整式的平方显然是完全平方数. 当然, 反过来并不需要这样的条件.

题中的  $c$  还可以这样来找: 设  $ac + 1 = y^2$ , 则  $a(c - b) = y^2 - x^2 = (y - x)(y + x)$ , 取  $y - x = a$  (此时  $c - b = y + x$ ) 可符合此式, 依此知应取  $c = b + y + x = 2x + a + b$ .

例 7 求所有的正整数数对  $(a, b)$ , 使得

$$a^3 + 6ab + 1, b^3 + 6ab + 1$$

都是完全立方数.

解不妨设  $a \leq b$ , 则

$$b^3 < b^3 + 6ab + 1 \leq b^3 + 6b^2 + 1 < (b + 2)^3$$

由  $b^3 + 6ab + 1$  是一个完全立方数, 可知

$$b^3 + 6ab + 1 = (b + 1)^3$$

即有

$$6ab = 3b^2 + 3b \quad (1.113)$$

$$b = 2a - 1 \quad (1.114)$$

从而

$$a^3 + 6ab + 1 = a^3 + 12a^2 - 6a + 1$$

注意到  $(a+1)^3 \leq a^3 + 12a^2 - 6a + 1 < (a+4)^3$ ,  
因此, 由  $a^3 + 12a^2 - 6a + 1$  是完全立方数, 可知只能是

$$a^3 + 12a^2 - 6a + 1 = (a+1)^3, (a+2)^3, (a+3)^3.$$

分别求解, 可得只能是  $a = 1$ .

所以, 满足条件的数对  $(a, b) = (1, 1)$ .

说明先确定某个  $n$  次方数夹在哪两个  $n$  次方数之间, 然后确定该  $n$  次方数的取值. 这是用不等式估计处理问题的常见方法.

例 8 求最小的正整数  $n$ , 使得存在整数  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 满足

$$x_1^4 + x_2^4 + \dots + x_n^4 = 1599$$

解由性质 1, 对任意整数  $a$ , 可知

$$a^2 \equiv 0 \pmod{4} \text{ 或 } a^2 \equiv 1 \pmod{8},$$

由此可得

$$a^4 \equiv 0 \text{ 或 } 1 \pmod{16}.$$

利用这个结论, 可知, 若  $n < 15$ , 设

$$x_1^4 + x_2^4 + \dots + x_n^4 \equiv m \pmod{16}$$

则

$$m \leq n < 15$$

而

$$1599 \equiv 15 \pmod{16}$$

矛盾, 所以

$$n \geq 15$$

另外, 当  $n = 15$  时, 要求

$$x_1^4 \equiv x_2^4 \equiv \dots \equiv x_n^4 \equiv 1 \pmod{16}$$

即  $x_1, x_2, \dots, x_n$  都为奇数, 这为我们找到合适的数指明了方向. 事实上, 在  $x_1, x_2, \dots, x_{15}$  中, 1 个数取为 5, 12 个取为 3, 另外两个取为 1, 就有

$$x_1^4 + x_2^4 + \dots + x_{15}^4 \quad (1.115)$$

$$= 5^4 + 12 \times 3^4 + 2 \quad (1.116)$$

$$= 625 + 972 + 2 \quad (1.117)$$

$$= 1599. \quad (1.118)$$

所以,  $n$  的最小值为 15.

## 习题 2

1 设  $p, q$  都是素数, 且  $7p+q, pq+11$  也都为素数, 求  $(p^2 + q^p)(q^2 + p^q)$  的值.

2 设  $p_1 < p_2 < p_3 < p_4 < p_5$  是 5 个素数, 且  $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5$  成等差数列. 求  $p_5$  的最小值.

3 对每个正整数  $n$ , 用  $S(n)$  表示  $n$  在十进制表示下各数码之和. 证明: 对任意正整数  $m$ , 存在正整数  $n$ , 使得  $S(n) = mS(3n)$ .

4 求最大的正整数  $k$ , 使得存在正整数  $n$ , 满足  $2^k \mid 3^n + 1$ .

5 设  $n$  为正整数. 证明: 存在十进制表示中只出现数码 0 和 1 的正整数  $m$ , 使得  $n \mid m$ .

6 设  $n$  是一个正奇数. 证明: 存在一个十进制表示中每个数码都是奇数的正整数  $m$ , 使得  $n \mid m$ .

7 证明: 对每个正整数  $n$ , 数  $19 \times 8^n + 17$  都是合数.

8 Fibonacci 数列  $\{F_n\}$  定义如下:  $F_1 = F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, n = 1, 2, \dots$

(1) 证明: 该数列任意连续 10 项之和是 11 的倍数;

(2) 求最小的正整数  $k$ , 使得该数列中任意连续  $k$  项之和是 12 的倍数.

9 设整数  $a, b$  满足:  $21 \mid a^2 + b^2$ . 证明:  $441 \mid a^2 + b^2$ .

10 正整数  $a, b, c$  满足:  $c^2 = a^2 + b^2 + ab$ . 证明:  $c$  有一个大于 5 的素因子.

11 将整数  $1, 2, \dots, 9$  填入一个  $3 \times 3$  的表格, 每格一个数, 使得每行, 每列及每条对角线上各数之和都是 9 的倍数.

(1) 证明: 该表格中正当中那个方格内的数是 3 的倍数;

(2) 给出一个正当中方格内所填数为 6 的满足条件的放置方法.

12 下面的算式给出了一种判别一个数是否为 19 的倍数的方法: 每次去

掉该数的最后一位数字, 将其两倍与剩下的数相加, 依此类推, 直到数变为 20 以内的数为止, 若最后一个数为 19, 则最初的那个数为 19 的倍数, 否则原数不是 19 的倍数.

$$\begin{array}{r}
 6 \quad 7 \quad 9 \quad 4 \quad \cancel{4} \\
 \phantom{6 \quad 7 \quad 9 \quad} 8 \\
 \hline
 6 \quad 8 \quad 0 \quad \cancel{2} \\
 \phantom{6 \quad 8 \quad} 4 \\
 \hline
 6 \quad 8 \quad \cancel{4} \\
 \phantom{6 \quad} 8 \\
 \hline
 7 \quad \cancel{8} \\
 1 \quad 2 \\
 \hline
 1 \quad 9 \\
 \phantom{1 \quad} 4 \quad 4 \quad 9 \quad 7 \quad \cancel{8} \\
 \phantom{\phantom{1 \quad}} \phantom{4 \quad} 1 \quad 2 \\
 \hline
 4 \quad 5 \quad 0 \quad \cancel{8} \\
 \phantom{4 \quad} 1 \quad 8 \\
 \hline
 4 \quad 6 \quad \cancel{8} \\
 1 \quad 6 \\
 \hline
 6 \quad \cancel{2} \\
 4 \\
 \hline
 1 \quad 0
 \end{array}$$

例如上面判定了 67944 为 19 的倍数, 而 44976 不是 19 的倍数.

- (1) 试证明: 上面的判别方法是正确的;
- (2) 请给出判别一个数是否为 29 的倍数的类似方法.

13 能否将  $2010 \times 2010$  的方格表的每个方格染成黑色或白色, 使得关于表格的中心对称的方格颜色不同, 且每行, 每列中黑格数与白格数都各占一半?

14 标号为  $1, 2, \dots, 100$  的火柴盒中有一些火柴, 如果每次提问允许问其中任意 15 盒中所有火柴数之和的奇偶性. 那么要确定 1 号盒中火柴数的奇偶性, 至少需要提问几次?

15 求所有的正整数  $n$ , 使得可以在一个  $n \times n$  的方格表的每个方格内写上  $+1$  或  $-1$ , 满足: 每个标号为  $+1$  的方格的相邻格中恰有一个标号是  $-1$ , 而每个标号为  $-1$  的方格的相邻格中恰有一个标号是  $+1$ .

16 设  $a_1, a_2, \dots, a_{100}$  是  $1, 2, \dots, 100$  的一个排列, 令  $b_i = a_1 + a_2 + \dots + a_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, 100$ , 记  $r_i$  为  $b_i$  除以 100 所得的余数. 证明:  $r_1, r_2, \dots, r_{100}$  中至少有 11 个不同的数.

17 求所有满足下述条件的正整数  $a$  的个数: 存在非负整数  $x_0, x_1, x_2, \dots$ ,

$x_{2001}$ , 使得  $a^{x_0} = a^{x_1} + a^{x_2} + \cdots + a^{x_{2001}}$ .

18 设  $m, n$  为正整数,  $m > 1$ . 证明:  $m(2^m - 1) \mid n$  的充要条件是  $(2^m - 1)^2 \mid 2^n - 1$ .

19 设正整数  $a, b$  互素,  $p$  为奇素数. 证明:  $\left(a + b, \frac{a^p + b^p}{a+b}\right) = 1$  或  $p$ .

20 求最小的正整数  $a$ , 使得对任意整数  $x$ , 都有  $65 \mid (5x^{13} + 13x^5 + 9ax)$ .

21 是否存在整数  $a, b, c$ , 使得方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ 和 } (a+1)x^2 + (b+1)x + (c+1) = 0$$

都有两个整数根?

22 求所有的正整数组  $(x, y, z, w)$ , 使得  $x! + y! + z! = w!$ .

23 求满足下述条件的整数数组  $(a, b)$  的组数:  $0 \leq a, b \leq 36$ , 且  $a^2 + b^2 = 0 \pmod{37}$ .

24 设  $m, n$  为正整数, 且  $mn \mid m^2 + n^2 + m$ . 证明:  $m$  是一个完全平方数.

25 证明: 若正整数  $n$  可以表示为三个正整数的平方和的形式, 则  $n^2$  也可以表示为三个正整数的平方和的形式.

26 求所有的正整数  $n$ , 使得  $n$  的三次方根等于  $n$  去掉最后三位数字后得到的正整数.

27 证明: 存在无穷多个整数  $n$ , 使得数  $n, n+1, n+2$  都可以表示为两个整数 (不必不同) 的平方和. 例如:  $0 = 0^2 + 0^2, 1 = 0^2 + 1^2, 2 = 1^2 + 1^2$ , 故  $n = 0$  即为一个满足条件的整数.

28 求最小的正整数  $n$ , 使得在十进制表示下  $n^3$  的末三位数字是 888.

29 设正整数  $n > 1$ , 证明: 数  $2^n - 1$  既不是完全平方数, 也不是完全立方数.

30 设  $a, b, c$  为正整数, 且  $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$  为整数. 证明:  $a, b, c$  都是完全平方数.

31 已知正整数  $c$  是一个奇合数. 证明: 存在正整数  $a$ , 使得  $a \leq \frac{c}{3} - 1$ , 且  $(2a - 1)^2 + 8c$  是一个完全平方数.

32 设整数  $a, b$  满足: 对任意正整数  $n$ , 数  $2^n \cdot a + b$  都是完全平方数. 证明:  $a = 0$ .

33 求不能表示为 42 的正倍数与一个合数之和的最大正整数.

34 求一个正整数  $n$ , 使得数  $n, n+1, \cdots, n+20$  中每个数都与 30030 不互素.

35 是否存在连续 13 个正整数, 其中每个数都是 2, 3, 5, 7, 11 中的某个数的倍数? 连续 14 个呢?

- 36 设  $p$  为素数,  $a, n$  都是正整数, 且  $2^p + 3^p = a^n$ . 证明:  $n = 1$ .
- 37 圆周上排列着 2000 个点, 在某个点上标上数 1, 按顺时针方向数两个点, 在其上标数 2, 再数 3 个点标数 3, 依此继续, 标出数  $1, 2, \dots, 2000$ . 这样, 有些点上没有标数, 有些点上所标的数不止一个. 问: 被标上 2000 的那个点上所标的数中最小的是多少?
- 38 圆周上有 800 个点, 依顺时针方向标号为  $1, 2, \dots, 800$ , 它们将圆周分为 800 个间隙. 现在选定某个点, 将其染上红色, 然后进行下述操作: 如果第  $k$  号点染成了红色, 那么依顺时针方向转过  $k$  个间隙, 将所到达的点染成红色. 问: 依此规则, 圆周上最多有多少个点被染成了红色? 证明你的结论.
- 39 设  $m$  为正整数, 且  $m \equiv 2 \pmod{4}$ . 证明: 至多存在一对正整数  $(a, b)$ , 使得  $m = ab$ , 且  $0 < a - b < \sqrt{5 + 4\sqrt{4m + 1}}$ .
- 40 设  $n$  是一个大于 10 的正整数, 且  $n$  的每个数码都为 1, 3, 7 或 9. 证明:  $n$  有一个大于 10 的素因子.
- 41 求所有的素数对  $(p, q)$ , 使得  $pq \mid p^p + q^q + 1$ .
- 42 设  $f(n) = 1 + n + n^2 + \dots + n^{2010}$ . 证明: 对任意整数  $m$ , 若  $2 \leq m \leq 2010$ , 则不存在正整数  $n$ , 使得  $m \mid f(n)$ .
- 43 是否存在整数  $x, y$ , 使得  $x^{2012} - 2010 = 4y^{2011} + 4y^{2010} + 2011y$ ?