TOUMÖLA

Corpus de Plantes Médicinales de Guinée

Projet:	Toumöla – Application mobile IA pour les plantes médicinales
Organisation:	IndabaX Guinée / IRDPMAG
Événement:	Deep Learning Indaba 2026 – RIAD Session, Lagos
Type:	Dataset synthétique pour système RAG
Nombre de plantes:	10
Date:	10/04/2026
Licence:	CC BY 4.0

Ce corpus présente des fiches médicinales détaillées pour des plantes utilisées traditionnellement par les guérisseurs et herboristes de Guinée et d'Afrique de l'Ouest. Il est conçu pour alimenter un système RAG (Retrieval-Augmented Generation) intégré à l'application Toumöla, permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations médicinales fiables sur les plantes locales.

Table des matières

1. Morinda lucida (Koubi / Banbaran) – Rubiaceae
2. Azadirachta indica (Neem / Neem) – Meliaceae
3. Hibiscus sabdariffa (Bissap / Dabileni) – Malvaceae
4. Combretum micranthum (Kinkeliba / Kinkiliba) – Combretaceae
5. Carica papaya (Papaye / Papaye) – Caricaceae
6. Ocimum gratissimum (Doumou-poussi / Doumou) – Lamiaceae
7. Khaya senegalensis (Cailedrat / Dialla) – Meliaceae
8. Zingiber officinale (Higuide / Niamou) – Zingiberaceae
9. Senna alata (Kassia / Bogolobali) – Fabaceae
10. Annona muricata (Corossol / Dankali) – Annonaceae

■ Morinda lucida

Langue	Nom local
Peuhl	Koubi
Malinke	Banbaran
Soussou	Gbèlè
Francais	Arbre soufré

Description botanique:
Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 10 m, à feuilles opposées elliptiques, fleurs blanches tubulaires en capitules, fruits charnus jaunes à maturité. Écorce grise à brun clair.

Pays: Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Sénégal, Sierra Leone, Liberia
Zones: Forêt dense humide, Savane arborée, Galerie forestière
Statut UICN: Préoccupation mineure (UICN)

Maladie 1: Paludisme

Synonymes	Malaria | Fièvre des marais | Fièvre palustre | Kono (Peuhl) | Sumaya (Malinké)
Symptômes	Fièvre élevée (38–40°C) · Frissons · Céphalées · Douleurs musculaires · Vomissements · Transpiration abondante · F
Parties utilisées	Feuilles, Écorce de tige, Racines

Modes de préparation:
• **Décoction:** Faire bouillir 50 g de feuilles fraîches ou 30 g d'écorce séchée dans 1 litre d'eau pendant 20 minutes. Filtrer et laisser refroidir.
• **Macération:** Faire tremper 40 g d'écorce concassée dans 500 ml d'eau froide pendant 12 heures. Filtrer et boire.

Adulte:	250 ml, 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours
Enfant:	100 ml, 2 fois par jour (enfants > 5 ans) pendant 5 jours
Durée:	5 à 7 jours

Efficacité: Modéré à élevé | **Principes actifs:** Lucidin, Damnacanthal, Alizarine, Morindone, Anthraquinones
■■ *Ne pas administrer aux femmes enceintes (1er trimestre)*
■■ *Éviter en cas d'insuffisance rénale*
■■ *Surveiller la glycémie chez les diabétiques*
■■ *Consulter un médecin en cas de paludisme grave*
■ *Contre-indication: Grossesse (1er trimestre)*
■ *Contre-indication: Insuffisance rénale sévère*
■ *Contre-indication: Hypersensibilité connue aux Rubiaceae*

Maladie 2: Diabète de type 2

Synonymes	Hyperglycémie | Diabète sucré | Kololi (Peuhl)
Symptômes	Polyurie · Polydipsie · Polyphagie · Fatigue · Vision floue · Cicatrisation lente
Parties utilisées	Feuilles, Racines

Modes de préparation:
• **Décoction de feuilles:** 30 g de feuilles fraîches dans 500 ml d'eau, bouillir 15 min, filtrer, boire froid.

Adulte:	250 ml matin à jeun, pendant 30 jours

Enfant:	Non recommandé < 12 ans
Durée:	30 jours renouvelable après bilan glycémique

Efficacité: Modéré | **Principes actifs:** Polyphénols, Flavonoïdes, Alcaloïdes

■■ *Surveiller glycémie régulièrement*

■■ *Ne pas arrêter traitement antidiabétique médical*

■■ *Associer à un régime adapté*

■ *Contre-indication: Hypoglycémie*

■ *Contre-indication: Grossesse*

Autres propriétés: Antibacterien, Antiparasitaire, Antipyretique, Antioxydant, Hepatoprotecteur

Usages non médicinaux: Bois d'œuvre léger, Colorant naturel (racines)

■ Azadirachta indica

Langue	Nom local
Peuhl	Neem
Malinke	Neem
Soussou	Neem
Francais	Margousier / Neem

Description botanique:
Grand arbre à croissance rapide (15–20 m), à feuilles composées pennées, fleurs blanches parfumées en panicules axillaires, fruits drupes jaunes-verts. Répandu comme arbre d'ombrage.

Pays: Guinée, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana
Zones: Savane sèche, Zone sahélienne, Zone soudanienne, Zones urbaines (haie)
Statut UICN: Non menacé

Maladie 1: Paludisme

Synonymes	Malaria | Fièvre palustre | Sumaya (Malinké) | Kono (Peuhl)
Symptômes	Fièvre · Frissons · Céphalées · Vomissements · Douleurs articulaires
Parties utilisées	Feuilles, Écorce, Graines (huile)

Modes de préparation:
• **Décoction de feuilles:** Bouillir 60 g de feuilles fraîches dans 1 litre d'eau pendant 30 minutes. Filtrer, refroidir.
• **Bain de vapeur:** Faire bouillir les feuilles, inhaler la vapeur et se laver avec le liquide tiède pour soulager la fièvre.

Adulte:	200 ml, 3 fois/jour pendant 7 jours
Enfant:	100 ml, 2 fois/jour (> 5 ans)
Durée:	7 jours

Efficacité: Modéré | **Principes actifs:** Azadirachtine, Nimbinoïdes, Géduninoïdes, Mélantriol
■■ *Ne pas administrer aux jeunes enfants < 5 ans*
■■ *Toxicité potentielle à haute dose*
■ *Contre-indication: Grossesse*
■ *Contre-indication: Allaitement*
■ *Contre-indication: Enfants < 3 ans*
■ *Contre-indication: Insuffisance hépatique*

Maladie 2: Infections cutanées

Synonymes	Gale | Teigne | Dermatite | Plaies infectées
Symptômes	Démangeaisons · Rougeurs · Lésions cutanées · Pustules · Pellicules
Parties utilisées	Feuilles, Huile de graines

Modes de préparation:
• **Application topique (pommade):** Piler les feuilles fraîches, extraire le jus et appliquer directement sur les lésions 2 fois/jour.
• **Bain médicinal:** Faire bouillir 200 g de feuilles dans 5 litres d'eau, laisser tiédir, utiliser pour se laver.

Adulte:	Application 2 fois/jour jusqu'à guérison (7–14 jours)

Enfant:	Application douce 1 fois/jour
Durée:	7 à 14 jours

Efficacité: Élevé | **Principes actifs:** Nimbinoïdes, Azadirachtine, Quercétine
■■ *Éviter le contact avec les yeux*
■■ *Tester sur petite zone avant application large*
■ *Contre-indication: Allergie connue au Neem*

Maladie 3: Hypertension artérielle

Synonymes	Tension élevée | HTA | Pression haute
Symptômes	Céphalées · Vertiges · Bourdonnements d'oreille · Epistaxis · Palpitations
Parties utilisées	Feuilles

Modes de préparation:
• **Infusion:** Verser 1 litre d'eau bouillante sur 20 feuilles fraîches. Infuser 10 min. Filtrer.

Adulte:	2 tasses par jour, matin et soir
Enfant:	Non recommandé
Durée:	30 jours avec surveillance tensionnelle

Efficacité: Faible à modéré | **Principes actifs:** Flavonoïdes, Quercétine, Catéchines
■■ *Surveiller la tension artérielle*
■■ *Ne pas remplacer le traitement médical*
■ *Contre-indication: Hypotension*
■ *Contre-indication: Grossesse*

Autres propriétés: Insecticide naturel, Antifongique, Antibacterien, Antiulcereux, Immunostimulant
Usages non médicinaux: Pesticide agricole naturel, Bois de chauffe, Ombrage, Bâtons de dentifrice

■ Hibiscus sabdariffa

Langue	Nom local
Peuhl	Bissap
Malinke	Dabileni
Soussou	Wonjoï
Francais	Oseille de Guinée / Bissap / Karkadé

Description botanique:
Plante herbacée annuelle (1–3 m), à tige rouge violacée, feuilles alternes palmatifides, fleurs jaune pâle à centre rouge, calices charnus rouge vif utilisés en boisson et médecine.

Pays: Guinée, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Niger
Zones: Jardin potager, Champ villageois, Zone tropicale humide, Zone semi-aride
Statut UICN: Non menacé (cultivé)

Maladie 1: Hypertension artérielle

Synonymes	HTA | Pression artérielle élevée | Tension haute | Folo bana (Malinké)
Symptômes	Céphalées occipitales · Vertiges · Palpitations · Bouffées de chaleur · Fatigue · Vision trouble
Parties utilisées	Calices (fleurs séchées)

Modes de préparation:
• **Infusion chaude:** Infuser 10 g de calices séchés dans 500 ml d'eau bouillante pendant 15 minutes. Sucrer légèrement si nécessaire.
• **Macération froide (Bissap froid):** Tremper 20 g de calices dans 1 litre d'eau froide pendant 4 à 8 heures. Filtrer, boire.

Adulte:	2–3 verres (250 ml) par jour, de préférence sans sucre
Enfant:	1 verre/jour dilué (> 5 ans)
Durée:	30 jours continus avec contrôle tensionnel

Efficacité: Élevé (validé cliniquement) | **Principes actifs:** Anthocyanines, Acide hibiscique, Acide protocatéchique, Quercétine, Polyphénols
■■ *Surveiller tension artérielle*
■■ *Interaction possible avec médicaments antihypertenseurs*
■■ *Éviter en cas de grossesse (propriétés emménagogues)*
■ *Contre-indication: Grossesse*
■ *Contre-indication: Hypotension*
■ *Contre-indication: Insuffisance rénale avancée*

Maladie 2: Anémie ferriprive

Synonymes	Manque de sang | Pauvreté du sang
Symptômes	Pâleur · Fatigue chronique · Essoufflement · Palpitations · Vertiges · Ongles cassants
Parties utilisées	Feuilles, Calices

Modes de préparation:
• **Sauce de feuilles:** Cuire les feuilles fraîches comme légume, consommer régulièrement avec les repas.
• **Jus de calices enrichi:** Préparer le jus de bissap et ajouter du jus de citron pour améliorer l'absorption du fer.

Adulte:	Consommation quotidienne des feuilles et 2 verres de bissap/jour
Enfant:	Intégré aux repas quotidiens
Durée:	60 jours avec bilan sanguin

Efficacité: Modéré (apport en fer non-héminique) | **Principes actifs:** Fer (3.4 mg/100g feuilles fraîches), Vitamine C (acide ascorbique), Acide folique

■■ *Associer à une source de vitamine C pour améliorer l'absorption*

■■ *Bilan sanguin régulier*

■ *Contre-indication: Hémochromatose*

Maladie 3: Infections urinaires

Synonymes	Cystite | Brûlures urinaires | UTI
Symptômes	Brûlures mictionnelles · Pollakiurie · Urines troubles · Douleurs sus-pubiennes · Fièvre légère
Parties utilisées	Calices

Modes de préparation:

• **Tisane concentrée:** Infuser 15 g de calices séchés dans 500 ml d'eau bouillante pendant 20 min. Boire tiède.

Adulte:	3 tasses/jour pendant 7 jours
Enfant:	1–2 tasses/jour (> 8 ans)
Durée:	7 jours

Efficacité: Modéré | **Principes actifs:** Acide hibiscique, Anthocyanines, Acide citrique

■■ *Consulter si fièvre élevée ou sang dans les urines*

■ *Contre-indication: Grossesse*

■ *Contre-indication: Insuffisance rénale*

Autres propriétés: Antioxydant, Anti inflammatoire, Hepatoprotecteur, Diuretique, Emmenagogue

Usages non médicinaux: Boisson traditionnelle (Bissap), Colorant alimentaire naturel, Condiment (feuilles), Confiture (calices)

■ Combretum micranthum

Langue	Nom local
Peuhl	Kinkeliba
Malinke	Kinkiliba
Soussou	Kinkeliba
Francais	Kinkeliba

Description botanique:
Arbrisseau ou liane sarmenteuse (2–6 m), à feuilles elliptiques opposées coriaces, fleurs blanc-crème en épis terminaux, fruits à 4 ailes papyracées rougeâtres. Répandu en zone soudano-sahélienne.

Pays: Guinée, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée-Bissau, Ghana
Zones: Savane soudanienne, Savane sahélienne, Forêt claire
Statut UICN: Préoccupation mineure

Maladie 1: Paludisme

Synonymes	Malaria | Sumaya | Kono
Symptômes	Fièvre · Frissons · Sueurs · Céphalées · Myalgies
Parties utilisées	Feuilles

Modes de préparation:
• **Décoction:** Faire bouillir une poignée (40 g) de feuilles séchées dans 1 litre d'eau pendant 20 min. Filtrer. Boire tiède.

Adulte:	3 tasses de 200 ml par jour, à jeun le matin et entre les repas
Enfant:	1–2 tasses/jour (> 5 ans)
Durée:	7 jours

Efficacité: Modéré | **Principes actifs:** Flavonoïdes, Vitexine, Acides phénoliques, Saponosides
■■ *Éviter en cas de grossesse*
■■ *Surveiller la fonction hépatique*
■ *Contre-indication: Grossesse*
■ *Contre-indication: Allaitement*
■ *Contre-indication: Insuffisance hépatique*

Maladie 2: Troubles hépatiques

Synonymes	Jaunisse | Ictère | Hépatite | Foie gonflé
Symptômes	Jaunissement de la peau/yeux · Douleurs hypochondre droit · Urines foncées · Selles décolorées · Fatigue · Nausées
Parties utilisées	Feuilles, Racines

Modes de préparation:
• **Décoction de feuilles et racines:** Bouillir 30 g de feuilles + 20 g de racines dans 1 litre d'eau pendant 30 min. Filtrer et boire.

Adulte:	250 ml, 2 fois/jour pendant 14 jours
Enfant:	100 ml/jour

Durée:	14 jours avec bilan hépatique

Efficacité: Modéré à élevé | **Principes actifs:** Vitexine, Isovitexine, Acide glycyrrhizique, Flavonoïdes

■■ *Bilan hépatique avant et après traitement*

■■ *Éviter l'alcool*

■ *Contre-indication: Cirrhose avancée*

■ *Contre-indication: Hépatite B active*

Maladie 3: Fièvre typhoïde

Synonymes	Typhoïde | Fièvre entérique | Fièvre de la saison des pluies
Symptômes	Fièvre prolongée 38–40°C · Diarrhée · Douleurs abdominales · Céphalées · Rose sporotique · Bradycardie relative
Parties utilisées	Feuilles

Modes de préparation:

• **Infusion forte:** Verser 1 litre d'eau bouillante sur 60 g de feuilles séchées. Couvrir, infuser 20 min. Filtrer.

Adulte:	250 ml, 4 fois/jour pendant 10 jours
Enfant:	Non recommandé < 10 ans sans avis médical
Durée:	10 jours

Efficacité: Faible à modéré (appoint) | **Principes actifs:** Polyphénols, Flavonoïdes, Terpènes

■■ *Traitement médical antibiotique indispensable*

■■ *Usage en complément uniquement*

■ *Contre-indication: Grossesse*

■ *Contre-indication: Remplacement du traitement antibiotique*

Autres propriétés: Diuretique, Antipyretique, Cholagogue, Antioxydant

Usages non médicinaux: Tisane traditionnelle de bien-être, Bois de chauffe

■ Carica papaya

Langue	Nom local
Peuhl	Papaye
Malinke	Papaye
Soussou	Papaye
Francais	Papayer

Description botanique:
Petit arbre (3–10 m) à tronc creux cylindrique non ramifié, grandes feuilles palmatilobées terminales, latex blanc abondant. Fruits charnus pouvant peser jusqu'à 5 kg, chair orange à rouge.

Pays: Guinée, Tous pays tropicaux, Amérique centrale (origine), Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est, Caraïbes
Zones: Jardin familial, Verger tropical, Zone humide, Bord de cours d'eau
Statut UICN: Largement cultivé

Maladie 1: Paludisme

Synonymes	Malaria | Sumaya | Fièvre palustre
Symptômes	Fièvre · Frissons · Vomissements · Céphalées · Thrombopénie (plaquettes basses)
Parties utilisées	Feuilles

Modes de préparation:
• **Jus de feuilles:** Piler 3–5 feuilles fraîches propres, extraire le jus (environ 30 ml). Boire sans dilution.
• **Décoction:** Bouillir 30 g de feuilles fraîches dans 500 ml d'eau pendant 15 min. Filtrer.

Adulte:	30 ml de jus brut, 2 fois/jour pendant 5 jours
Enfant:	10–15 ml, 2 fois/jour (> 5 ans)
Durée:	5 jours

Efficacité: Modéré (surtout pour élévation des plaquettes) | **Principes actifs:** Carpaine, Papaïne, Quercétine, Kaempférol, Acétogénines
■■ *Goût amer intense, peut provoquer vomissements*
■■ *Surveiller les plaquettes*
■ *Contre-indication: Grossesse (puissant emménagogue/abortif)*
■ *Contre-indication: Allaitement*
■ *Contre-indication: Insuffisance rénale*

Maladie 2: Troubles digestifs

Synonymes	Dyspepsie | Ballonnements | Indigestion | Constipation
Symptômes	Douleurs abdominales · Ballonnements · Constipation · Reflux gastrique · Nausées postprandiales
Parties utilisées	Fruit mûr, Fruit vert, Graines, Latex

Modes de préparation:
• **Consommation directe:** Manger 200–300 g de papaye mûre à jeun chaque matin.
• **Infusion de graines:** Sécher 10 g de graines, les réduire en poudre, infuser dans 200 ml d'eau tiède 10 min.

Adulte:	200–300 g de fruit mûr/jour ou 1 tasse d'infusion de graines
Enfant:	100 g de fruit/jour

Durée:	14 jours

Efficacité: Élevé | **Principes actifs:** Papaïne, Chymopapaïne, Fibres alimentaires, Acide citrique

■■ *Consommer à maturité optimale*

■■ *Ne pas associer avec médicaments anticoagulants*

■ *Contre-indication: Allergie au latex (cross-réactivité possible)*

■ *Contre-indication: Grossesse (fruit vert)*

Maladie 3: Vers intestinaux

Synonymes	Helminthiases | Ascaridiose | Oxyurose | Parasites intestinaux
Symptômes	Douleurs abdominales · Prurit anal nocturne · Amaigrissement · Troubles du sommeil · Ballonnements
Parties utilisées	Graines, Latex

Modes de préparation:

• **Graines fraîches:** Mâcher 10–15 graines de papaye fraîches à jeun, avaler. Attendre 2 heures avant de manger.

• **Poudre de graines séchées:** Sécher les graines, les pulvériser. Mélanger 1 cuillère à soupe avec du miel. Prendre à jeun.

Adulte:	15 graines fraîches ou 1 c. à soupe de poudre, 1 fois/jour pendant 7 jours
Enfant:	5–8 graines (> 5 ans), 1 fois/jour pendant 5 jours
Durée:	7 jours

Efficacité: Modéré à élevé | **Principes actifs:** Carpaine, Benzylisothiocyanate, Benzylglucosinolate

■■ *Ne pas dépasser la dose recommandée*

■■ *Surveiller chez enfants*

■ *Contre-indication: Grossesse*

■ *Contre-indication: Enfants < 3 ans*

Autres propriétés: Cicatrisant, Anti inflammatoire, Antioxydant, Antifongique, Emmenagogue

Usages non médicinaux: Aliment, Attendrisseur de viande (papaïne), Cosmétique (masques)

■ Ocimum gratissimum

Langue	Nom local
Peuhl	Doumou-poussi
Malinke	Doumou
Soussou	Bolokoli
Francais	Basilic africain / Faux basilic

Description botanique:
Sous-arbrisseau aromatique (0,5–2 m), fortement parfumé (arôme clou de girofle / thym), feuilles ovales dentées opposées, fleurs blanches ou rosées en épis verticillés. Très commun autour des habitations.

Pays: Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Bénin, Togo, Cameroun, Congo
Zones: Jardin familial, Bord de chemin, Zone rurale, Zones périurbaines
Statut UICN: Non menacé

Maladie 1: Infections respiratoires

Synonymes	Rhume | Toux | Bronchite | Grippe | Angine
Symptômes	Toux sèche ou grasse · Rhume · Congestion nasale · Maux de gorge · Fièvre légère · Expectorations
Parties utilisées	Feuilles fraîches, Tiges feuillées

Modes de préparation:
• **Infusion:** Verser 500 ml d'eau bouillante sur 30 g de feuilles fraîches. Couvrir et infuser 10 min. Ajouter miel et citron.
• **Inhalation de vapeur:** Faire bouillir 100 g de feuilles dans 2 litres d'eau. Inhaler la vapeur tête couverte d'une serviette, 10 min.

Adulte:	3 tasses d'infusion par jour pendant 5–7 jours
Enfant:	2 tasses par jour (> 3 ans)
Durée:	5 à 7 jours

Efficacité: Élevé | **Principes actifs:** Eugénol, Thymol, Linalol, Carvacrol, Terpènes
■■ *Eviter inhalation chez asthmatiques*
■■ *Allergies aux Lamiaceae possibles*
■ *Contre-indication: Grossesse à forte dose*
■ *Contre-indication: Allergie aux huiles essentielles phénoliques*

Maladie 2: Diarrhée

Synonymes	Gastroentérite | Colite | Syndrome dysentérique | Turista
Symptômes	Selles liquides fréquentes (> 3/jour) · Crampes abdominales · Nausées · Déshydratation · Fièvre légère
Parties utilisées	Feuilles

Modes de préparation:
• **Décoction:** Faire bouillir 50 g de feuilles dans 1 litre d'eau pendant 20 min. Filtrer et boire par petites gorgées.

Adulte:	250 ml toutes les 4 heures jusqu'à amélioration
Enfant:	100 ml toutes les 6 heures (> 3 ans)

Durée:	3 à 5 jours

Efficacité: Modéré à élevé | **Principes actifs:** Eugénol, Tannins, Polyphénols

■■ *Maintenir hydratation orale*

■■ *Consulter si sang dans les selles*

■■ *Surveiller chez enfants < 5 ans*

■ *Contre-indication: Diarrhée sanglante (sans avis médical)*

■ *Contre-indication: Cholera (traitement médical urgent)*

Maladie 3: Infections fongiques cutanées

Synonymes	Mycose | Teigne | Candidose cutanée | Pied d'athlète
Symptômes	Démangeaisons · Desquamation · Plaques rouges · Lésions circulaires · Suintement
Parties utilisées	Feuilles (huile essentielle)

Modes de préparation:

• **Application directe:** Froisser les feuilles fraîches pour libérer le jus. Appliquer directement sur les lésions 2 fois/jour.

• **Cataplasme:** Piler les feuilles, former une pâte et appliquer en emplâtre sur la zone affectée. Laisser 1 heure.

Adulte:	Application 2–3 fois/jour pendant 14 jours
Enfant:	Application douce 1 fois/jour
Durée:	14 jours

Efficacité: Élevé | **Principes actifs:** Eugénol, Thymol, Carvacrol

■■ *Tester sur petite surface cutanée*

■■ *Éviter les muqueuses*

■ *Contre-indication: Plaies ouvertes profondes*

Autres propriétés: Antibacterien, Antifongique, Anti inflammatoire, Insectifuge, Carminatif

Usages non médicinaux: Condiment culinaire, Répulsif à insectes naturel, Déodorant d'ambiance

■ Khaya senegalensis

Langue	Nom local
Peuhl	Cailedrat
Malinke	Dialla
Soussou	Toura
Francais	Acajou du Sénégal / Cailcédrat

Description botanique:
Grand arbre imposant (20–30 m), à couronne dense arrondie, écorce gris-brun écailleuse, feuilles composées pennées caduques, fleurs blanches en panicules, fruits capsules ligneuses à 4–5 valves.

Pays: Guinée, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun
Zones: Savane soudanienne, Savane soudano-guinéenne, Bord de rivières, Forêts galeries
Statut UICN: Vulnérable (UICN) – surexploitation du bois

Maladie 1: Paludisme

Synonymes	Malaria | Sumaya | Fièvre palustre
Symptômes	Fièvre haute · Frissons · Sueurs nocturnes · Céphalées violentes · Vomissements
Parties utilisées	Écorce de tronc, Feuilles, Graines

Modes de préparation:
• **Décoction d'écorce:** Gratter et faire bouillir 50 g d'écorce fraîche dans 1 litre d'eau pendant 30 min. Filtrer, refroidir.

Adulte:	200 ml, 3 fois/jour pendant 5 jours
Enfant:	100 ml, 2 fois/jour (> 7 ans)
Durée:	5 à 7 jours

Efficacité: Modéré | **Principes actifs:** Limonoïdes, Khayasine, Saponines, Triterpènes
■■ *Amer et difficile à avaler (sucrer légèrement)*
■■ *Éviter longue durée (hépatotoxicité possible)*
■ *Contre-indication: Grossesse*
■ *Contre-indication: Insuffisance hépatique*
■ *Contre-indication: Insuffisance rénale*

Maladie 2: Diabète de type 2

Synonymes	Hyperglycémie | Kololi (Peuhl) | Sucre dans le sang
Symptômes	Soif excessive · Mictions fréquentes · Perte de poids · Vision floue · Fatigue
Parties utilisées	Écorce, Feuilles, Graines

Modes de préparation:
• **Décoction d'écorce légère:** Faire bouillir 20 g d'écorce dans 500 ml d'eau pendant 15 min. Filtrer, boire tiède.

Adulte:	250 ml le matin à jeun, pendant 30 jours
Enfant:	Non recommandé
Durée:	30 jours avec surveillance glycémique

Efficacité: Modéré | **Principes actifs:** Limonoïdes, Flavonoïdes, Alcaloïdes

■■ *Surveiller glycémie quotidiennement*
■■ *Associer à régime alimentaire adapté*
■ *Contre-indication: Grossesse*
■ *Contre-indication: Insuffisance hépatique*

Autres propriétés: Antipyretique, Anti inflammatoire, Antibacterien, Antifongique
Usages non médicinaux: Bois d'œuvre de haute qualité (acajou), Arbre d'ombrage, Bois de charbon

■ Zingiber officinale

Langue	Nom local
Peuhl	Higuide
Malinke	Niamou
Soussou	Fanghouma
Francais	Gingembre

Description botanique:
Plante herbacée rhizomateuse (0,6–1,2 m), rhizome charnu, noueux, aromatique, tiges aériennes feuillées, fleurs jaune-verdâtre en épis sur tiges séparées. Largement cultivé pour ses rhizomes.

Pays: Guinée, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Cameroun, Inde (origine), Chine, Jamaïque
Zones: Jardin familial, Champ cultivé, Sous-bois humide, Zone tropicale humide
Statut UICN: Non menacé (cultivé)

Maladie 1: Nausées et vomissements

Synonymes	Mal des transports | Nausées de grossesse | Nausées postopératoires | Cinétose
Symptômes	Nausées · Vomissements · Malaise · Sueurs froides · Pâleur
Parties utilisées	Rhizome frais ou séché

Modes de préparation:
• **Infusion de gingembre frais:** Râper 5 g de gingembre frais dans 250 ml d'eau bouillante. Infuser 10 min. Ajouter miel et citron.
• **Gingembre cru:** Mâcher lentement un morceau de gingembre frais (1–2 cm) pour action immédiate.

Adulte:	250 ml d'infusion, 3 fois/jour ou 1–2 g de poudre
Enfant:	1 tasse légèrement dosée (> 5 ans)
Durée:	Selon besoin, jusqu'à 14 jours

Efficacité: Élevé (validé cliniquement) | **Principes actifs:** Gingérols, Shogaols, Zingerone, Paradols
■■ *Dose élevée peut augmenter risque saignement*
■■ *Interactions avec anticoagulants*
■ *Contre-indication: Calculs biliaires*
■ *Contre-indication: Trouble de coagulation (forte dose)*

Maladie 2: Douleurs articulaires

Synonymes	Arthrite | Rhumatismes | Arthrose | Douleurs osseuses | Douleurs des vieux
Symptômes	Douleur articulaire · Raideur matinale · Gonflement · Chaleur locale · Limitation de mouvement
Parties utilisées	Rhizome frais

Modes de préparation:
• **Décoction forte:** Faire bouillir 20 g de gingembre frais râpé dans 500 ml d'eau pendant 15 min. Boire chaud.
• **Cataplasme chaud:** Râper du gingembre frais, le chauffer légèrement et appliquer en cataplasme chaud sur l'articulation douloureuse. Laisser 30 min.

Adulte:	2 tasses de décoction/jour + cataplasme selon besoin
Enfant:	Cataplasme uniquement > 8 ans

Durée:	30 jours

Efficacité: Modéré à élevé | **Principes actifs:** Gingérols, Shogaols, 6-paradol
■■ *Éviter sur peau abîmée (cataplasme)*
■■ *Interactions avec AINS*
■ *Contre-indication: Anticoagulants à haute dose*

Maladie 3: Rhume et grippe

Synonymes	Infections virales des voies respiratoires | Coryza | Influenza
Symptômes	Rhume · Toux · Fièvre · Congestion nasale · Maux de gorge · Courbatures
Parties utilisées	Rhizome frais

Modes de préparation:

• **Tisane gingembre-miel-citron:** Infuser 10 g de gingembre frais dans 500 ml d'eau bouillante, ajouter le jus d'1/2 citron et 1 c. à soupe de miel.

Adulte:	3–4 tasses par jour pendant 5 jours
Enfant:	2 tasses/jour (> 5 ans)
Durée:	5 à 7 jours

Efficacité: Élevé | **Principes actifs:** Gingérols, Zingerone, Huiles essentielles
■■ *Éviter si allergie au gingembre*
■ *Contre-indication: Aucune à dose thérapeutique standard*

Autres propriétés: Anti inflammatoire, Antioxydant, Digestif, Carminatif, Antibacterien
Usages non médicinaux: Épice culinaire, Boissons (ginger beer), Confiserie, Conserverie

■ Senna alata

Langue	Nom local
Peuhl	Kassia
Malinke	Bogolobali
Soussou	Kankanse
Francais	Dartrier / Arbre à bougies

Description botanique:
Arbuste (2–4 m), feuilles pennées à folioles larges disposées en paires, fleurs jaune vif en épis dressés (aspect de bougie), gousses longues ailées. Très décoratif et médicinal.

Pays: Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Brésil (origine), Asie tropicale, Caraïbes
Zones: Bord de route, Jachère, Zone humide dégradée, Jardins
Statut UICN: Non menacé

Maladie 1: Infections fongiques cutanées

Synonymes	Teigne | Dermatomycose | Gale | Dartres | Mycose de peau
Symptômes	Plaques desquamatives · Démangeaisons intenses · Cercles rouges · Perte de poils/cheveux localisée · Suintement
Parties utilisées	Feuilles fraîches

Modes de préparation:
• **Application directe:** Froisser les feuilles fraîches pour en extraire le jus verdâtre. Appliquer généreusement sur les lésions 2 fois/jour.
• **Pommade de feuilles:** Piler les feuilles avec un peu de beurre de karité ou huile de coco. Appliquer en couche fine sur lésions.

Adulte:	2 applications par jour pendant 14–21 jours
Enfant:	1 application douce par jour
Durée:	14 à 21 jours

Efficacité: Élevé (reconnu médicalement) | **Principes actifs:** Aloe-émodine, Sennosides, Anthraquinones, Kaempférol
■■ *Éviter les yeux et muqueuses*
■■ *Ne pas ingérer*
■ *Contre-indication: Grossesse (usage interne)*
■ *Contre-indication: Peau hypersensible*

Maladie 2: Constipation

Synonymes	Intestins paresseux | Occlusion légère
Symptômes	Absence de selles > 3 jours · Selles dures · Douleurs abdominales · Ballonnements
Parties utilisées	Feuilles, Gousses séchées

Modes de préparation:
• **Décoction légère:** Bouillir 10 g de feuilles dans 250 ml d'eau pendant 10 min. Filtrer, boire le soir au coucher.

Adulte:	1 tasse le soir, maximum 3 jours consécutifs
Enfant:	Déconseillé < 12 ans

Durée:	Maximum 3 jours

Efficacité: Élevé | **Principes actifs:** Sennosides A et B, Anthraquinones

■■ *Usage court terme uniquement*

■■ *Risque de dépendance laxative si usage chronique*

■ *Contre-indication: Grossesse*

■ *Contre-indication: Maladies inflammatoires intestinales*

■ *Contre-indication: Occlusion intestinale*

Autres propriétés: Laxatif, Antifongique, Antibacterien, Anti inflammatoire

Usages non médicinaux: Plante ornementale, Jachère améliorante

■ Annona muricata

Langue	Nom local
Peuhl	Corossol
Malinke	Dankali
Soussou	Sapoti
Francais	Corossolier / Corossol

Description botanique:
Petit arbre (5–10 m), feuilles alternes elliptiques brillantes légèrement aromatiques, grandes fleurs verdâtres, grands fruits épineux verts (jusqu'à 5 kg) à chair blanche crémeuse acidulée.

Pays: Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, Cameroun, Antilles (origine), Brésil, Mexique
Zones: Verger tropical, Jardin familial, Zone côtière humide
Statut UICN: Non menacé (cultivé)

Maladie 1: Insomnie et anxiété

Synonymes	Troubles du sommeil | Nervosité | Stress | Agitation nocturne
Symptômes	Difficultés d'endormissement · Réveils nocturnes · Agitation · Palpitations · Tension nerveuse
Parties utilisées	Feuilles, Fruits

Modes de préparation:
• **Infusion de feuilles:** Infuser 5–7 feuilles fraîches dans 500 ml d'eau bouillante pendant 15 min. Boire tiède le soir.

Adulte:	1 tasse le soir 30 min avant le coucher
Enfant:	Non recommandé < 12 ans
Durée:	14 jours

Efficacité: Modéré | **Principes actifs:** Acétogénines, Alcaloïdes isoquinoléiques, Annocatacine
■■ *Ne pas conduire après usage*
■■ *Éviter avec médicaments sédatifs*
■ *Contre-indication: Grossesse*
■ *Contre-indication: Maladie de Parkinson (neurotoxicité potentielle)*

Maladie 2: Hypertension artérielle

Synonymes	Tension élevée | HTA
Symptômes	Céphalées · Vertiges · Epistaxis · Palpitations
Parties utilisées	Feuilles, Écorce

Modes de préparation:
• **Décoction:** Faire bouillir 10 feuilles dans 1 litre d'eau pendant 15 min. Filtrer. Boire frais.

Adulte:	2 verres de 200 ml par jour
Enfant:	Non recommandé
Durée:	30 jours avec contrôle tensionnel

Efficacité: Modéré | **Principes actifs:** Acétogénines, Flavonoïdes, Tannins
■■ *Surveiller tension*

■■ *Interactions médicamenteuses possibles*
■ *Contre-indication: Maladie de Parkinson*
■ *Contre-indication: Grossesse*
■ *Contre-indication: Hypotension*

Autres propriétés: Antitumoral potentiel, Antibacterien, Antiparasitaire, Diuretique, Sedatif
Usages non médicinaux: Jus de fruit, Crème glacée, Confiture, Boisson fermentée