

ASSIGNMENT 6

Y.Nagarani

Download all python codes from

<https://github.com/Y.Nagarani/ASSIGNMENT6/tree/main/CODES>

and latex-tikz codes from

<https://github.com/Y.Nagarani/ASSIGNMENT6/tree/main>

1 QUESTION No 2.5

In $\triangle ABC$, $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Find $\angle B$.

2 SOLUTION

Let, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Now ,

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (2.0.1)$$

$$\mathbf{C} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (2.0.2)$$

Let $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ and $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

We know that ,

$$\mathbf{B} = \arccos\left(\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{c}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{c}\|}\right) \quad (2.0.3)$$

Then

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{17} \quad (2.0.4)$$

$$\|\mathbf{c}\| = \sqrt{6} \quad (2.0.5)$$

$$\mathbf{a}^T \mathbf{c} = 10 \quad (2.0.6)$$

Substitute above values in (2.0.3) then ,

$$\mathbf{B} = \arccos\left(\frac{10}{\sqrt{17}\sqrt{6}}\right) \quad (2.0.7)$$

$$\mathbf{B} = 66.15 \quad (2.0.8)$$




Fig. 0: $\triangle ABC$