





**Αν βρείτε κάποιο λάθος PM me να το διορθώσω: Georgera**

**ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ)****10<sup>η</sup> σειρά ασκήσεων: Προσδιορισμός γεωμετρικού κέντρου επιπέδων επιφανειών****Άσκηση 1**

Να προσδιορισθούν τα γεωμετρικά κέντρα των γραμμοσκιασμένων επιφανειών του Σχ.1.

**Σχήμα 1****Άσκηση 2**


Να προσδιορισθεί το γεωμετρικό κέντρο της σκιασμένης επιφάνειας του Σχ.2. Δίνεται ότι  $ΑΓ=2ΑΒ=10\text{m}$  και ότι  $ΒΑΓ=90^\circ$ . Η κυκλική οπή ακτίνας  $0.7\text{ m}$ , εφάπτεται στο μέσον Δ της ΒΓ.

**Σχήμα 2****Σχήμα 3****Άσκηση 3**

Να ευρεθεί το γεωμετρικό κέντρο της επιφάνειας που περικλείεται μεταξύ των γραμμών  $y_1$ ,  $y_2$  και  $y_3$  του παραπλεύρως Σχ.3.

#### Άσκηση 4


Να προσδιορισθούν τα γεωμετρικά κέντρα των κάτωθι επιφανειών (Σχ. 4):




Σχήμα 4

#### Άσκηση 5

Να προσδιορισθούν το γεωμετρικό κέντρο της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας του Σχ.5.




Σχήμα 5



Σχήμα 6

#### Άσκηση 6

Να προσδιορισθεί το γεωμετρικό κέντρο της επίπεδης επιφάνειας ABΓ του Σχ.6.




Σχήμα 7

#### Άσκηση 7

Να προσδιορισθεί το γεωμετρικό κέντρο της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας (OABΓO) του Σχ.7.

10<sup>u</sup> Σεπεί αλκίωση: Προβλεπόμενα γεωμετρικά κέντρα εμβαδών επιφανειών

Άσκηση 1



$\text{Γ}_\text{χω} \text{ οτι για } y_3 = 2, x = 0 \text{ ορα } 2 = 0 + m \Rightarrow m = 2$   
 $\text{για } y_3 = 0, x = 1 \text{ ορα } 0 = k + 2 \Rightarrow k = -2$

$$\left. \begin{array}{l} \text{για } y_3 = 2, x = 0 \text{ ορα } 2 = 0 + m \Rightarrow m = 2 \\ \text{για } y_3 = 0, x = 1 \text{ ορα } 0 = k + 2 \Rightarrow k = -2 \end{array} \right\} y_3 = -2x + 2$$

$\text{Γ}_\text{χω} \text{ οτι για } y_2 = -1, x = 0 \text{ ορα } -1 = b$   
 $y_2 = 0, x = 1 \text{ ορα } 0 = a - 1 \Rightarrow a = 1$

$$\left. \begin{array}{l} \text{για } y_2 = -1, x = 0 \text{ ορα } -1 = b \\ y_2 = 0, x = 1 \text{ ορα } 0 = a - 1 \Rightarrow a = 1 \end{array} \right\} y_2 = x^2 - 1$$

$\text{Γ}_\text{χω} \text{ οτι για } y_1 = 2, x = 0 \text{ ορα } 2 = d$   
 $y_1 = 3, x = 2 \text{ ορα } 3 = 2c + 2 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{για } y_1 = 2, x = 0 \text{ ορα } 2 = d \\ y_1 = 3, x = 2 \text{ ορα } 3 = 2c + 2 \Rightarrow c = \frac{1}{2} \end{array} \right\} y_1 = \frac{x}{2} + 2$$

$y_1 = y_2 \Rightarrow ax^2 + b = cx + d \Rightarrow x^2 - 1 = \frac{x}{2} + 2 \Rightarrow x^2 - \frac{x}{2} - 3 = 0 \Rightarrow 2x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2$



$$\text{Exw } A_1 = \int_0^1 \frac{5x}{2} dx = \left[ \frac{5x^2}{4} \right]_0^1 = \frac{5}{4} = 1,25$$

$$\text{nce } A_2 = \int_1^2 \left( \frac{x}{2} + 2 - x^2 + 1 \right) dx = \int_1^2 \left( -x^2 + \frac{x}{2} + 3 \right) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{4} + 3x \right]_1^2 =$$

$$= -\frac{8}{3} + 1 + 6 - \left( -\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + 3 \right) = -\frac{8}{3} + 1 + 6 + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - 3 = -\frac{7}{3} + 4 - \frac{1}{4} =$$

$$= \frac{12 \cdot 4 - 7 \cdot 4 - 3}{12} = \frac{48 - 28 - 3}{12} = \frac{20 - 3}{12} = \frac{17}{12} = 1,417$$

$$Q_{x1} = \int y dA_1 = \int_0^{\frac{5}{2}} \left[ y \left( 1 - \frac{2-y}{2} \right) \right] dy = \int_0^{\frac{5}{2}} \left[ y \left( 1 - 1 + \frac{y}{2} \right) \right] dy = \int_0^{\frac{5}{2}} \frac{y^2}{2} dy = \left[ \frac{y^3}{6} \right]_0^{\frac{5}{2}} =$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \left( \frac{5}{2} \right)^3 = \frac{1}{6} \cdot \frac{125}{8} = \frac{125}{48} = 2,604 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$Q_{y1} = \int x dA_1 = \int_0^1 x \cdot \frac{5x}{2} dx = \int_0^1 \frac{5x^2}{4} dx = \left[ \frac{5x^3}{12} \right]_0^1 = \frac{5}{12} = 0,417$$

$$Q_{x2} = \int y dA_2 = \int_0^2 \left[ y (\sqrt{y+1} - 1) \right] dy = \int_0^2 (y \sqrt{y+1} - y) dy = \int_0^2 y \sqrt{y+1} dy - \int_0^2 y dy =$$

$$= \int_0^2 y \sqrt{y+1} dy - \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \int_0^2 y \sqrt{y+1} dy - 2 \quad (*)$$

$$I = \int_0^2 y \sqrt{y+1} dy \quad \text{Ora } u = y+1 \Rightarrow du = dy, \text{ la vera aora } u_1 = 1, u_2 = 3$$

$$\text{Apo } I = \int_1^3 (u-1) \sqrt{u} du = \int_1^3 (u \sqrt{u} - \sqrt{u}) du = \int_1^3 \left( u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}} \right) du = \left[ \frac{2u^{\frac{5}{2}}}{5} - \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_1^3 =$$

$$= \left[ \frac{2u^2\sqrt{u}}{3} - \frac{2u\sqrt{u}}{3} \right]_1^3 = \frac{2 \cdot 9\sqrt{3}}{3} - \frac{2 \cdot 3\sqrt{3}}{3} - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{18\sqrt{3}}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{2}{3} - \frac{2}{3} =$$

$$= \frac{18\sqrt{3}}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3} + \frac{4}{15} = \frac{24\sqrt{3} + 4}{15} = 3,038$$

$$A_{ca} \Rightarrow Q_{x2} = 3,038 - 2 = 1,038 \text{ m}^3$$

$$Q_{yz} = \int x dA_2 = \int_1^2 x \left( -x^2 + \frac{x}{2} + 3 \right) dx = \int_1^2 \left( -x^3 + \frac{x^2}{2} + 3x \right) dx = \left[ -\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^2}{2} \right]_1^2$$

$$= -4 + \frac{4}{3} + 6 - \left( -\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{3}{2} \right) = 2 + \frac{4}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{3}{2} = \frac{2 \cdot 12 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 - 3 \cdot 6}{12} =$$


$$= \frac{24 + 16 + 3 - 2 - 18}{12} = \frac{43 - 20}{12} = \frac{23}{12} = 1,917$$

$$A_{ca} \quad x_c = \frac{Q_{y1} + Q_{y2}}{A} = \frac{Q_{y1} + Q_{y2}}{A_1 + A_2} = \frac{0,417 + 1,917}{1,25 + 1,417} = \frac{2,334}{2,667} = 0,875 \text{ m}$$

$$y_c = \frac{Q_{x1} + Q_{x2}}{A} = \frac{2,604 + 3,038}{2,667} = \frac{5,642}{2,667} = 2,115 \text{ m}$$

$$A_{ca} \quad C(0,875, 2,115)$$





$$f_{xw}: -\frac{x}{2} + 2 = \sqrt{x} \Leftrightarrow \frac{x}{2} + \sqrt{x} - 2 = 0 \Leftrightarrow x + 2\sqrt{x} - 4 = 0$$

$$\Delta = 4 + 16 = 20 \quad x_{1/2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{5}}{2} \Rightarrow x = \frac{-2 + 2\sqrt{5}}{2} = 1,236 \Rightarrow y = 1,382$$

$$\text{Area } B(1,236, 1,382) \Rightarrow A(1,236, 2)$$

$$A_1 = \frac{1,236 \cdot (2 - 1,382)}{2} = 0,382 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \int_{1,236}^4 (2 - \sqrt{x}) dx = \left[ 2x - \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_{1,236}^4 = \left[ 2x - \frac{2x\sqrt{x}}{3} \right]_{1,236}^4 = 8 - \frac{2 \cdot 4 \cdot 2}{3} - \left( 2 \cdot 1,236 - \frac{2 \cdot 1,236 \cdot \sqrt{1,236}}{3} \right)$$

$$= 8 - \frac{16}{3} - \left( 2,472 - \frac{2,472 \cdot 1,112}{3} \right) = 2,667 - 2,472 + 0,916 = 1,111 \text{ m}^2$$

$$\text{Area } A = 1,493 \text{ m}^2$$

$$f_{xw} \quad A(0,2), B(1,236, 1,382), A(1,236, 2)$$

$$\text{Area } C_1 = (0,824, 1,794)$$

$$\text{Area } Q_{x1} = A_1 y_{c1} = 0,382 \cdot 1,794 = 0,685 \text{ m}^3$$

$$Q_{y1} = A_1 x_{c1} = 0,382 \cdot 0,824 = 0,315 \text{ m}^3$$

$$Q_{x2} = \int y dA = \int_{1,382}^2 y(y^2 - 1,236) dy = \int_{1,382}^2 (y^3 - 1,236y) dy = \left[ \frac{y^4}{4} - \frac{1,236}{2} y^2 \right]_{1,382}^2 =$$

$$= 4 - 1,236 \cdot 2 - \left( \frac{1,382^4}{4} - \frac{1,236}{2} \cdot 1,382^2 \right) = 1,528 - (0,912 - 1,18) =$$

$$= 1,528 - (-0,268) = 1,528 + 0,268 = 1,796$$

$$Q_{y2} = \int x dA = \int_{1,236}^4 [x(2 - \sqrt{x})] dx = \int_{1,236}^4 (2x - x\sqrt{x}) dx = \int_{1,236}^4 (2x - x^{\frac{3}{2}}) dx = \left[ x^2 - \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5} \right]_{1,236}^4 =$$

$$= \left[ x^2 - \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5} \right]_{1,236}^4 = 16 - \frac{2 \cdot 16 \cdot 2}{5} - \left( 1,236^2 - \frac{2(1,236)^2 \sqrt{1,236}}{5} \right) =$$

$$= 3,2 - (1,528 - 0,611 \cdot 1,112) = 3,2 - (1,528 - 0,679) = 3,2 - 0,849 = 2,351$$


$$\text{Apa } \bar{x} = \frac{Q_{y1} + Q_{y2}}{A_1 + A_2} = \frac{0,315 + 2,351}{1,493} = \frac{2,666}{1,493} = 1,786$$

$$\text{wan } \bar{y} = \frac{Q_{x1} + Q_{x2}}{A} = \frac{0,685 + 1,796}{1,493} = \frac{2,481}{1,493} = 1,662$$

$$\text{Apa } C(1,786, 1,662)$$




## Contoh 2



$$OD = R = 0,7 \text{ m}$$

$$AC = 2AB = 10 \text{ m}$$



Apa  $AC = 2AB$  &  $\angle ACB = 30^\circ \Rightarrow \angle BCA = 60^\circ$

Eku  $\begin{cases} A(0, 10) \\ B(5, 10) \\ C(0, 0) \end{cases} \Rightarrow C\left(\frac{5}{3}, \frac{20}{3}\right) = (1,667, 6,667)$   
 $D(2,5, 5)$

$$\sin(30^\circ) = \frac{OD'}{OB} \Rightarrow OD' = \frac{1}{2} OB = \frac{1}{2} \cdot 0,7 = 0,35 \text{ m}$$

$$\cos(30^\circ) = \frac{OD'}{OB} \Rightarrow OD' = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 0,7 = \sqrt{3} \cdot 0,35 = 0,61 \text{ m}$$

Apa  $O(2,5 - 0,61, 5 + 0,35) = (1,89, 5,35)$

Apa

Eku  $O(1,89, 5,35)$ ,  $A_2 = \pi R^2 = \pi (0,7)^2 = 1,54 \text{ m}^2$  dan  $A_1 = \frac{5 \cdot 10}{2} = 25 \text{ m}^2$


Apa  $A = A_1 - A_2 = 23,46$

Apa  $Q_{x2} = y_c A_2 = 5,35 \cdot 1,54 = 8,24 \text{ m}^3$  |  $Q_{y1} = x_c A_1 = 1,667 \cdot 25 = 41,675 \text{ m}^3$   
 $Q_{y2} = x_c A_2 = 1,89 \cdot 1,54 = 2,91 \text{ m}^3$  |  $Q_{x1} = y_c A_1 = 6,667 \cdot 25 = 166,675 \text{ m}^3$

Apa  $x_c = \frac{Q_{y1} - Q_{y2}}{A} = \frac{41,675 - 2,91}{23,46} = \frac{38,765}{23,46} = 1,65 \text{ m}$  dan  $y_c = \frac{Q_{x1} - Q_{x2}}{A} = \frac{166,675 - 8,24}{23,46} = 6,75 \text{ m}$

Apa  $C(1,65, 6,75)$

### Problem 3



$$\begin{aligned} \text{Via } y_2=0 \text{ at } x=e: 0 &= ae + b \\ \text{Via } y_2=e \text{ at } x=1: e &= a + b \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{b}{e} \\ a = e - b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e - b = -\frac{b}{e} \\ a = e - b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^2 - be = -b \\ a = e - b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b(e-1) = e^2 \\ a = e - b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = \frac{e^2}{e-1} \\ a = e - \frac{e^2}{e-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{e^2}{e-1} \\ \frac{e(e-1) - e^2}{e-1} = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{e^2}{e-1} \\ a = \frac{e^2 - e - e^2}{e-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{e^2}{e-1} \\ a = \frac{-e}{e-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{e^2}{e-1} \\ a = \frac{e}{1-e} \end{cases}$$

$$\text{Via } \boxed{y_2 = \frac{e}{1-e}x + \frac{e^2}{e-1}} \Rightarrow y_2 - \frac{e^2}{e-1} = \frac{e}{1-e}x \Rightarrow x = \frac{(y_2 - \frac{e^2}{e-1}) \cdot (1-e)}{e} = \frac{(1-e)y + e}{e}$$

$$\begin{aligned} \text{Via } y_3=1 \text{ at } x=0: 1 &= b \\ \text{Via } y_3=0 \text{ at } x=e: 0 &= ye + (a) \Rightarrow y = -\frac{1}{e} \end{aligned} \Rightarrow \boxed{y_3 = -\frac{1}{e}x + 1}$$

$$A_1 = \int_0^1 \left( e^x + \frac{1}{e}x - 1 \right) dx = \left[ e^x + \frac{x^2}{2e} - x \right]_0^1 = e + \frac{1}{2e} - 1 - 1 = \frac{2e^2 + 1 - 4e}{2e} = \frac{2e^2 - 4e + 1}{2e} = 0.99 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \int_1^e \left( \frac{e}{1-e}x + \frac{e^2}{e-1} + \frac{1}{e}x - 1 \right) dx = \left[ \frac{e x^2}{2(1-e)} + \frac{e^2 x}{e-1} + \frac{x^2}{2e} - x \right]_1^e = \dots$$



$$= \frac{e^3}{2(e-1)} + \frac{e^3}{e-1} + \frac{e}{2} - e - \left( \frac{e}{2(e-1)} + \frac{e^2}{e-1} + \frac{1}{2e} - 1 \right) =$$

$$= \frac{-e^3}{2(e-1)} + \frac{2e^3}{2(e-1)} + \frac{e(e-1)}{2(e-1)} - \frac{2e(e-1)}{2(e-1)} + \frac{e}{2(e-1)} - \frac{2e^2}{2(e-1)} - \frac{1}{2e} + \frac{2(e-1)}{2(e-1)} =$$

$$= \frac{e^3 - e(e-1) + e - 2e^2 + 2(e-1)}{2(e-1)} - \frac{1}{2e} = \frac{e^3 - e^2 + e + e - 2e^2 + 2e - 2}{2(e-1)} - \frac{1}{2e} =$$

$$= \frac{e^3 - 3e^2 + 4e - 2}{2(e-1)} - \frac{1}{2e} = \frac{e^4 - 3e^3 + 4e^2 - 2e - e + 1}{2e(e-1)} = \frac{e^4 - 3e^3 + 4e^2 - 3e + 1}{2e(e-1)} = \frac{16,74}{9,341} =$$

$$= 1,79 \text{ m}^2 \Rightarrow A = A_1 + A_2 = 2,69$$

$$Q_{x1} = \int y dA_1 = \int_{\frac{e-1}{e}}^e \left[ y(1 - \ln y) \right] dy = \int_{\frac{e-1}{e}}^e (y - y \ln y) dy = \int_{\frac{e-1}{e}}^e y dy - \int_{\frac{e-1}{e}}^e y \ln y dy =$$

$$= \left[ \frac{y^2}{2} \right]_{\frac{e-1}{e}}^e - \int_{\frac{e-1}{e}}^e y \ln y dy$$

$$E_{\lambda w} I = \int_{\frac{e-1}{e}}^e y \ln y dy = \int_{\frac{e-1}{e}}^e \frac{1}{2} (y^2)' \ln y dy = \left[ \frac{y^2}{2} \ln y \right]_{\frac{e-1}{e}}^e - \int_{\frac{e-1}{e}}^e \frac{y^2}{2} \cdot \frac{1}{y} dy = \left[ \frac{y^2}{2} \ln y \right]_{\frac{e-1}{e}}^e - \left[ \frac{y^2}{4} \right]_{\frac{e-1}{e}}^e$$

$$A_{\rho a} Q_{x1} = \left[ \frac{3y^2}{4} \right]_{\frac{e-1}{e}}^e - \left[ \frac{y^2}{2} \ln y \right]_{\frac{e-1}{e}}^e = \left[ \frac{3y^2}{4} - \frac{y^2}{2} \ln y \right]_{\frac{e-1}{e}}^e =$$

$$= \frac{3e^2}{4} - \frac{e^2}{2} \ln e - \left( \frac{3(e-1)^2}{4e^2} - \frac{(e-1)^2}{2e^2} \ln \left( \frac{e-1}{e} \right) \right) = 1,85 - 0,29 - 0,2 \cdot 0,46 = 1,56 - 0,09 = 1,47 \text{ m}^3$$



$$Q_{y_1} = \int x dA_1 = \int_0^1 \left[ x \left( e^x + \frac{x}{e} - 1 \right) \right] dx = \int_0^1 \left( x e^x + \frac{x^2}{e} - x \right) dx =$$

$$= \left[ x e^x - e^x + \frac{x^3}{3e} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = e - e + \frac{1}{3e} - \frac{1}{2} - (0 - 1 + 0 - 0) = \frac{1}{3e} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{3e} + \frac{1}{2} = 0,62$$

$$Q_{x_2} = \int y dA_2 = \int_0^e \left[ y \left( \frac{1-e}{e} y + e - 1 \right) \right] dy = \int_0^e \left[ \left( \frac{1-e}{e} \right) y^2 + e y - y \right] dy =$$

$$= \left[ \frac{y^3(1-e)}{3e} + \frac{e}{2} y^2 - \frac{1}{2} y^2 \right]_0^e = \frac{e^3(1-e)}{3e} + \frac{e^3}{2} - \frac{e^2}{2} = \frac{e^2 - e^3}{3} + \frac{e^3 - e^2}{2} =$$

$$= \frac{2e^2 - 2e^3}{6} + \frac{3e^3 - 3e^2}{6} = \frac{e^3 - e^2}{6} = 2,12$$

$$Q_{y_2} = \int x dA_2 = \int_1^e \left[ x \left( \frac{ex}{1-e} + \frac{e^2}{e-1} + \frac{x}{e} - 1 \right) \right] dx = \int_1^e \left( \frac{ex^2}{1-e} + \frac{e^2 x}{e-1} + \frac{x^2}{e} - x \right) dx =$$

$$= \left[ \frac{ex^3}{3(1-e)} + \frac{e^2 x^2}{2(e-1)} + \frac{x^3}{3e} - \frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^4}{3(1-e)} + \frac{e^4}{2(e-1)} + \frac{e^3}{3e} - \frac{e^2}{2} - \left( \frac{e}{3(1-e)} + \frac{e^2}{2(e-1)} + \frac{1}{3e} - \frac{1}{2} \right)$$


$$= -10,59 + 15,89 + 2,46 - 3,69 - (-0,53 + 2,15 + 0,12 - 0,5) = 4,07 - (1,24) = 2,83$$

$$\text{Apa } x_c = \frac{Q_{y_1} + Q_{y_2}}{A} = \frac{0,62 + 2,83}{2,69} = \frac{3,45}{2,69} = 1,28 \text{ m}$$

$$\text{atau } y_c = \frac{Q_{x_1} + Q_{x_2}}{A} = \frac{2,12 + 1,47}{2,69} = \frac{3,59}{2,69} = 1,33$$

$$\text{Apa } G(1,28, 1,33)$$

# Assum 4



For  $x=b \Rightarrow y=h$ :  $x = \frac{h \cdot b^2}{b^2} \Rightarrow 1 = \frac{1}{1}$

$$A = \int_0^b \frac{h}{b^2} x^2 dx = \left[ \frac{h x^3}{3 b^2} \right]_0^b = \frac{h b^3}{3 b^2} = \frac{h b}{3}$$


$$\begin{aligned} Q_x &= \int y dA = \int_0^h \left[ y \left( b - \frac{b}{\sqrt{h}} \sqrt{y} \right) \right] dy = \int_0^h \left( y b - \frac{b y \sqrt{y}}{\sqrt{h}} \right) dy = \left[ \frac{b y^2}{2} - \frac{b}{\sqrt{h}} \frac{2}{5} y^{5/2} \right]_0^h \\ &= \left[ \frac{b}{2} y^2 - \frac{2b}{5\sqrt{h}} y^2 \sqrt{y} \right]_0^h = \frac{b h^2}{2} - \frac{2b h^2 \sqrt{h}}{5\sqrt{h}} = \frac{b h^2}{2} - \frac{2b h^2}{5} = \frac{5b h^2 - 4b h^2}{10} = \frac{b h^2}{10} \end{aligned}$$

$$Q_y = \int x dA = \int_0^b \frac{h}{b^2} x^3 dx = \left[ \frac{h x^4}{4 b^2} \right]_0^b = \frac{h b^4}{4 b^2} = \frac{h b^2}{4}$$

Area  $x_c = \frac{Q_y}{A} = \frac{\frac{h b^2}{4}}{\frac{h b}{3}} = \frac{3 h b^2}{4 h b} = \frac{3 b}{4}$  and  $y_c = \frac{Q_x}{A} = \frac{\frac{b h^2}{10}}{\frac{h b}{3}} = \frac{3 b h^2}{10 h b} = \frac{3 h}{10}$

Area  $C \left( \frac{3h}{10}, \frac{3b}{4} \right)$





$$A = \int_0^L a \sin\left(\frac{nx}{L}\right) dx = a \int_0^L \sin\left(\frac{nx}{L}\right) dx = a \left[ -\frac{L}{n} \cos\left(\frac{nx}{L}\right) \right]_0^L = -\frac{aL}{n} \left[ \cos\left(\frac{nx}{L}\right) \right]_0^L = -\frac{aL}{n} (-1) - \frac{2aL}{n}$$

$$Q_x = \int y dA = \int_0^a y \left[ L - \frac{2L}{n} \arcsin\left(\frac{y}{a}\right) \right] dy$$

Gezw  $u = \frac{y}{a}$ ,  $du = \frac{dy}{a} \Rightarrow u_1 = 0, u_2 = 1$

$$p.o. \quad Q_x = \int_0^1 \left[ a^2 u \left( L - \frac{2L}{n} \arcsin u \right) \right] du = \int_0^1 \left( a^2 u L - \frac{2L}{n} a^2 u \arcsin u \right) du =$$

$$= \int_0^1 a^2 L u du - \frac{2L a^2}{n} \int_0^1 u \arcsin u du = \left[ \frac{a^2 L}{2} u^2 \right]_0^1 - \frac{2L a^2}{n} \int_0^1 u \arcsin u du =$$

$$= \frac{a^2 L}{2} - \frac{2L a^2}{n} \int_0^1 u \arcsin u du$$



Exw  $I = \int_0^1 u \arcsin u \, du$

Exw  $f(x) = \arcsin x$ ,  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

logica  $\sin(f(x)) = x \Rightarrow (\sin(f(x)))' = (x)' \Rightarrow \cos(f(x)) \cdot f'(x) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos(f(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}$

logica n zvezgizna:  $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$

Apa Exw  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - (\cos(\arcsin x))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

Apa  $I = \int_0^1 u \arcsin u \, du = \left[ \frac{u^2}{2} \arcsin u \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{u^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \, du = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{u^2}{2 \sqrt{1-u^2}} \, du$

Exw  $u = \sin w \Rightarrow du = \cos w \, dw$  Ta v e a opai:  $w_1 = 0, w_2 = \frac{\pi}{2}$

Apa  $I = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 w}{\sqrt{1 - \sin^2 w}} \cdot \cos w \, dw = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 w}{\cos w} \cos w \, dw = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 w \, dw$

$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2w}{2} \, dw = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} - \frac{\cos 2w}{2} \, dw = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left[ \frac{w}{2} - \frac{\sin 2w}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} =$

$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{8}$

Apa  $Q_x = \frac{a^2 L}{2} - \frac{2La^2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{a^2 L}{2} - \frac{2a^2 L}{8} = \frac{a^2 L}{2} - \frac{a^2 L}{4} = \frac{a^2 L}{4}$

$$Q_y = \int x \, dA = \int_0^L x \cdot a \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx$$

Definim  $u = \frac{\pi x}{L} \Rightarrow du = \frac{\pi}{L} dx$  sau  $dx = \frac{L}{\pi} du$ , iar veдем opia  $u_1 = 0, u_2 = \pi$

Apa  $Q_y = \int_0^{\pi} \frac{L}{\pi} u \cdot a \sin(u) \cdot \frac{L}{\pi} du = \int_0^{\pi} \frac{a L^2}{\pi^2} u \sin u \, du =$

$$= \frac{a L^2}{\pi^2} \int_0^{\pi} u \sin u \, du = \frac{a L^2}{\pi^2} \left[ \left[ -u \cos u \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -\cos u \, du \right] \frac{a L^2}{\pi^2} =$$


$$= \frac{a L^2}{\pi^2} \left( -\pi \cdot (-1) + [\sin u]_0^{\pi} \right) = \frac{a L^2}{\pi^2} \cdot \pi = \frac{a L^2}{\pi}$$

Apa  $x_c = \frac{Q_y}{A} = \frac{\frac{a L^2}{\pi}}{\frac{2aL}{\pi}} = \frac{L}{2}$

si  $y_c = \frac{Q_x}{A} = \frac{\frac{2L}{\pi}}{\frac{2aL}{\pi}} = \frac{a}{8}$

}  $C\left(\frac{L}{2}, \frac{a}{8}\right)$





$$A = \int_0^a \frac{\sqrt[3]{a^2}}{2} x^{\frac{1}{3}} dx = \left[ \frac{\sqrt[3]{a^2} \cdot 3}{2 \cdot 4} x^{\frac{4}{3}} \right]_0^a = \left[ \frac{3a^{\frac{2}{3}}}{8} x^{\frac{4}{3}} \right]_0^a = \frac{3}{8} a^{\frac{2}{3}} a^{\frac{4}{3}} = \frac{3a^2}{8}$$

$$Q_x = \int y dA = \int_0^{\frac{a}{2}} \left[ y \left( a - \frac{8y^3}{a^2} \right) \right] dy = \int_0^{\frac{a}{2}} \left( ay - \frac{8y^4}{a^2} \right) dy = \left[ \frac{ay^2}{2} - \frac{8}{5a^2} y^5 \right]_0^{\frac{a}{2}} =$$

$$= \frac{a}{2} \cdot \frac{a^2}{4} - \frac{8}{5a^2} \cdot \frac{a^5}{32} = \frac{a^3}{8} - \frac{a^3}{20} = \frac{5a^3 - 2a^3}{40} = \frac{3a^3}{40}$$


$$Q_y = \int x dA_2 = \int_0^a x \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2}}{2} x^{\frac{1}{3}} dx = \int_0^a \frac{x^{\frac{4}{3}} \cdot a^{\frac{2}{3}}}{2} dx = \left[ \frac{3}{7} \cdot \frac{a^{\frac{2}{3}}}{2} \cdot x^{\frac{7}{3}} \right]_0^a = \frac{3}{14} \cdot a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{7}{3}} =$$

$$= \frac{3a^3}{14}$$

$$A_{pc} \quad x_c = \frac{Q_y}{A} = \frac{\frac{3a^3}{14}}{\frac{3a^2}{8}} = \frac{8a}{14} = \frac{4a}{7} \quad \text{and} \quad y_c = \frac{Q_x}{A} = \frac{\frac{3a^3}{40}}{\frac{3a^2}{8}} = \frac{8a}{40} = \frac{a}{5} \quad \text{Apex } C\left(\frac{4a}{7}, \frac{a}{5}\right)$$



### Άσκηση 5



Για την εξίσωση  $y = \frac{h}{b^2} x^2$  έχουμε, από άσκηση 4 ότι  $Q_{x1} = \frac{bh^2}{10}$  και  $Q_{y1} = \frac{hb^2}{4}$

Αρα εδώ, για  $h=b=1$  έχουμε  $Q_{x1} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ m}^3$  και  $Q_{y1} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ m}^3$

Επίσης έχουμε  $O(0,0)$  και  $H(1,-0,2)$  άρα  $C_2(0,5,-0,1) \Rightarrow x_2=0,5, y_2=-0,1$


$$A_1 = \int_0^1 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \text{ m}^2, A_2 = 0,2 \text{ m}^2 \Rightarrow A = 0,53 \text{ m}^2$$

$$y_c = \frac{Q_{x1} + Q_{x2}}{A_1 + A_2} = \frac{Q_{x1} + A_2 y_{c2}}{A} = \frac{0,1 - 0,2 \cdot 0,1}{0,53} = \frac{0,08}{0,53} = 0,15 \text{ m}$$

$$x_c = \frac{Q_{y1} + Q_{y2}}{A} = \frac{0,25 + 0,2 \cdot 0,5}{0,53} = \frac{0,35}{0,53} = 0,66 \text{ m}$$

$C(0,66, 0,15)$

Asunon 6



$$A = \int_0^2 (e^x - \sqrt{x}) dx + \int_2^5 (-1,72x + 10,82 - \sqrt{x}) dx =$$

$$= \left[ e^x - \frac{2}{3} x \sqrt{x} \right]_0^2 + \left[ \frac{-1,72 R^2}{2} + 10,82 x - \frac{2}{3} x \sqrt{x} \right]_2^5 = 4,5 + 8,83 = 13,33 \text{ m}^2$$

$$A_2 = 2 \text{ m}^2, A_3 = 3 \cdot \sqrt{5} = 6,71 \text{ m}^2, A_5 = \frac{3 \cdot (e^2 - \sqrt{5})}{2} = 1,5 (e^2 - \sqrt{5}) = 7,73 \text{ m}^2$$

$$F_{xw} \Delta(2,1) \text{ apa } C_2(1,0,5)$$

war  $f(2,0)$  war  $A(5,5)$  oder  $C_3(3,5,1,2)$

war  $Z(2, \sqrt{5})$ ,  $A(5, \sqrt{5})$  war  $B(2, e^2)$  dpa  $C_5(3, 3, 95)$



$$Q_{x1} = \int y \delta A = \int_1^{e^2} [y(2 - \ln y)] dy = \int_1^{e^2} (2y - y \ln y) dy =$$

$$= \int_1^{e^2} 2y dy - \int_1^{e^2} y \ln y dy = \left[ y^2 \right]_1^{e^2} - \left[ \frac{y^2}{2} \ln y \right]_1^{e^2} + \int_1^{e^2} \frac{y}{2} dy =$$

$$= \left[ y^2 - \frac{y^2}{2} \ln y + \frac{y^2}{4} \right]_1^{e^2} = \left[ \frac{5y^2}{4} - \frac{y^2 \ln y}{2} \right]_1^{e^2} = 12,4 \text{ m}^3$$

$$Q_{x2} = A_2 y_{c2} = 1 \text{ m}^3$$

$$Q_{x3} = A_3 y_{c3} = 6,71 \cdot 1,12 = 7,52 \text{ m}^3$$

$$Q_{x4} = \int y \delta A = \int_0^{\sqrt{5}} (5 - y^2) y dy = \int_0^{\sqrt{5}} (5y - y^3) dy = \left[ \frac{5}{2} y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^{\sqrt{5}} = 6,25 \text{ m}^3$$

$$Q_{x5} = A_5 y_{c5} = 7,73 \cdot 3,95 = 30,53 \text{ m}^3$$

$$\text{Apa } Q_x = Q_{x1} + Q_{x2} + Q_{x3} + Q_{x4} + Q_{x5} = 45,2 \text{ m}^3$$

$$Q_{y1} = \int x \delta A = \int_0^2 [x(e^x - 1)] dx = \int_0^2 (xe^x - x) dx = \int_0^2 xe^x dx - \int_0^2 x dx =$$

$$= \left[ xe^x \right]_0^2 - \int_0^2 e^x dx - \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \left[ xe^x - e^x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 6,39 \text{ m}^3$$

$$Q_{y2} = A_2 x_{c2} = 2 \text{ m}^3$$

$$Q_{y3} = A_3 x_{c3} = 6,71 \cdot 3,5 = 23,49$$



$$Q_{y4} = \int x dA = \int_0^5 x \sqrt{x} dx = \int_0^5 x^{\frac{3}{2}} dx = \left[ \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5} \right]_0^5 = \left[ \frac{2x^2 \sqrt{x}}{5} \right]_0^5 = \frac{2 \cdot 5 \cdot \sqrt{5}}{5} = 10\sqrt{5} = 22,36 \text{ m}^3$$

$$Q_{y5} = A_5 x_5 = 7,73 \cdot 3 = 23,19$$


$$\text{Aea } Q_y = Q_{y1} + Q_{y2} + Q_{y3} - Q_{y4} + Q_{y5} = 32,71$$

$$\text{Aea } x_c = \frac{Q_y}{A} = \frac{32,71}{13,33} = 2,45 \text{ m}$$

$$\text{na } y_c = \frac{Q_x}{A} = \frac{45,2}{13,33} = 3,39 \text{ m}$$

$$\text{Aea } C(2,28, 3,39)$$

# Aloum 7



$$\begin{array}{l|l} \widehat{OAB}: (1) & C_2(1,33,0,33) \\ \widehat{ADB}: (2) & C_3(467,-0,33) \\ \widehat{OEB}: (3) & \\ \widehat{OFE}: (4) & \end{array}$$

$$\tan w = 2 \Rightarrow w = 63,43^\circ$$

For the region  $y = \frac{h}{b^2} x^2$  &  $xw$ , and area,  $Q_x = \frac{bh^2}{10}$  and  $Q_y = \frac{hb^2}{4}$

Area for  $h=b=1$  &  $xw$   $Q_{x1} = 0,1$  and  $Q_{y1} = 0,25$

$$A_1 = \int_0^1 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} m^2, A_2 = \frac{1 \cdot 1}{2} = 0,5 m^2, A_3 = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1 m^2$$


$$A_4 = \pi R^2 \cdot \frac{63,43}{360} = \frac{\pi}{5,68} = 0,55 m^2$$

$$\text{Area } A = A_1 + A_2 + A_3 - A_4 = 0,33 + 0,5 + 1 - 0,55 = 1,28 m^2$$

$$Q_{x2} = A_2 y_{c2} = 0,5 \cdot 0,33 = 0,17 m^3, Q_{y2} = A_2 x_{c2} = 0,5 \cdot 1,33 = 0,67 m^3$$

$$Q_{x3} = A_3 y_{c3} = -0,33 m^3, Q_{y3} = A_3 x_{c3} = 0,67 m^3$$





Ξέρω ότι το  $y$  είναι το (4) βρίσκω όμως την  $x$  στο  $2\omega$   
 και σε αντιστοιχία  $\frac{2 R \cdot \sin \frac{\omega}{2}}{\frac{3 \omega}{2}} = \frac{4 \cdot 1 \cdot \sin(31,75^\circ)}{3 \cdot 1,1} = \frac{4 \cdot 0,53}{3 \cdot 1,1} = \frac{2,12}{3,3} = 0,64$

$$\text{Άρα } \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{x_{c4}}{d} \Rightarrow x_{c4} = \sin(31,75^\circ) \cdot d = 0,34 \text{ m}$$

$$\text{και } \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{y}{d} \Rightarrow y = \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdot d = 0,54 \text{ m}$$

$$\text{Άρα } y_4 = -1 + 0,54 = -0,46 \text{ m}$$

$$\text{Άρα } Q_{x4} = A_4 y_{c4} = 0,55(-0,46) = -0,25 \text{ m}^3$$

$$\text{και } Q_{y4} = A_4 x_{c4} = 0,55 \cdot 0,34 = 0,19 \text{ m}^3$$

$$\text{Άρα } x_c = \frac{Q_y}{A} = \frac{Q_{y1} + Q_{y2} + Q_{y3} - Q_{y4}}{A} = \frac{0,25 + 0,67 + 0,67 - 0,19}{1,28} = \frac{1,4}{1,28} = 1,09 \text{ m}$$

$$\text{και } y_c = \frac{Q_x}{A} = \frac{Q_{x1} + Q_{x2} + Q_{x3} - Q_{x4}}{A} = \frac{0,1 + 0,17 - 0,33 + 0,25}{1,28} = \frac{0,19}{1,28} = 0,15 \text{ m}$$