

## Gradient à pas optimal : détermination du pas à l'aide de la méthode de Newton

Considérons la fonction  $f$  définie pour tout  $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$  par

$$f(v) = (v_1 - 4)^2 + 2(v_2 - 3)^2 + v_1 v_2$$

On rappelle que dans la méthode de gradient à pas optimal, le pas  $\rho_n$  change à chaque itération :

$$v_{n+1} = v_n - \rho_n \nabla f(v_n) \quad \text{où} \quad \rho_n = \arg \min_{\rho > 0} f(v_n - \rho \nabla f(v_n))$$

Posons  $g_n(\rho) = f(v_n - \rho \nabla f(v_n))$ , définie de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . À chaque itération, pour déterminer le pas optimal  $\rho_n$ , nous cherchons la solution du problème (possiblement non linéaire) suivant :

$$g'_n(\rho) = 0$$

Montrons que, pour tout  $n \geq 0$ , la dérivée de  $g_n$  est

$$\forall \rho \in \mathbb{R}, \quad g'_n(\rho) = -\nabla f(v_n) \cdot \nabla f(v_n - \rho \nabla f(v_n))$$

Afin de déterminer une valeur approchée de la solution  $g'_n(\rho) = 0$ , nous allons considérer une variante de la méthode de Newton : dans la formule de Newton donnée par

$$\rho_{k+1} = \rho_k - \frac{g'_n(\rho_k)}{g''_n(\rho_k)},$$

pour ne pas avoir à calculer  $g''_n$ , on remplace  $g''_n(\rho_k)$  par le taux d'accroissement :

$$\frac{g'_n(\rho_k + \delta) - g'_n(\rho_k)}{\delta},$$

avec  $\delta = 10^{-8}$ .

Ainsi, à chaque étape  $n$  de l'algorithme du gradient, on construit la suite

$$\begin{cases} \rho_0 \in \mathbb{R} \text{ donné} \\ \rho_{k+1} = \rho_k - \delta \frac{g'_n(\rho_k)}{g'_n(\rho_k + \delta) - g'_n(\rho_k)} \end{cases}$$

qui converge vers  $\rho_n$ , la solution du problème  $\rho_n = \arg \min_{\rho > 0} f(v_n - \rho \nabla f(v_n))$ .