

修道ワンダーフォーゲル班救急テスト 4

1. 次の文章を読み、下の問いに答えよ。(0.1×10)

山頂に向けて登山中にメンバーの一人が足をつり、そのあと吐き気と頭痛の症状を訴えたので、

1 重度の熱中症（熱射病）と判断、急いで救助要請をするとともに、2 休ませて体温を下げる処置を行った。重度の熱中症は、脳や内臓が機能しなくなり、生命の危険もあるので、救助要請はためらわずに行いたい。また、たとえ軽度の熱中症（熱失神・熱疲労）の場合でも（ ① ）分以内に改善傾向がみられない、もしくは（ ② ）時間以内に完全回復をしない場合は救助要請が必要である。

登山前には（ ③ ）ml 程度のスポーツドリンクを飲み、脱水を改善しておく。登山行動中において熱中症を予防するためには、汗などによる脱水を行うための水分補給が有効である。行動中の脱水量（ml）は、体重（kg）×行動時間（h）×脱水係数で計算できる。登山コンディションがよく、標準コースタイムで歩いた場合、脱水係数を（ ④ ）として計算し、環境温が（ ⑤ ）℃を超える夏日の場合の脱水係数は6～7、さらに歩行速度が速くなると10を超える可能性もある。このように行動中の脱水量を計算しながら、最低でも（ ⑥ ）時間毎に水分補給を行い、行動時間が（ ⑦ ）時間を超える場合は、（ ⑧ ）の補給も行う。

（令和3年度広島県県総体 救急知識課題）

問1 （ ① ）～（ ⑦ ）に入る整数値をそれぞれ答えよ。

問2 下線部1 重度の熱中症（熱射病）とあるが、その症状として適切でないものを次のア～オから一つ選び、記号で答えよ

- ア 眠りがちである
- イ 靴の紐が結べない
- ウ 体温 39 度以上。
- エ 激しい息切れ
- オ わけのわからないことを言う。

問3 下線部2 休ませて体温を下げる処置とあるが、有効でないものを次のア～オから一つ選び、記号で答えよ。

- | | |
|----------------------|----------------|
| ア 日陰に移動させる | エ 水をかけて扇ぐ |
| イ 衣服をゆるめる、脱がす。 | オ アイスパックで頭を冷やす |
| ウ 体温が 38℃台に下がるまで水に浸す | |

問4 (⑧) に入るものとして適切なものを次のア～オから一つ選び、記号で答えよ。

ア 糖分 イ 塩分 ウ 鉄分 エ 脂質 オ タンパク質

2. 次の①～⑩の文章について正しい内容のものを5つ選び、記号で答えよ (0.2×5)

- ① 低体温症を疑ったとき、「意識」は普段通りかわかればよい
- ② 靴ずれによってできた水疱はつぶさずにビニールで覆ったほうがよい
- ③ 上肢または下腿に外傷がある場合、両者ともザックを背負わず、自力移動させる
- ④ 熱射病発症者に、水を飲ませると誤嚥して、窒息・肺炎を起こす
- ⑤ 火傷の部位には、氷水・冷水で5分ほど冷却する。
- ⑥ 胸骨圧迫をする者は、2分ごとに交替する。
- ⑦ 直接圧迫止血の際、清潔なタオルで圧迫し、固く丸めたガーゼを当て、伸びないテープで巻く。
- ⑧ 骨が皮膚から飛び出た骨折は、出血部を直接圧迫せず、汚れなど放置してガーゼなどで保護する。
- ⑨ 頸動脈が触れず脳に血液が送られていない場合は、50～60回/分で胸骨圧迫を開始する。
- ⑩ 山での傷病発生時には、最悪を回避することを優先する。

解答欄

1 問1

①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

問2

--

問3

--

問4

--

2

--	--	--	--	--

(順不同)

点
