

修道名物 できるかな!?!救急 50 問アタック

以下の文章について、正しい内容のものをすべて選べ。

- ①外傷処置の際、洗浄に使用する水は飲める程度に清潔であればよい。
- ②ダニが皮膚に咬みついていたら、指でダニをつぶしてからピンセットで取り除く。
- ③熱中症の対応として、2 時間以内に症状が完全回復しない場合は休場要請を行う。
- ④靴ずれの水疱は針で一箇所に穴をあけてつぶし、厚めの絆創膏で保護する。
- ⑤出血したので保護のためにガーゼなど固く丸めたものを止血部に充て伸びるテープで圧迫固定した。
- ⑥切り傷があったので有機物を取り除かず、水を傷口に軽く注いで洗浄した。
- ⑦熱射病になったので冷水で濡らして扇いだ。
- ⑧捻挫したので RICE を実施した。C（圧迫）で軽く圧迫気味にまき、抹消の循環が悪くならないか 10 分ごとに確認する。
- ⑨止血法の一つである禁縛法は、傷口をタオルやガーゼなどで強く縛る方法。
- ⑩骨折や捻挫をすると、すぐに患部が腫れ上がる。
- ⑪やけどをした際は患部を水で冷やすが、氷は使わずに 5 分程度で一度は中断する。
- ⑫挫滅傷のように出血が多い場合も感染症を防ぐためにもまず洗浄を行うことが大事である。
- ⑬低体温症の予防には、折り畳み式水筒で湯たんぽをつくり手足を温めるのが有効
- ⑭登山行動中の水分補給を脱水量の 7～10 割を目安とし 1 時間ごとに行い行動時間が 4 時間を超える場合は塩分補給も行う。
- ⑮骨折などの大きなけがを負うと、体温の低下が心配されるので体温を保温することが大切である。
- ⑯胸骨圧迫は 1 分間当たり 60～80 回ほどで、3 分毎に交代する。
- ⑰傷病者の初期対応では、状態を把握し命に関わることを優先しなければならない。
- ⑱火傷をしたらその部位を常温水で 30 分ほど冷却する。
- ⑲火傷は手のひら 10 個分の広さ以上の面積であれば、すぐに病院へ行く。
- ⑳鼻出血は、乾燥した環境や、鼻をぶついたりすることにより、鼻中隔前方の細い血管が破れて起こることが多い。
- ㉑足首の捻挫の処置として、損傷部を心臓より 20 cm 程度高い位置に上げる。
- ㉒低体温症の中度以上では、急激に体温が下がるため軽く運動させるべきである。
- ㉓熱中症でふらついてうまく歩けず、靴ひもを結べない場合は意識が戻るまでゆっくり休ませる。
- ㉔熱射病になったものは、吐き気を催すまたは吐く事例もみられる。
- ㉕熱中症の中等症では足を 20 度、RICE における E では、足を心臓より 30 cm 高く上げる。
- ㉖捻挫をした場合は、氷や雪を利用して耐えうる限り長い時間患部を冷却することが重要だ。
- ㉗シャツを着たまま腕に熱湯がかかった時シャツをまくって患部を直接 5 分間流水にあてる必要がある。
- ㉘熱中症になった人に対して衣服をゆるめ、うちわなどで扇ぎ濡れたタオルを脇の下にあてて冷却する。
- ㉙熱湯がかかった患部を水で冷やした後、針で水疱から水を抜き、軟膏は塗らないでおく。

- ③⑩鼻血の場合は、尾翼の付け根を親指と人差し指でつまみ、10 分間、顔を仰向けにする。
- ③⑪WBGT25℃以上での登山は、予防対応や活動中止をする必要はない。
- ③⑫皮膚にとりついたダニを取り除く場合、ダニの退部を圧迫したり、頭をひねったりしてダニの口を皮膚から取りのぞく。
- ③⑬靴ずれは、まだ赤い程度のうちにダクトテープを張ると水疱ができにくくなる。
- ③⑭脱水係数は個人差・季節が変わらずとも 5 が定数であり、環境温が 25℃以上になると 6～7 になる。
- ③⑮転倒したときに腕を骨折し、折れた骨が皮膚に突き破って露出していたので、まずは止血し、傷口の汚れを取り除き清潔なガーゼを傷口にあてて固定した。
- ③⑯足の捻挫を処置するとき、足を心臓部より 20 cm 程度上げて安静にする。
- ③⑰骨折などのけがの場合、固定後は固定した部分より抹消部について、痛み・感覚・動きを 5 分毎に確認する。
- ③⑱低体温症の予防について、保温するために防寒着はたとえ濡れていても必ず着るべきである。
- ③⑲ショックとは、病気やけがにより、脳や心臓など命を司る臓器に酸素が十分送られていない状態のことである
- ④⑩3SABCDE の大原則は、命に関わることを優先する・状態が分かることが目的・2 分以内に終える・必要以上に刺激を与えないことの 4 点である。
- ④⑪SCENE（状況確認）について、何が起きているか・一人に対応できるか考慮する必要があるが、日没までどのくらいか確認する必要はない。
- ④⑫骨盤骨折を起こした際は、サムスリングを使用して 1 5 k N の圧をかける。もし傷病者が痛がったら、その手前で緩める。
- ④⑬意識の異常を確かめるとき、正常な会話ができていても、異常性を判断できるかは乏しい。
- ④⑭RICE における I（冷却）は 1 回につき、2 0～3 0 分にとどめ、痛みが出たら再度冷却する。
- ④⑮circulation（循環）において、確認するポイントは、脈をとる・手のひらを触る・出血の確認である。
- ④⑯airway（気道）において、気道確保の手順は、舌根の沈下阻止→HAINES 体位に促す→口内の異物の除去が鉄則である。
- ④⑰breathing（呼吸）において、呼吸を普通にしているか 10 秒程度で確認し、鼻をつまむ→気道確保→息を吹き込み、胸の上りを確認するという手順で人工呼吸を行う。
- ④⑱止血を行うとき、深くえぐれた傷にはガーゼを表面上軽く当てるだけでよい。
- ④⑲熱射病では、体を冷水に短時間浸すことが有効であり、体温を 3 6～3 7 度まで下げる。
- ⑤⑩disability(身体障害)について、全身を圧迫して確認するとき、顔の表情を見ながら触る・背骨の突起を首から腰まで 1 つずつ押す（脊髄の場合）・恥骨結合を抑える、腰を両側から包むように圧迫する（骨盤部の場合）

（解答）
