

1. () 關於Medulloblastoma，下列敘述何者錯誤？

A) Molecular classification 可分成Wingless、Sonic Hedgehog、Group 3、Group 4。其中以 Group 4 預後最差。

B) 標準的放射治療為Cranial spinal irradiation 再加上局部boost。

C) 針對medulloblastoma in infants，常常使用化學治療避免或延後放射治療的時程

D) Medulloblastoma 最常發生在 4th ventricle，臨床上可造成parinaud syndrome

(1 答案): A (*Pediatric*)

(1 參考文獻): Perez & Brady' s, 7th edition, Ch 88

2. () 關於Germ cell tumors of the CNS，下列敘述何者錯誤？

A) 在台灣，Germ cell tumors of the CNS 的發生率比美國高

B) 過去對於localized CNS germinoma 的標準治療為RT alone；然而使用neoadjuvant 加上放射治療的方式因能降低RT dose 所以漸漸被接受。

C) Localized CNS germinoma 放射治療照野包含whole ventricle + local boost

D) Nongerminomatous germ cell tumors 中的mature teratoma 對放化療效果較差，治療通常採用neoadjuvant C/T + CSI 再加上局部boost。

(1 答案): D (*Pediatric*)

(1 參考文獻): Perez & Brady' s, 7th edition, Ch 88

3. () 關於Neuroblastoma，下列敘述何者錯誤？

A) 最常發生的位置在adrenal medulla 和 paraspinal ganglia in the abdomen or pelvic。

B) Neuroblastoma 不治療也可能會spontaneous remission 為ganglioneuroma

C) Diagnostic workup 應包含MIBG scan 及urinary catecholamines 等檢查

D) CTV 應包含initial tumor volume tumor bed

(1 答案): D (*Pediatric*)

(1 參考文獻): Perez & Brady' s, 7th edition, Ch 90

4. () 關於Wilms tumor，下列敘述何者錯誤？

A) Wilms tumor 常伴隨congenital diseases，包括WAGR syndrome、Beckwith-Wiedemann、Denys-Drash syndrome

B) Unfavorable histology 包含anaplastic tumors, clear cell sarcoma, 以及rhabdoid tumor of the kidney

C) Staging workup 應使用core needle biopsy 以取得足夠的組織進行分子檢驗

D) 放射治療應於術後10 日內開始，降低腹腔復發機率。

(1 答案): C (*Pediatric*)

(1 參考文獻): Perez & Brady' s, 7th edition, Ch 89

5. () 關於Ewing sarcoma，下列敘述何者錯誤？

A) Microscopic 外觀為 small, blue, round cells。

B) 95% 為 t(11;22) or t(21;22) translocation。

C) 在初診斷時即有 20-25% 發生遠端轉移

D) Definitive concurrent chemoradiotherapy 加上 adjuvant chemotherapy 為主要治療

(1 答案): D (*Pediatric*)

(1 參考文獻): Perez & Brady' s, 7th edition, Chap 92