

# Info: Tadalafil verkauft als XTC

Februar 2015

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Name           | <b>Herz</b>        |
| Gewicht        | 236.1 mg           |
| Länge x Breite | 6.6 x 8.1 mm       |
| Dicke          | 4.9 mm             |
| Bruchrille     | ja                 |
| Farbe          | rot                |
| Inhaltsstoff   | <b>Tadalafil</b>   |
| Getestet in    | Bern, Februar 2015 |



## Risikoeinschätzung

Tadalafil ist ein Potenzmittel und kein MDMA. Es stellt sich keine psychoaktive Wirkung ein, sondern eine Erektion beim Mann. Werden mehrere dieser Pillen konsumiert, besteht die Gefahr, eine hohe Menge Tadalafil einzunehmen. Dadurch verstärken sich die Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Herz-Kreislaufstörungen und Verdauungsbeschwerden. In seltenen Fällen kann es zu einer langanhaltenden Erektion kommen. Tadalafil nie mit Poppers kombinieren!

## Info zu Tadalafil

**Allgemeine Infos:** Tadalafil (Cialis®) ist ein Potenzmittel und kein MDMA. Wichtig: Die gleichzeitige Einnahme von Tadalafil mit Poppers ist lebensgefährlich. Durch die kombinierte Wirkung auf den Blutdruck droht ein akuter lebensbedrohlicher Blutdruckabfall. In diesem Fall unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

**Wirkung:** Tadalafil wirkt ähnlich wie Sildenafil (Viagra®) indem es das Enzym Phosphodiesterase-5 (PDE-5) hemmt. Dieses ist dafür verantwortlich, dass eine Erektion abgebaut wird, damit durch eine Dauererektion nicht das Gewebe des Schwellkörpers durch Mangel durchblutung abstirbt. Dadurch kommt es bei einer sexuellen Stimulation leichter zu Erektionen, die auch länger anhalten. Wirkungseintritt und -dauer: nach 30-60 Min. / 24-36 Stunden.

**Nebenwirkungen:** Selten werden Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen (Niedriger Blutdruck) beobachtet, weiter treten „in der Praxis“ anscheinend häufiger Muskelschmerzen auf, die mehrere Tage anhalten können. Berichte von plötzlichem Hörverlust, manchmal begleitet von Tinnitus oder Schwindel, liegen vor. Häufige Nebenwirkungen sind unter anderem Kopfschmerzen, Verdauungsstörung, verstopfte Nase oder auch Rückenschmerzen. Gelegentliche Begleiterscheinungen können sich in Form von einem trockenen Rachen, Müdigkeit oder auch Tachykardie (Herzrasen) äußern. In seltenen Fällen kommt es zur Dauererektion.

## Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke (3dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.