

Vorsicht: verkauft als XTC's

Dezember 2014

Name	Herz
Gewicht	149.1 mg
Länge x Breite	7.1 x 7.1 mm
Bruchrille	ja
Farbe	blau
Inhaltsstoffe	Metandienon (Methandrostenolon), Methyltestosteron (M1T)
Getestet in	Bern, Dezember 2014



Risikoeinschätzung

Diese als XTC verkaufte Pille beinhaltet kein MDMA, sondern die beiden Wachstumshormone Metandienon und Methyltestosteron. Das Risiko liegt dabei vor allem beim regelmässigen Konsum, beide Substanzen können Leberschäden hervorrufen. Es können leicht stimulierende Effekte und ein Gefühl von Stärke auftreten, weitere psychoaktive Wirkungen stellen sich aber nicht ein.

Info zu Metandienon (Methandrostenolon)

Allgemeine Infos:

Wirkung: Kurzzeitiges Gefühl von Kraft und Stärke, leicht stimulierender Effekt.

Nebenwirkungen: Neben der anabolen Wirkung treten als Nebenwirkungen Bluthochdruck, Akne, Alopezie (Haarausfall auf dem Kopf), Zunahme des Unterhautfettgewebes, Wassereinlagerung im Gewebe auf und es kann zu einer Ausbildung einer weiblichen Brust beim Mann kommen. Bei Männern kommt es insbesondere zu einer Beeinträchtigung der Hormon- und Spermienproduktion und in der Folge zu vorübergehender Unfruchtbarkeit. Bei längerer Anwendung von Metandienon ist eine Leberschädigung zu erwarten.

Info zu Methyltestosteron (M1T)

Allgemeine Infos:

Wirkung: Methyltestosteron ist ein synthetisch hergestellter Arzneistoff aus der Gruppe der anabolen Steroide und ist ein Abkömmling (Derivat) des physiologisch vorkommenden Sexualhormons Testosteron. Methyltestosteron gehört zu den einzigen oral wirksamen Testosteronwirkstoffen. Heutzutage findet das Methyltestosteron im Bodybuilding nur noch sehr selten Beachtung. Da oral verabreichtes Testosteron während dem First-Pass-Effekt in der Leber quasi vollständig inaktiviert, d.h. zerstört wird. Vor allem bei sublingualer Einnahme (im Mund/auf der Zunge) stellen sich ein leicht stimulierender Effekt ein und der Schmerz wird runtergesetzt.

Nebenwirkungen: Fettige Haut, Akne, Haarwuchs am Körper und Kopfharausfall, treten zumeist schon relativ kurz nach dem Einnahmebeginn auf.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der

Vorsicht: verkauft als XTC's

Dezember 2014

Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.

- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke (3dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.