

Information: XTC-Tablette mit Tadalafil

März 2018

Name	Herz
Gewicht	230.9 mg
Länge x Breite	6.6 x 8.2 mm
Dicke	4.9 mm
Bruchrille	nein
Farbe	rosa
Inhaltsstoff	Tadalafil 18.8 mg
Getestet in	Bern (DIB), März 2018



Risikoeinschätzung

Diese Tablette enthält kein MDMA, sondern 18.8 mg Tadalafil. Tadalafil ist ein Potenzmittel, welches zur Behandlung von Erektionsstörungen beim Mann eingesetzt wird. Da sich nach der Einnahme dieser Tablette keine psychoaktive Wirkung einstellt, besteht die Gefahr, dass nachdosiert und dadurch ungewollt eine hohe Dosis Tadalafil eingenommen wird, welches zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schwindel, tiefem Blutdruck und Herz-Kreislaufstörungen führen kann. Tadalafil sollte nie mit Poppers kombiniert werden! Wechselwirkungen zwischen diesen Substanzen können lebensbedrohlich sein!

Info zu Tadalafil

Allgemeine Infos: Tadalafil (Cialis®) ist ein Potenzmittel und kein MDMA. Wichtig: Die gleichzeitige Einnahme von Tadalafil mit Poppers ist lebensgefährlich. Durch die kombinierte Wirkung auf den Blutdruck droht ein akuter lebensbedrohlicher Blutdruckabfall. In diesem Fall unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Wirkung: Tadalafil wirkt ähnlich wie Sildenafil (Viagra®) indem es das Enzym Phosphodiesterase-5 (PDE-5) hemmt. Dieses ist dafür verantwortlich, dass eine Erektion abgebaut wird, damit durch eine Dauererektion nicht das Gewebe des Schwellkörpers durch Mangel durchblutung abstirbt. Dadurch kommt es bei einer sexuellen Stimulation leichter zu Erektionen, die auch länger anhalten. Wirkungseintritt und -dauer: nach 30-60 Min. / 24-36 Stunden.

Nebenwirkungen: Selten werden Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen (Niedriger Blutdruck) beobachtet, weiter treten „in der Praxis“ anscheinend häufiger Muskelschmerzen auf, die mehrere Tage anhalten können. Berichte von plötzlichem Hörverlust, manchmal begleitet von Tinnitus oder Schwindel, liegen vor. Häufige Nebenwirkungen sind unter anderem Kopfschmerzen, Verdauungsstörung, verstopfte Nase oder auch Rückenschmerzen. Gelegentliche Begleiterscheinungen können sich in Form von einem trockenen Rachen, Müdigkeit oder auch Tachykardie (Herzrasen) äußern. In seltenen Fällen kommt es zur Dauererektion.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke (3dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.