

## Warnung: no name

Juli 2012

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Name         | <b>no name</b>         |
| Gewicht      | 183.5 mg               |
| Durchmesser  | 9.1 mm                 |
| Dicke        | 2.3 mm                 |
| Bruchrille   | ja                     |
| Farbe        | weiss                  |
| Inhaltsstoff | <b>Methadon 100 mg</b> |
| Getestet in  | Zürich, Juli 2012      |



### Risikoeinschätzung

Diese Tablette wurde als Ecstasy verkauft, enthält aber Methadon! Für Opiat-ungewohnte Personen kann Methadon tödlich sein! Vom Konsum dieser Tabletten raten wir dringend ab. Auf keinen Fall mit Alkohol, Schlafmitteln und anderen beruhigenden Substanzen mischen, dies hat lebensbedrohliche Folgen!

### Info zu Methadon

**Allgemeine Infos:** Methadon ist ein vollsynthetisches, stark schmerzstillendes Opioid. Methadon wird in der Schweiz zur Behandlung von starken Schmerzen und als Ersatzstoff (Substitutionsmittel) bei der Behandlung einer Heroinabhängigkeit verwendet.

**Wirkung:** Methadon wirkt ähnlich wie andere Opiate, z.B. Heroin oder Codein: Schmerzlindernd, dämpfend, ausgleichend-beruhigend, angstlösend. Der euphorische "Flash" des Heroins fehlt. Nach der Einnahme dauert es ca. 1/2 Stunde bis zum Wirkungseintritt. Nach ungefähr 4 Stunden ist der Wirkungshöhepunkt erreicht und die mittlere Wirkungsdauer liegt bei 25 Stunden!

**Nebenwirkungen:** Verengte Pupillen, schwere Atemdepression, starker Blutdruckabfall, Herzrhythmusstörungen, Hyperthermie, Bewusstseinsstörungen bis zum Koma und dem Tod durch Erstickten. Bei Personen welche Opiate nicht gewöhnt sind, kann der Konsum von Methadon schon in geringen Mengen lebensbedrohlich sein. Opiat-Überdosierungen können bei rascher medizinischer Intervention behandelt werden. Die gleichzeitige Anwendung von Zentralnervensystem dämpfenden Substanzen (Alkohol, Antidepressiva, GHB/GBL, Barbiturate, Benzodiazepine) verstärkt die Nebenwirkungen von Methadon und ist lebensgefährlich!

**Langzeitrisiken:** Regelmässiger Methadonkonsum führt zu Abhängigkeit mit körperlichen Symptomen.

### Safer Use Regeln