

Warnung: NBOMe verkauft als LSD

Oktober 2017

Name	Unbekannt
Farbe	blau, grün, gelb
Inhaltsstoffe	25C-NBOMe 995 µg, 25B-NBOMe 523 µg
Getestet in	Zürich, Oktober 2017



Risikoeinschätzung

Dieser Filz enthält kein LSD, sondern eine extrem hohe Dosis 25C-NBOMe und 25B-NBOMe! Diese beiden Substanzen können zu peripheren Blutgefässverengungen führen und stehen im Zusammenhang mit einigen Todesfällen in Europa. Besonders bedenklich ist, dass die Aufnahme und der Abbau dieser Substanzen von Person zu Person sehr unterschiedlich ausfallen können. Beide Substanzen wirken direkter und schneller, wenn sie sublingual (unter der Zunge) über die Schleimhäute aufgenommen werden. Wenn die Substanzen oral (geschluckt) eingenommen werden, kann es zu einer schwächeren und/oder zeitlich verzögerten Wirkung kommen. Dadurch besteht die Gefahr, dass nachdosiert und ungewollt überdosiert wird. Aufgrund der schwierigen Handhabung und auch da die Substanzen kaum erforscht sind, raten wir vom Konsum ab!

Info zu 25C-NBOMe

Allgemeine Infos: 25C-NBOMe*HCl gehört zur Gruppe der Phenethylamine, die Substanz ist noch potenter als 25I-NBOMe*HCl. Dosis: bis 0.5 mg, Dosen ab 0.5 mg werden als sehr stark bezeichnet.

Wirkung: Typisch für Phenylalkylamintrips, das heisst verstärkte Wahrnehmung der Verdauung und des Darms (gastrointestinales Gefühl) sowie stark sensibilisiertes Tastgefühl. Visuelle Effekte stellen sich zwar ein, stehen aber weniger im Vordergrund als bei LSD. Gemäss User-Berichten wirkt 25C-NBOMe*HCl von Mal zu Mal unterschiedlich, die Wirkung lässt sich nicht voraussagen, auch wenn die gleiche Dosis eingenommen wurde. Der Konsum führt nicht zur Appetitlosigkeit, einem trockenen Mund oder seltsamer Sensorik (Geschmacksinn) und unterscheidet sich somit deutlich von LSD, DOI, 2C-B und 2C-I. Wirkungseintritt: sublingual nach ca. 15 bis 120(!) min., inhaliert nach 5 bis 60(!) Min. Wirkdauer: sublingual 6-10 (!) Std., inhaliert 4-6 Std.

Nebenwirkungen: Verschiedene Meldungen weisen darauf hin, dass es zu einer peripheren Gefässverengung kommen kann, welche medizinisch behandelt werden muss. Symptome sind Kälte, Blauanlaufen und taube Finger, Lippen, Nase und andere Extremitäten (Gliedmassen). Das Taubheitsgefühl kann bis zur einer Woche nach dem Konsum anhalten. Der Konsum kann auch zu Schwellung an Händen, Füßen oder Gesicht führen. Aufgrund der komplexen Substanzaufnahme soll bei 25C-NBOMe*HCl nie nachdosiert werden.

Info zu 25B-NBOMe

Allgemeine Infos: 25B-NBOMe*HCl gehört zur Gruppe der Phenethylamine und ist ein Derivat von 2C-B.

Dosierung: bis 0.7mg., Dosen ab 0.8mg. werden als sehr stark bezeichnet.

Wirkung: Wirkungseintritt / Wirkdauer: sublingual nach ca. 15 bis 120(!) Min. / sublingual 6-10 Std. (Die Wirkung von

Warnung: NBOMe verkauft als LSD

Oktober 2017

25B-NBOMe kann in seltenen Fällen bereits bei niedrigen Dosierungen 24 Stunden oder gar noch länger anhalten). 25B-NBOMe ist ein hochpotentes, stimulierend-wirkendes Halluzinogen. Die Wirkung ist sehr stark von Dosis, Set und Setting abhängig. Als Halluzinogen intensiviert und verfremdet 25B-NBOMe deine Sinneswahrnehmungen und das Raum-Zeit-Empfinden verändert sich stark. User berichten zudem von einer euphorisierenden, aphrodisierenden und emphatiesteigenden Wirkung. Auch wirkt 25B-NBOMe von Mal zu Mal unterschiedlich, weshalb sich die Wirkung schlecht voraussagen lässt.

Nebenwirkungen: Risiken: Neben den halluzinogen-typischen Risiken (Angstzustände, Panik, Paranoia etc.) weisen verschiedene Meldungen darauf hin, dass der Konsum von 25B-NBOMe zu einer Gefässverengung (Vasokonstriktion) führen kann, welche medizinisch behandelt werden muss. Symptome sind Kälte, Blauanlaufen und Taubheitsgefühle an den Extremitäten (Gliedmassen). Das Taubheitsgefühl kann bis zu einer Woche nach dem Konsum anhalten. Der Konsum kann auch zu Schwellung an Händen, Füßen oder Gesicht führen. Es gab bereits Fälle in denen die Einnahme hoher Dosierungen 25B-NBOMe zu Organversagen und anderen tödlichen Vergiftungserscheinungen führte, selbst bei Menschen die nicht durch Krankheiten vorbelastet waren. 25B-NBOMe wirkt vasokonstriktiv, also gefäßverengend. Dies kann bei Menschen mit Herz- oder Blutdruckproblemen sehr gefährlich sein und der Mischkonsum mit anderen vasokonstriktiven Substanzen (wie Uppern, Empathogenen etc.) kann schnell lebensgefährlich sein!

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste einen halben Filz an und warte nach der Einnahme 2 Stunden, um die Wirkung abschätzen zu können.
- NBOMe Trips sind im Gegensatz zu LSD bitter.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke (3dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.
- Aufgrund der komplexen Substanzaufnahme sollte bei 25C-NBOMe und 25B-NBOMe nie nachdosiert werden.