

# Warnung: Falschdeklaration Xanax Tablette

Februar 2020

Name	<b>X / ANA / X</b>
Gewicht	345.2 mg
Länge x Breite	15.2 x 5.1 mm
Dicke	3.5 mm
Bruchrille	ja
Farbe	weiss
Inhaltsstoff	<b>Etizolam 2.1 mg</b>
Getestet in	Bern (DIB), Februar 2020



## Risikoeinschätzung

Diese im Internet als Xanax verkaufte Tablette enthielt nicht das zu erwartende Benzodiazepin Alprazolam, sondern Etizolam.

Etizolam ist betreffend Wirkungsstärke ca. 1.5-mal stärker als Alprazolam. Aufgrund des hohen Wirkstoffgehaltes, wird vom Konsum abgeraten!

Auch bei Medikamenten kann es zu Falschdeklarationen kommen. Wir raten davon ab Medikamente im Internet zu kaufen und ohne ärztliche Verschreibung zu konsumieren!

## Info zu Etizolam

**Allgemeine Infos:** Etizolam gehört zur Stoffgruppe der Benzodiazepine. Benzodiazepine sind Arzneistoffe mit angstlösenden, krampflösenden, beruhigenden und schlaffördernden Eigenschaften. Sie werden unter anderem gegen Angst-, Erregungs- und Spannungszustände, Schlafstörungen und Epilepsie eingesetzt. Etizolam wird aufgrund seiner besonders hypnotischen Wirkstärke vorrangig bei Schlafstörungen eingesetzt, kann aber auch als angstlösender Arzneistoff Verwendung finden.

**Dosierung:** 0.5-1 mg leichte Wirkung 1-2 mg mittlere Wirkung 2-4 mg starke Wirkung

**Wirkung:** Wirkungseintritt / Wirkdauer: nach ca. 30-45 Min. / ca. 10-20 Std. Schlaffördernd, beruhigend, angstlösend, muskelentspannend, dämpfend, leicht euphorisierend und krampflösend.

**Nebenwirkungen:** Mögliche Nebenwirkungen beim Konsum von Etizolam sind motorische Schwierigkeiten, Schwindel, Blackouts / Gedächtnisverlust (in hohen Dosen), Gefühlslosigkeit, Müdigkeit, Gereiztheit, Kopfschmerzen, Aggressionen, Schlaflosigkeit. Bei Epileptikern kann es zu Krampfanfällen führen. Beim Mischen mit anderen Downern (Alkohol, GHB/GBL, Opioiden usw.) kann es zu gefährlichen Wechselwirkungen (die Wirkung wird verstärkt) kommen und es besteht die Gefahr einer Atemlähmung! Zudem kann es zu einer Blutdrucksenkung kommen. Dies gilt auch bei einem Mischkonsum mit einer Upper Substanz (Kokain, Amphetamin usw.). Der Körper ist einer hohen Belastung ausgesetzt, was zu einem Kreislaufkollaps führen kann.

**Langzeitrisiken:** Benzodiazepine haben ein hohes Abhängigkeitspotential.

## Safer Use Regeln

- Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.

## Warnung: Falschdeklaration Xanax Tablette

Februar 2020

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal eine Drittel Tablette an, da auf dem Schwarzmarkt immer wieder Falschdeklarationen im Umlauf sein können.