

# Warnung: Quadrat

April 2012

Name	<b>Quadrat</b>
Gewicht	282.8 mg
Durchmesser	8.1 mm
Dicke	5.4 mm
Bruchrille	nein
Farbe	grün
Inhaltsstoff	<b>Methylon 134.8 mg</b>
Getestet in	Zürich, April 2012



## Risikoeinschätzung

Methylone ist kein MDMA! Die Nebenwirkungen und die (Langzeit-)Risiken von Methylone sind kaum erforscht. Da es bis zum Wirkungseintritt von Methylone länger dauert als bei MDMA, besteht die Gefahr, dass nachgelegt und Methylone in hohen Dosen konsumiert und somit überdosisiert wird.

## Info zu Methylon

**Allgemeine Infos:** Substanz: Methylon (2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) propan-1-one oder Methylenedioxy-Methcathinon) gehört zur Gruppe der Phenethylamine. Konsumformen: Geschluckt, geschnupft und selten intravenös gespritzt. Dosierung: Oral: 100 bis max. 180mg, nasal: 50 bis max. 120mg. Höhere Dosen und „nachspicken“ führt zu keiner Intensivierung des Flashes.

**Wirkung:** Die Wirkung ist vergleichbar mit MDMA, ist jedoch weniger empathogen und entaktogen. Euphorie, gesteigertes Mitteilungsbedürfnis, erhöhte Ausdauerfähigkeit, verringertes Schlafbedürfnis und veränderte visuelle und Zeitwahrnehmung können auftreten. Wirkungseintritt: bis 75 Min. (schneller bei Einnahme auf leeren Magen). Wirkdauer: 3-6 Std.

**Nebenwirkungen:** Hyponatriämie (zu niedriger Natriumspiegel im Blut), Erweiterung der Pupillen, Erschöpfung der Serotoninreserven, Unruhe, Rastlosigkeit bis hin zu Paranoia, Verwirrtheit, Kieferzittern (sogenannter „Beißer“ oder „Kauer“), Erhöhung der Körpertemperatur (Dehydration = Gefahr des Austrocknens) und des Pulsschlags sowie Schlafstörungen. Nach dem Konsum können auch körperliche Erschöpfung, Lethargie, Apathie und depressive Verstimmung auftreten.

**Langzeitrisiken:** Es liegt noch kein gesichertes Wissen zu Langzeitrisiken vor.

## Safer Use Regeln

- Gekauftes MDMA antesten, das heisst: kleinere Menge als üblich nehmen, ca. 2 Stunden warten und die Wirkung abwarten.
- Bei Verdacht auf Methylone nicht einfach nachlegen.
- Aufgrund der mangelhaften Wissenslage sollte auf den Konsum von Methylone verzichtet werden.