

Information: XTC-Tablette mit Sildenafil

August 2018

Name	USA
Gewicht	566.2 mg
Länge x Breite	10.6 x 15.1 mm
Dicke	5.6 mm
Bruchrille	nein
Farbe	gelb
Inhaltsstoff	Sildenafil (Viagra®)
Getestet in	Zürich, August 2018



Risikoeinschätzung

Diese Tablette enthält kein MDMA, sondern Sildenafil. Sildenafil ist ein Potenzmittel, welches zur Behandlung von Erektionsstörungen beim Mann eingesetzt wird. Da sich nach der Einnahme dieser Tablette keine psychoaktive Wirkung einstellt, besteht die Gefahr, dass nachdosiert und dadurch ungewollt eine hohe Dosis Sildenafil eingenommen wird, welches zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwindel, Erröten und Verdauungsstörungen führen kann. Sildenafil sollte nie mit Poppers (Amylnitrit) kombiniert werden! Wechselwirkungen zwischen diesen Substanzen können lebensbedrohlich sein!

Info zu Sildenafil (Viagra®)

Allgemeine Infos: Sildenafil ist ein Potenzmittel, welches zur Behandlung von Erektionsstörungen beim Mann eingesetzt wird.

Wirkung: Wirkungseintritt / Wirkdauer: nach ca. 30-60 Min. / ca. 5 Stunden Sildenafil wirkt indem es das Enzym Phosphodiesterase-5 (PDE-5) hemmt. Dieses ist dafür verantwortlich, dass eine Erektion abgebaut wird, damit durch eine Dauererektion nicht das Gewebe des Schwellkörpers durch Mangel durchblutung abstirbt. Dadurch kommt es bei einer sexuellen Stimulation leichter zu Erektionen, die auch länger anhalten.

Nebenwirkungen: Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwindel, Veränderungen des Farbsehens, Erröten und Verdauungsstörungen. Sehr selten sind schwere Nebenwirkungen wie ein Schlaganfall, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, plötzlicher Herztod und Krampfanfälle möglich. In seltenen Fällen kommt es zur Dauererektion. Wichtig: Die gleichzeitige Einnahme von Sildenafil und Poppers (Amylnitrit) ist lebensgefährlich. Durch die kombinierte Wirkung droht ein lebensbedrohlicher Blutdruckabfall. In diesem Fall unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen!

Überdosierung: Da sich nach der Einnahme dieser Tablette keine psychoaktive Wirkung einstellt, besteht die Gefahr, dass nachdosiert und dadurch ungewollt eine hohe Dosis Sildenafil eingenommen wird, welches zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwindel, Erröten und Verdauungsstörungen führen kann.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal eine drittel Pille an, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.
- Akzeptiere, wenn die Wirkung zu Ende geht, denn «Nachspicken» erhöht die Toxizität (Giftigkeit) von MDMA.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen.