

Warnung: WY

Oktober 2012

Name	WY
Gewicht	119.9 mg
Durchmesser	6.1 mm
Dicke	5.3 mm
Bruchrille	nein
Farbe	grün
Inhaltsstoff	2C-B 10.8 mg
Getestet in	Zürich, Oktober 2012



Risikoeinschätzung

Dieses Logo ist sonst als "Thai-Pille" bekannt und enthält meist als einzigen Inhaltsstoff die starke Stimulanz Methamphetamin. Die bei uns abgegebene Pille enthielt aber das Halluzinogen 2C-B. Die unbewusste Einnahme von Halluzinogenen kann zu starken psychischen Belastungen führen. Im schlimmsten Fall können psychische Erkrankungen ausgelöst werden. 2C-B entfaltet schon in kleinen Mengen seine Wirkung. Da sich die volle Wirkung erst nach 60 Minuten einstellt, besteht die Gefahr, dass nachdosiert und somit eine hohe Dosis 2C-B eingenommen wird. Halluzinogene Wirkungen können an Partys, im speziellen unter vielen Leuten und von unerfahrenen Konsumenten als unangenehm empfunden werden und führen dadurch schnell zu einer psychischen Überforderung.

Info zu 2C-B

Allgemeine Infos: 2C-B (2,5 Dimethoxy-4-Brom-Phenylethylamin) ist ein synthetisch hergestelltes Meskalinderivat.

Dosierung: geschluckt 5 bis max. 25 mg. 2C-B wirkt schon in kleinen Mengen, 2mg mehr oder weniger haben einen grossen Einfluss auf die Wirkung. Dosiere vorsichtig!

Wirkung: Wirkungseintritt: geschluckt nach 30-60 Min., geschnupft nach 5-10 Min. Wirkdauer: 2C-B: ca. 4-8 Std. Wahrnehmungen und Gefühle werden intensiver. Ab 10-15 mg erhält die Wirkung einen halluzinogenen Charakter. Grenzen zwischen Innen und Aussen lösen sich auf. Farbige Muster und leuchtende Felder um Personen und Gegenstände werden wahrgenommen. Der Rausch dauert weniger lang und wird als weniger tief empfunden als bei LSD.

Nebenwirkungen: Die Pupillen weiten sich, der Blutdruck steigt an, und es kann zu Übelkeit, Schweissausbrüchen und Schwindelanfällen kommen. Magen- und Darmbeschwerden und leichte allergische Reaktionen (Husten aufgrund vermehrter Schleimproduktion) treten vereinzelt auf. Orientierungslosigkeit, Verwirrung und Angstgefühle bis hin zur Todesangst sind Risiken auf psychischer Ebene. Der Konsum kann latente (verborgene) psychische Störungen zum Vorschein treten lassen!

Langzeitrisiken: Körperliche Langzeitrisiken sind nicht erforscht. Personen mit Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Diabetiker/innen gehen beim Konsum von 2C-B ein erhöhtes Risiko ein.

Safer Use Regeln

- Gekaufte Ecstasy-Pille antesten, das heisst: 1/2 Pille nehmen, ca. 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Genügend Wasser und keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen

Warnung: WY

Oktober 2012

- Bei Verdacht auf unbekannte oder andere Inhaltsstoffe nie nachspicken, man weiss nicht, welche Nebenwirkungen (hohe) Dosen dieser Substanzen mit sich ziehen können