

CODES EXAM

Module IS.2703

Professor GASTON

Date 04/04/2026

Code S2-02-G2

First name / Prénom

ANGE NOLWEN

NAME / NOM

DJUISSI KENMODE

SIGNATURE



GROUP / GROUPE

G 66 B

0 ☐ ☐ A ☐1 ☐ ☐ B ☒2 ☐ ☐ C ☐3 ☐ ☐ D ☐4 ☐ ☐ E ☐5 ☐ ☐ F ☐6 ☒ ☒ G ☐7 ☐ ☐ H ☐8 ☐ ☐ I ☐9 ☐ ☐ J ☐STUDENT ID /
ID ETUDIANT

63887

0 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 23 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 34 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 45 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 56 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 67 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 78 ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 89 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 9

EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

Lecture notes

Pycopié de cours

YES ☐ NO ☒Double-sided handwritten
sheet(s)Feuille(s) recto-verso
manuscrite(s)YES ☒ NO ☐

Max number 0 1

laptop computer

Ordinateur portable

YES ☐ NO ☒

Scientific calculator

Calculatrice scientifique

YES ☒ NO ☐

Scratch paper sheet(s)

Feuille(s) de papier de
brouillonYES ☒ NO ☐

Max number 0 2

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

20

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

10





INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type “choix multiples” (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale $m \cdot 10^e$ avec $1 \leq |m| < 10$. La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et e est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

- 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	dBm
	1	

- 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	dBm
	1	

- 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	
	2	

- Si $e = 0$, la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format $m \cdot 10^e$, with $1 \leq |m| < 10$. The mantissa contains the **significant digits**, and e is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.
- Examples :

- 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10 1	dBm

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10 1	dBm


- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10 2	

- If $e = 0$, the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

QUESTION 1 [2]

Soit une image $f(x, y)$ de dimensions 512×512 codée sur 256 niveaux de gris. La figure ci-dessous montre l'image f et son histogramme normalisé.



Quel est le niveau de gris g le plus représenté et combien de pixels ont-ils ce niveau de gris ?



A. $g = 158, 17\,140$ pixels



B. $g = 158, 34\,280$ pixels



C. $g = 150, 17\,140$ pixels




D. $g = 150, 34\,280$ pixels

QUESTION 2 [3]

Mettre en correspondance les images et les histogrammes.




I1



H1




I2



H2



I3



H3



A. I1/H3 ; I2/H2 ; I3/H1



B. I1/H3 ; I2/H1 ; I3/H1



C. I1/H1 ; I2/H2 ; I3/H3



D. I1/H2 ; I2/H1 ; I3/H3

QUESTION 3 [4]

Une image $f(x, y)$, 250×400 pixels a l'histogramme suivant :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$H(k)$	577	16585	27398	12953	11666	16431	12294	2096

Quelle est la probabilité qu'un pixel ait un niveau de gris supérieur ou égal à 5 ? Donner le résultats avec une précision de deux décimales

Value / Valeur

Unity / Unité


3.08	.10	-1	3.08
------	-----	----	-----------------

QUESTION 4 [3]


Mettre en correspondance les image et les fonctions de répartition.




I1



I2



I3


☐

A. I1/F1 ; I2/F2 ; I3/F3

☒

B. I1/F2 ; I2/F1 ; I3/F3

☐

C. I1/F1 ; I2/F3 ; I3/F2

☐

D. I1/F3 ; I2/F2 ; I3/F1

QUESTION 5 [3]

On applique une calibration linéaire $y = ax + b$ à une image codée sur $[0,1]$. Le niveau de gris minimal ans l'image source est 0.16. Le niveau de gris maximal est 0.87. Que vaut a ? (Précision de 2 décimales)

Value / Valeur

Unity / Unité

1.41	.10	0	
------	-----	---	--

QUESTION 6 [4]

Une image $f(x, y)$, 250×400 pixels a l'histogramme suivant :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$H(k)$	577	16585	27398	12953	11666	16431	12294	2096

Calculer $F(4)$ où F est la fonction de répartition (précision de deux décimales)

Value / Valeur

Unity / Unité

6,92	.10	-1	
------	-----	----	--

QUESTION 7 [3]

Soit une image $f(x, y)$ codée sur $N = 8$ niveaux de gris. On calcule la transformation d'égalisation d'histogramme $T(k)$ avec les données suivantes :


k	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(k)$	0.006	0.166	0.274	0.130	0.117	0.164	0.123	0.021
$F(k)$	0.006	0.172	0.446	0.575	0.692	0.856	0.979	1.000
$T(k)$	0	1	3	4	5	6	7	7

Cocher la réponse exacte


☐A. $T(2) = 2, T(4) = 5, T(6) = 7$ ☒B. $T(2) = 3, T(4) = 5, T(6) = 7$ ☐C. $T(2) = 3, T(4) = 5, T(6) = 6$ ☐D. $T(2) = 3, T(4) = 4, T(6) = 6$

QUESTION 8 [2]

Soit l'image $f(x, y)$ de dimensions $H \times W$ et les deux graphiques A et B. Associer les graphes et les équations

 $f(x, y)$ 

A



B

$$\text{E1: } p_H(x_0) = \sum_{y=0}^{W-1} f(x_0, y); \text{E2: } p_V(y_0) = \sum_{x=0}^{H-1} f(x, y_0)$$

☒

A. (A, E1), (B, E2)

☐B. $T(A, E2), (B, E1)$

QUESTION 9

On applique une transformation géométrique à l'image f définie par la matrice :

$$G = \begin{bmatrix} 0.87 & -0.50 & 35.72 \\ 0.50 & 0.87 & -33.30 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Calculer l'antécédent du pixel de coordonnées (25,50)

- ☐ A. (32.47 , 22.70)
- ☐ B. (22.10 , 37.40)
- ☒ C. (76.81 , 33.56)
- ☐ D. (32.10 , 77.30)

QUESTION 10

[4]

On donne les valeurs de 4 pixels :

$$f(42,39) = 190, f(42,40) = 189, f(43,39) = 188, f(43,40) = 187$$

Estimer la valeur du pixel (42.75,39.79) par interpolation bilinéaire, sans arrondi, avec une précision de deux décimales

Value / Valeur

Unity / Unité

1,88	.10	2	
------	-----	---	--

QUESTION 11

[4]

Cocher les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

- ☒ A. Les noyaux de convolution sont mal nommés et devraient s'appeler noyaux de corrélation.
- ☒ B. La somme des coefficients d'un noyau de lissage est toujours 0
- ☒ C. La somme des coefficients d'un noyau dérivateur est toujours 1
- ☐ D. Les dimensions d'un noyau gaussien sont de l'ordre de 6 fois l'écart-type
- ☐ E. On pourrait définir des noyaux gaussiens qui lissent plus l'image dans la direction verticale que dans la direction horizontale
- ☐ F. Les noyaux gaussiens sont souvent appliqués avant une extraction de contour pour définir le niveau de détail voulu.
- ☒ G. Les noyaux moyennent sont plus performants que les noyaux gaussiens car ils donnent des images plus réalistes