

Домашнее задание №11

Томинин Ярослав, 778 группа

26 ноября 2018 г.

1.

Рассмотрим СУ, которая делает перевод $w \rightarrow \pi_l(w)$. Она была рассмотрена в примере 1. Построим вывод ((a)) в грамматике G.

$$\begin{aligned} E &\rightarrow T \\ T &\rightarrow F \\ F &\rightarrow (E) \\ E &\rightarrow T \\ T &\rightarrow F \\ F &\rightarrow (E) \\ E &\rightarrow T \\ T &\rightarrow F \\ F &\rightarrow a \end{aligned}$$

Теперь применим те же правила в грамматике, в которую нас перевел анализатор.

$$\begin{aligned} E &\rightarrow 2T \\ T &\rightarrow 4F \\ F &\rightarrow 5E \\ E &\rightarrow 2T \\ T &\rightarrow 4F \\ F &\rightarrow 5E \\ E &\rightarrow 2T \\ T &\rightarrow 4F \\ F &\rightarrow 6 \end{aligned}$$


Получаем левый разбор-результат выполнения правил: 245245246

Для того, чтобы получить правый разбор, достаточно во всех правилах вывода G' перенести цифру в конец вывода. Тогда получаем

$E \rightarrow T2$
 $T \rightarrow F4$
 $F \rightarrow E5$
 $E \rightarrow T2$
 $T \rightarrow F4$
 $F \rightarrow E5$
 $E \rightarrow T2$
 $T \rightarrow F4$
 $F \rightarrow 6$

Тогда правый разбор: 642542542

Или можно сделать все то же самое, построив дерево разбора. В данном случае дерево разбора для левого и правого вывода одинаковое.



2.

F_i	E	T	F	E'	T'
F_0	\emptyset	\emptyset	\emptyset	ϵ	ϵ
F_1	\emptyset	\emptyset	(,id	$\epsilon, +$	\times, ϵ
F_2	\emptyset	(,id	(,id	$\epsilon, +$	\times, ϵ
F_3	(, id	(,id	(,id	$\epsilon, +$	\times, ϵ

Теперь вычислим FOLLOW

Добавим правило $S' \rightarrow E\$$

F_i	E	T	F	E'	T'
F_0	\$	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset
F_1	\$(,)	\$(, +	\times	\$	\emptyset
F_2	\$(,)	\$(, +,)	\$(, \times, +	\$(,)	\$(, +
F_3	\$(,)	\$(, +,)	\$(, \times, +,)	\$(,)	\$(, +,)
F_4	\$(,)	\$(, +,)	\$(, \times, +,)	\$(,)	\$(, +,)
F_5	\$(,)	\$(, +,)	\$(, \times, +,)	\$(,)	\$(, +,)

Теперь построим анализатор.

0	E	T	F	E'	T'
id	$E \rightarrow TE'$	$T \rightarrow FT'$	$F \rightarrow id$	NONE	NONE
+	NONE	$T \rightarrow FT'$	NONE	$E' \rightarrow +TE'$	$T' \rightarrow \epsilon$
\times	NONE	NONE	NONE	NONE	$T' \rightarrow \times FT'$
($E \rightarrow TE'$	$T \rightarrow FT'$	$F \rightarrow (E)$	NONE	NONE
)	NONE	NONE	NONE	$E' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
\$	NONE	NONE	NONE	$E' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$

Для демонстрации запишем конфигурации

Для начала занумеруем правила

$$\begin{aligned}
 &E \rightarrow TE'(1) \\
 &E' \rightarrow +TE'|\epsilon(2,3) \\
 &T \rightarrow FT'(4) \\
 &T' \rightarrow \times FT'|\epsilon(5,6) \\
 &F \rightarrow (E)|id(7,8)
 \end{aligned}$$

$(id + id \times id$, E,)$
 $(id + id \times id$, TE', 1)$
 $(id + id \times id$, $FT'E'$, 14)$
 $(id + id \times id$, $idT'E'$, 148)$
 $(+id \times id$, $T'E'$, 148)$
 $(+id \times id$, E', 1486)$
 $(+id \times id$, $+TE'$, 14862)
 $(id \times id$, TE' , 14862)
 $(id \times id$, $FT'E'$, 148624)
 $(id \times id$, $idT'E'$, 1486248)
 $(\times id$, $T'E'$, 1486248)
 $(\times id$, $\times FT'E'$, 14862485)
 $(id$, $FT'E'$, 14862485)
 $(id$, $idT'E'$, 148624858)
 $($, $T'E'$, 148624858)
 $($, E' , 1486248586)
 $($, $$, 14862485863)$
 $(\epsilon, \epsilon, 14862485863)$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Ура, это слово принимается анализатором!
 Дерево разбора:

F_i	S	A	S'
F_0	\$	aa, ba	\emptyset
F_1	\$	aa, ba	\emptyset

Отлично, теперь проверим выполняется ли критерий.

Рассмотрим первые два правила

$$FIRST_2(aAaa) = FIRST_2(a) \oplus_2 FIRST_2(A) \oplus_2 FIRST_2(a) = \{a\} \oplus_2$$

$$\{b, \epsilon\} \oplus_2 \{a\} = \{aa, ab\}$$

$$FIRST_2(babA) = \{ba\}$$

Так как нет пересечений, то здесь нет противоречия критерию.

Рассмотрим последние два правила.

$$FIRST_2(b\alpha) = FIRST_2(b) \oplus_2 FOLLOW_2(A) = \{a\} \oplus \{aa, ba\} = \{ba, bb\}$$

$$FIRST_2(\epsilon\alpha) = FOLLOW_2(A) = \{aa, ba\}$$

Заметим, что последние два множества имеют пересечение, поэтому это грамматика не является LL(2)-грамматикой.

4.

$$S \rightarrow baaA|babA$$

$$A \rightarrow \epsilon|Aa|Ab$$

Преобразуем грамматику

$$S \rightarrow baQ(1)$$

$$Q \rightarrow aA|bA(2, 3)$$

$$A \rightarrow A'(4)$$

$$A' \rightarrow aA'|bA'|\epsilon(5, 6, 7)$$

Построим FIRST

F_i	S	A	A'	Q
F_0	\emptyset	ϵ	\emptyset	\emptyset
F_1	b	ϵ	a, b	a, b
F_2	b	ϵ, a, b	a, b	a, b

Построим FOLLOW

F_i	S	A	A'	Q
F_0	\$	\emptyset	\emptyset	\emptyset
F_1	\$	\emptyset	\emptyset	\$
F_2	\$	\$	\$	\$
F_3	\$	\$	\$	\$

Построим таблицу анализатора.

0	S	A	A'	Q
<i>a</i>	NONE	4	5	2
<i>b</i>	1	4	6	3
\$	NONE	4	7	NONE

Демонстрация с помощью конфигураций.

$(baab$, S,)$
 $(baab$, baQ, 1)$
 $(aab$, aQ, 1)$
 $(ab$, Q, 1)$
 $(ab$, aA, 12)$
 $(b$, A, 12)$
 $(b$, A', 124)$
 $(b$, bA', 1246)$
 $($, A', 1246)$
 $($, $`, 12467)$
 $(\epsilon, \epsilon, 12467)$$$$$$$$$$$

Слово принимается нашей грамматикой.


5.

$$S' \rightarrow S\$$$

$$S \rightarrow aSb|a$$

Рассмотрим начальное состояние $[S' \rightarrow \cdot S$, ϵ]$

Проведем поиск в ширину, то есть из достижимых вершин будем проводить все возможные переходы. Закончим, когда не появится ничего нового на k -ой итерации.



Построим ДКА по НКА

Q_i	a	b	S
$Q_0 = \{1, 2, 3\}$	$Q_1 = 5, 6, 9, 10$	-	$Q_2 = 4$
$Q_1 = \{5, 6, 9, 10\}$	$Q_3 = 11, 10, 9, 14$	-	$Q_4 = 7, 12$
$Q_2 = \{4\}$	-	-	-
$Q_3 = \{9, 10, 11, 14\}$	$Q_3 = 9, 10, 11, 14,$	-	$Q_5 = 12$
$Q_4 = \{7, 12\}$	-	$Q_6 = 8, 13$	-
$Q_5 = \{12\}$	-	$Q_7 = 13$	-
$Q_6 = \{8, 13\}$	-	-	-
$Q_7 = \{13\}$	-	-	-

Эта таблица определяет ДКА.

6.

Поймем, что в произвольной грамматике, которая порождает наш язык есть два правила вида

$$S \rightarrow \alpha$$

$$S \rightarrow \beta$$

Причем мы знаем, что $a^k \in FIRST_k(\alpha)$ и $a^k \in FIRST_k(\beta)$.

Если мы докажем этот факт, то мы получим непустое пересечение, следовательно, наша грамматика не будет LL. Так как мы можем сказать это для произвольной грамматика, то наш язык не является LL языком. Поймем, что из S должен выводиться a^k , поэтому в одном из FIRST точно содержится a^k .

Так же поймем, что у нас точно будет два правила такого вида. Докажем это от противного. Допустим, что существует только одно правило такого вида, тогда наша грамматика бужет допускать слова $a^k b^i$, но этого быть не должно. Поэтому у нас есть два правила, где второе правило должно "отвечать" за вывод $a^n b^n$, поэтому в FIRST второго правила тоже содержится a^k .