

Distributions: Gamma



Gamma distribution

$$\Gamma(\gamma|a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$



Gamma distribution

$$\Gamma(\gamma|a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$



$$\gamma, a, b > 0$$




Gamma distribution

$$\Gamma(\gamma|a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$




$$\gamma, a, b > 0$$



Gamma distribution


$$\Gamma(\gamma|a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$



Gamma distribution

$$\Gamma(\gamma|a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$

$\uparrow \Gamma(n) = (n-1)!$




ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛАЙД

$$\Gamma(\gamma|a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$

$$\Gamma(5) = 24$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$



$$\Gamma(\gamma|a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$

$$\mathbb{E}[\gamma] = a/b$$

$$\text{Mode}[\gamma] = \frac{a-1}{b}$$

$$\text{Var}[\gamma] = a/b^2$$



Example

You run $5\text{km} \pm 100\text{m}$ a day





You run $5\text{km} \pm 100\text{m}$ a day

So is a random variable

We could model it with a normal



Example

Std. 
You run 5km \pm 100m a day
 Expectation



Example

You run 5km \pm 100m a day

$$\mathbb{E}[x] = a/b = 5, \text{Var}[x] = a/b^2 = 0.1^2$$



Example

You run 5km \pm 100m a day


$$\mathbb{E}[x] = a/b = 5, \text{Var}[x] = a/b^2 = 0.1^2$$
$$\Rightarrow a = 2500, b = 500$$



Example

You run 5km \pm 100m a day

$$\mathbb{E}[x] = a/b = 5, \text{Var}[x] = a/b^2 = 0.1^2 \\ \Rightarrow a = 2500, b = 500$$




Example: Normal, precision



Precision

Precision $\rightarrow \gamma = \frac{1}{\sigma^2} \leftarrow$ Variance



Precision

$$\mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



Precision

$$\mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}$$



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}?$$



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}?$$

$$p(\gamma|x) = \frac{p(x|\gamma)p(\gamma)}{p(x)} \propto \gamma e^{-\gamma(b + \frac{(x-\mu)^2}{2})}$$



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}?$$

$$p(\gamma|x) = \frac{p(x|\gamma)p(\gamma)}{p(x)} \propto \gamma e^{-\gamma(b + \frac{(x-\mu)^2}{2})}$$



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}$$

~~$$p(\gamma) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}?$$~~

~~$$p(\gamma|x) = \frac{p(x|\gamma)p(\gamma)}{p(x)} \propto \gamma e^{-\gamma(b + \frac{(x-\mu)^2}{2})}$$~~



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}$$



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma) \propto \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$



Functional form

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) = \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}}$$

$$\mathcal{N}(x|\mu, \gamma^{-1}) \propto \gamma^{\frac{1}{2}} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma) \propto \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma) = \Gamma(\gamma|a, b)$$



Gamma prior

$$p(\gamma) = \Gamma(\gamma|a, b) \propto \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$



Gamma prior

$$p(\gamma) = \Gamma(\gamma|a, b) \propto \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma|x) \propto p(x|\gamma)p(\gamma)$$



Gamma prior

$$p(\gamma) = \Gamma(\gamma|a, b) \propto \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma|x) \propto p(x|\gamma)p(\gamma)$$

$$p(\gamma|x) \propto \left(\gamma^{\frac{1}{2}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}} \right) \cdot \left(\gamma^{a-1} e^{-b\gamma} \right)$$



Gamma prior

$$p(\gamma) = \Gamma(\gamma|a, b) \propto \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma|x) \propto p(x|\gamma)p(\gamma)$$

$$p(\gamma|x) \propto \left(\gamma^{\frac{1}{2}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}} \right) \cdot \left(\gamma^{a-1} e^{-b\gamma} \right)$$

$$p(\gamma|x) \propto \gamma^{\frac{1}{2} + a - 1} e^{-\gamma(b + \frac{(x-\mu)^2}{2})}$$



Gamma prior

$$p(\gamma) = \Gamma(\gamma|a, b) \propto \gamma^{a-1} e^{-b\gamma}$$

$$p(\gamma|x) \propto p(x|\gamma)p(\gamma)$$

$$p(\gamma|x) \propto \left(\gamma^{\frac{1}{2}} e^{-\gamma \frac{(x-\mu)^2}{2}} \right) \cdot \left(\gamma^{a-1} e^{-b\gamma} \right)$$

$$p(\gamma|x) \propto \gamma^{\frac{1}{2}+a-1} e^{-\gamma(b+\frac{(x-\mu)^2}{2})}$$

$$p(\gamma|x) = \Gamma(a + \frac{1}{2}, b + \frac{(x-\mu)^2}{2})$$

