

Systemic Fungicide

KONI TIVO

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG



KONI TIVO

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG



Systemic Fungicide

Konichiwa Chemicals Private Limited
AN ISO 9001:2015 Certified Company

Net. Content :
250g

Systemic Fungicide



Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG

KONI TIVO

250g Size : 110 x 175 x 35mm
09/09/2026

KONI TIVO

Tebuconazole 50% +
Trifloxystrobin 25% WG
Systemic Fungicide



Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG

KONI TIVO

Systemic Fungicide

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG formulation contains 500g of Tebuconazole and 250 g of Trifloxystrobin active ingredient per kg of formulation. Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG is a fungicide recommended for use as a foliar spray for the control of : Sheath blight, Leaf blast & Neck blast, Glume discoloration (dirty panicle), False smut and Brown leaf spot diseases in Rice, Early blight in Tomato, Powdery Mildew in Grape, Anthracnose & Alternaria leaf spot in Chili, Yellow rust, Powdery mildew in Wheat; Powdery Mildew, Anthracnose in Mango, Alternaria leaf spot in Cotton, Sigatoka leaf spot in Banana and Premature leaf fall, Powdery Mildew in Apple, Alternaria leaf blight/ Leaf spot in Cabbage, Leaf blight in Maize and Powdery mildew disease in Gherkin, Cercospora leaf spot in Blackgram, Blister Blight Tea and Tikka leaf spot in disease in Groundnut.
Chemical Composition : Tebuconazole a.i. : 50.00%w/w, Trifloxystrobin a.i. : 25.00%w/w, Formaldehyde, reaction products with : 15.00%w/w, Sulfonated 1,1'-oxybis (methylbenzene), sodium salt Naphthalenesulfonic acids, branched and : 1.00%w/w linear butyl derivatives, sodium salt Urea/formaldehyde condensate : 3.00%w/w, Kaolin : Balance **Total : 100.00%w/w. Caution :** Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. **CAUTION :** The product is not permitted for use near aquaculture. This product is highly toxic to aquatic organisms. Strobilurin compound is prone to resistance build up and hence continuous use should be discouraged. **PRECAUTIONS :** Keep locked away and out of reach of children. Avoid contact with spilled product or contaminated surfaces. Wash exposed parts of the body with soap and water after handling and before eating drinking and smoking. DO NOT eat, drink or smoke when using this product. Read label and leaflet before use and follow instructions carefully. If medical advice is needed have product container / label and leaflet at hand. DO NOT re - use this container for any other purpose . Wear personal protective equipment while working with the product. Use of Nitrile gloves, face mask and ensure protection of eyes. Wash the spray equipment's after use. **Symptoms of poisoning :** Weakness, Fatigue, Dyspnea. **First aid :** Get the victim into the fresh air immediately. If there is a risk of unconsciousness, position and transport in stable sideways position. Remove soiled or soaked clothing immediately and dispose of safely. In case of contact with eyes, rinse the eyes thoroughly with water. In case of contact with skin wash immediately with copious water and soap. In case of ingestion, do not induce vomiting, wash out mouth with water. Call a physician immediately. **Antidote :** No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.
Mfg. by: Modern AgriGenetics Limited, Plot No.-31 B, Sector-3, Pithampur, Dist-Dhar (M.P.)

कानी टीवो अंतर्प्रवाही फण्टोदीनाशक **ट्रेबुकोनाजोल 50% + ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन 25% डब्ल्यू.जी.**
ट्रेबुकोनाजोल ५०% + ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन २५% डब्ल्यूजी फॉर्म्युलेशन में प्रति किलोग्राम फॉर्म्युलेशन में ५०० ग्राम ट्रेबुकोनाजोल और २५० ग्राम ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन सक्रिय घटक होता है। ट्रेबुकोनाजोल ५०% + ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन २५% डब्ल्यूजी एक फफुनोसी है जिसे फलन में डीएम बालट, लोक बालट और मेक बालट, गुरु विकरलेयन (गुरु फिकन), काला मट और काज लोक बाल्ट रोना, उपादर में अली बालट, आंगू में पाउडरी फण्टो, फुफुओन और अल्टरनेरिया लोक बाल्ट, गेहू में पीएम बालट, पाउडरी फण्टो के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त हो सके के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। आम में पाउडरी फण्टो, फुफुओन, काजम में अल्टरनेरिया लोक बाल्ट, केले में फिफ्टोफा लोक बाल्ट और समर से पहले पत्ती मिरन, सेम में पाउडरी फण्टो, पालनी में अल्टरनेरिया लोक बाल्ट/लोक बाल्ट, माछा में लोक बालट और सीमा में पाउडरी फण्टो रोना, उदर में बाल्टोरा लोक बाल्ट, घाघ में बाल्टोरा बालट और मूलमाल में डीएम लोक बाल्ट रोना। **प्राथमिक संरक्षण:** ट्रेबुकोनाजोल ए.आई. : ५०.००% मा / मा, ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन ए.आई. : २५.००% मा / मा, फॉर्मलिनहाइड्रेट, इसके साथ प्रतिक्रिया उत्पाद : १५.००% मा / मा, सल्फोनेटेड १,१'-ऑक्सीबिस (मिथाबेन्जेन-डीन), सोडियम सल्फ नैफ्थालेनसल्फोनेट फुडिक, बालिड और : १.००% मा / मा, बैक्टीरियल ब्रूटोहल ब्रूटोहल, सोडियम सल्फ फुरिया/फॉर्मलिनहाइड्रेट संयुक्त : ३.००% मा / मा, काओलिन : कुल : १००.००% मा / मा। **सावधानी :** इस लेबल/फाल्ट पर निर्दिष्ट फाली के अलावा अन्य फाली पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **सावधानी :** उत्पाद को जलीय कृषि के पास उपयोग की अनुमति नहीं है। यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाल होता है। ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन जीविक प्रतिरोध निर्माण के लिए प्रयोग होता है और इसीलिए निर्लेख उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। **सावधानी :** ताला लोकारक रसे और चमकी की वृद्धि से दूर रहे। विले हुए उत्पाद या द्रुमि संरली के संपर्क से बचे। इस उत्पाद का उपयोग करते समय कुछ भी न खाएं, निए या धूम्रपान न करें। उपयोग से पहले लेबल और फाल्ट पढ़ें और निर्देशों का सख्तीपूर्वक पालन करें। यदि पिरिलेसिय संराल की आवश्यकता हो, तो उत्पाद का कंटेनर/लेबल और फाल्ट साफ करें। इस कंटेनर का किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुरु्याय उपयोग न करें। उत्पाद के साथ काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें, माइतुहल दस्ताने, चेरा मास्क पहनें और अली की सुरक्षा द्रुमिबि करें। उपयोग के बाद इसे उपकरण धो लें। **विषालता के लक्षण:** कमजोरी, थकान, धमाक छोड़ें। **प्राथमिक उपचार:** पीछल को तुरल लारी हल में ले जाई। अगर बेहोरी का हल हो, तो उसे बिल और करल लेकर ले जाई। गंदे या मोटे हुए कपड़े को तुरल उतर दे और द्रुमिबि रूप से फेक दें। अली में जाने पर, अली को पानी से अली हल छोड़ें। लय के हलके में आने पर तुरल कृष पानी और सानुन से धोई। निगले पर, उली न करवाई, मुँह को पानी से धोई। तुरल बालर को बुलाई। **प्रतिबिध:** कोई विषल प्रतिबिध प्राप्त नहीं है। सलानुसार उत्पाद दें।

कोनि टीवो सिस्टैमिक हलानाशक **ट्रेबुकोनाजोल ५०% + ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन २५% डब्ल्यू.जी.**
ट्रेबुकोनाजोल ५०% + ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन २५% डब्ल्यूजी फॉर्म्युलेशन में प्रति किलोग्राम फॉर्म्युलेशन में ५०० ग्राम ट्रेबुकोनाजोल और २५० ग्राम ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन सक्रिय घटक होता है। ट्रेबुकोनाजोल ५०% + ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन २५% डब्ल्यूजी एक फफुनोसी है जिसे फलन में डीएम बालट, लोक बालट और मेक बालट, गुरु विकरलेयन (गुरु फिकन), काला मट और काज लोक बाल्ट रोना, उपादर में अली बालट, आंगू में पाउडरी फण्टो, फुफुओन और अल्टरनेरिया लोक बाल्ट, गेहू में पीएम बालट, पाउडरी फण्टो के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त हो सके के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। आम में पाउडरी फण्टो, फुफुओन, काजम में अल्टरनेरिया लोक बाल्ट, केले में फिफ्टोफा लोक बाल्ट और समर से पहले पत्ती मिरन, सेम में पाउडरी फण्टो, पालनी में अल्टरनेरिया लोक बाल्ट/लोक बाल्ट, माछा में लोक बालट और सीमा में पाउडरी फण्टो रोना, उदर में बाल्टोरा लोक बाल्ट, घाघ में बाल्टोरा बालट और मूलमाल में डीएम लोक बाल्ट रोना। **प्राथमिक संरक्षण:** ट्रेबुकोनाजोल ए.आई. : ५०.००% मा / मा, ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन ए.आई. : २५.००% मा / मा, फॉर्मलिनहाइड्रेट, इसके साथ प्रतिक्रिया उत्पाद : १५.००% मा / मा, सल्फोनेटेड १,१'-ऑक्सीबिस (मिथाबेन्जेन-डीन), सोडियम सल्फ नैफ्थालेनसल्फोनेट फुडिक, बालिड और : १.००% मा / मा, बैक्टीरियल ब्रूटोहल ब्रूटोहल, सोडियम सल्फ फुरिया/फॉर्मलिनहाइड्रेट संयुक्त : ३.००% मा / मा, काओलिन : कुल : १००.००% मा / मा। **सावधानी :** इस लेबल/फाल्ट पर निर्दिष्ट फाली के अलावा अन्य फाली पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **सावधानी :** उत्पाद को जलीय कृषि के पास उपयोग की अनुमति नहीं है। यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाल होता है। ट्राइफ्लोक्सीस्टोबिन जीविक प्रतिरोध निर्माण के लिए प्रयोग होता है और इसीलिए निर्लेख उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। **सावधानी :** ताला लोकारक रसे और चमकी की वृद्धि से दूर रहे। विले हुए उत्पाद या द्रुमि संरली के संपर्क से बचे। इस उत्पाद का उपयोग करते समय कुछ भी न खाएं, निए या धूम्रपान न करें। उपयोग से पहले लेबल और फाल्ट पढ़ें और निर्देशों का सख्तीपूर्वक पालन करें। यदि पिरिलेसिय संराल की आवश्यकता हो, तो उत्पाद का कंटेनर/लेबल और फाल्ट साफ करें। इस कंटेनर का किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुरु्याय उपयोग न करें। उत्पाद के साथ काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें, माइतुहल दस्ताने, चेरा मास्क पहनें और अली की सुरक्षा द्रुमिबि करें। उपयोग के बाद इसे उपकरण धो लें। **विषालता के लक्षण:** कमजोरी, थकान, धमाक छोड़ें। **प्राथमिक उपचार:** पीछल को तुरल लारी हल में ले जाई। अगर बेहोरी का हल हो, तो उसे बिल और करल लेकर ले जाई। गंदे या मोटे हुए कपड़े को तुरल उतर दे और द्रुमिबि रूप से फेक दें। अली में जाने पर, अली को पानी से अली हल छोड़ें। लय के हलके में आने पर तुरल कृष पानी और सानुन से धोई। निगले पर, उली न करवाई, मुँह को पानी से धोई। तुरल बालर को बुलाई। **प्रतिबिध:** कोई विषल प्रतिबिध प्राप्त नहीं है। सलानुसार उत्पाद दें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Regn. No. : CIR-359291/2026 -Tebuconazole +
रजि. नं. Trifloxystrobin (WG)(468)-488
Mfg. Lic. No. : 250
उत्पादन लाइसेंस नं.
Batch No. :
बैच नं.
Date of Mfg.
उत्पादन की तिथि
Date of Expiry :
समाप्ति की तिथि
Maximum Retail Price ₹
(Incl. of All Taxes)
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹
(समी कर सहित)
U.S.P. ₹ :
Net. Contents } 250g
शुद्ध मात्रा :



Mktd. by
Konichiwa Chemicals Private Limited
Office :Innov8 Cybergreen, 5th Floor, Cyber Green
Part 1, Sec 25, Gurugram-122002- INDIA
Email : info@konichiwachemicals.com,
Customer Care No.: +91 99939 55051

KONITIVO
Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG
Systemic Fungicide



KONI TIVO
Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG



Systemic Fungicide

Konichiwa Chemicals Private Limited
AN ISO 9001:2015 Certified Company

Net. Content :
100g

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG



Systemic Fungicide

100g Size : 90 x 140 x 30 mm
09/09/2026

[illegible][illegible]

কোনি টিভে

[illegible]

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

टंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS
SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



Mktd. by
Konichiwa Chemicals Private Limited
Office : Innov8 Cybergreen, 5th Floor, Cyber Green
Part 1, Sec 25, Gurugram-122002- INDIA
Email : info@konichiwachemicals.com,
Customer Care No. : +91 99939 55051

Regn. No. : CIR-359291/2026 -Tebuconazole +
रजि. नं. Trifloxystrobin (WG)(468)-488

Mfg. Lic. No. : 250
उत्पादन लाइसेन्स नं.
Batch No. :

बैच नं.

Date of Mfg.

उत्पादन की विधि

Date of Exercise: _____

Date of Expiry
____/____/____

समाप्त का तिथि

Maximum Retail Price ₹
(Incl. of All Taxes)

अधिकृतम् स्वदश मत्वा ३

(सभी कर सहित)

U.S.P. ₹:

Net. Contents 1.4

शुद्ध मात्रा : } 100g



Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG



Systemic Fungicide